

Las respuestas marcadas en amarillo son las correctas

Comenzado el	lunes, 19 de abril de 2021, 19:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 19 de abril de 2021, 19:53
Tiempo empleado	13 minutos
Puntos	7,00/7,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mujer de 26 años que va conduciendo su vehículo en una zona de alta densidad de tráfico y sufre sensación de falta de aire de aparición brusca. Ha parado el vehículo y ella misma ha llamado al 112.

Antecedentes personales

Obesidad moderada, no refiere antecedentes médicos de interés ni alergias conocidas. Fumadora de 20 cigarrillos al día. Bebedora ocasional. Tratamiento con vitaminas para la caída del cabello y anticonceptivos orales. Valoración de la paciente

La paciente se encuentra consciente y orientada, refiere dificultad para respirar desde hace unos 20 minutos. También manifiesta ligero dolor en el pecho durante la inspiración.

Constantes vitales

- Frecuencia Cardíaca: 125 lpm con ritmo regular y pulso filiforme.
- Frecuencia Respiratoria: 33 rpm con movimientos torácicos simétricos.
- Tensión Arterial: 85/50 mmHg.
- Sat O2 87% sin O2
- Glasgow: 15.
- Pupilas de tamaño normal y reactivas (3R).

¿Cuál sería la primera medida a adoptar en este caso?

- Trasladar a la paciente a la ambulancia de inmediato.
- Asegurar la presencia del material de SVB: maletines de ataque y DEA.
- Identificarse como técnico de SAMUR, preguntar con amabilidad el motivo de la demanda y el nombre de la paciente.

d.

Hacer un primer reconocimiento visual para identificar posibles riesgos en la escena y así garantizar la seguridad del equipo.

Respuesta correcta

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Nerea, de 3 años, está comiendo unas pipas de girasol con su hermano mayor. De repente se atraganta, tose varias veces, y empieza a llorar y a gritar "mamá, me ahogo".

a.

Le hacemos primero la maniobra de Heimlich.

b.

Comenzar con la rcp.

c.

Hay que animar a toser y no aplicar maniobras que puedan crear problemas.

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mujer de mediana edad, se desploma en la Sala de Espera, comprobamos que está en PCR e iniciamos RCP. A lo largo de la Reanimación, el DESA nos indica en 2 ciclos sucesivos "descarga NO aconsejada". ¿Pulso el botón rojo de descarga por si acaso?

a.

No sirve de nada, un DESA no se carga si no detecta "Ritmo desfibrilable".

b.

Sí, siempre le daremos una descarga.

c.

Esperaremos a que el DESA haga una descarga automática.

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Niño de unos 3 años, con tos y fatiga, muy agitado, aspecto desorientado, dando manotazos. ¿Qué nº de Cánula de Guedel le pondremos en este momento?

a.

La más adecuada para su tamaño.

b.

El niño está agitado pero NO inconsciente, no es necesaria una Cánula de Guedel.

c.

Actuaremos lo más rápido posible introduciendo cualquier cánula que tengamos en ese momento a nuestra disposición.

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Adulto o niño con parada en la calle, no disponemos de equipamiento. Tras activar el Sistema de Emergencias, ¿Debo iniciar RCP si me dicen que el Desfibrilador/Ambulancia pueden tardar más de 20 minutos ?

a.

Se debe iniciar la RCP.

b.

No se aconseja iniciar RCP.

c.

Esperar a que venga la asistencia médica.

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una RCP, cuándo se debe parar:

a.

En una Hipotermia severa, si no hay recuperación en los primeros 5 minutos, no vale la pena insistir.

b.

Aunque hay que valorar cada caso, 20 minutos en Asistolia parece un tiempo razonable si no ha habido resultados.

c.

Si la RCP se ha en 6 minutos, no es razonable prolongarla mucho más tiempo.

Respuesta correcta

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Joven, de 15 o 17 años, sábado 2 de la madrugada, cerca de dos discotecas, tirado en el suelo. Al acercarnos y estimularle abre los ojos y balbucea algo con aire ausente. Como actuaremos:

a.

Vigilarle y llamar al 112 (es madrugada y está solo). Luego, según su respuesta, colocar en posición lateral de seguridad.

b.

Comenzar RCP inmediata.

c.

Avisar al 112, dejarlo sentado y abandonar la zona ya que está consciente.

Respuesta correcta