

Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

Comenzado el domingo, 14 de noviembre de 2021, 15:26

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 14 de noviembre de 2021, 16:02

Tiempo empleado 36 minutos 1 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El hemoneumotórax suele ser causado por:

Seleccione una:

- a. Heridas de bala
- b. Asta de toro
- c. Empalamiento
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante lesión cardiaca cerrada puede producir

Seleccione una:

- a. Contusión cardiaca
- b. Rotura valvular
- c. Rotura cardiaca
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la respiración del trauma torácico, señala la verdadera:

Seleccione una:

- a. No retirar el collarín cervical para la valoración
- b. No debemos exponer al paciente para evitar la hipotermia
- c. La cianosis es un signo precoz de la hipoxia
- d. Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón

respiratorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón respiratorio

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración neurológica del paciente con trauma torácico utilizaremos: señale la falsa

Seleccione una:

- a. GCS
- b. Tamaño pupilar
- c. Reactividad pupilar
- d. Color pupilar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Color pupilar

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El área toracoabdominal está delimitado por:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valora.

Seleccione una:

- a. Tórax
- b. Abdomen
- c. Vía aérea
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La triada de Beck se manifiesta por... señale la falsa

Seleccione una:

- a. Descenso de PVC
- b. Hipotensión arterial
- c. Tonos cardiacos apagados
- d. Ingurgitación yugular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descenso de PVC

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento definitivo del taponamiento cardiaco es:

Seleccione una:

- a. Pericardiocentesis
- b. Quirúrgico
- c. Infusión rápida de a-adrenérgicos
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Quirúrgico

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando valoramos mediante la palpación, vigilaremos:

Seleccione una:

- a. Escuchar la correcta ventilación de ambos pulmones
- b. Simetría de ambos campos Correcta
- c. Aparición de hematomas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Simetría de ambos campos Correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál sería la prueba diagnóstica de confirmación para un taponamiento cardíaco?

Seleccione una:

- a. EKG de 12 derivaciones
- b. Tensión arterial y Frecuencia cardiaca alterados
- c. Ecografía cardiaca
- d. Analítica con enzimas cardiacas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ecografía cardiaca

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos orificios no presenta el músculo diafragma?

Seleccione una:

- a. Aórtico y vena cava inferior
- b. Esofágico
- c. Gástrico
- d. Todos son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gástrico

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El área precordial está delimitada por:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para un paciente con neumotórax a tensión, ¿en qué región anatómica puedes pinchar para descomprimir?

Seleccione una:

- a. 4º espacio intercostal línea media clavicular
- b. 2º espacio intercostal línea media axilar
- c. 5º espacio intercostal línea media axilar
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal línea media axilar

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino superior se extiende desde:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el neumotórax a tensión, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Existen una lesión penetrante
- b. Hay una rápida entrada unidireccional de aire en la pleura
- c. Puede comprimir vasos importantes
- d. Puede obstruir el retorno venoso al corazón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existen una lesión penetrante

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estos signos no aparece en la rotura traqueobronquial:

Seleccione una:

- a. Bradipnea
- b. Palidez y sudoración
- c. Descenso de SpO2
- d. Enfisema subcutáneo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino inferior se extiende desde:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas estructuras es fija y puede producir rotura aórtica?:

Seleccione una:

- a. Inicio de aorta descendente
- b. Arco aórtico
- c. Aorta ascendente
- d. Todas son estructuras móviles

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inicio de aorta descendente

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con neumotórax abierto, el aire entra por el lugar en el que encuentra menor resistencia. ¿qué tamaño tiene que tener la lesión para entrar preferentemente por el defecto de la pared torácica?

Seleccione una:

- a. 1/3 del diámetro de la tráquea
- b. 1/2 del diámetro de la tráquea
- c. 2/3 del diámetro de la tráquea
- d. Todas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2/3 del diámetro de la tráquea

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el neumotórax simple

Seleccione una:

- a. No es necesario la administración de oxígeno
- b. Se debe monitorizar la FR y SpO2
- c. Se confirma con diagnóstico por imagen
- d. B y c son necesarios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son necesarios