

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:

Seleccione una:

- ☐ a. Ecografía.
- ☐ b. Compresor torácico mecánico.
- ☐ c. RCP-ECMO Extracorporea.
- ☒ d. Hipertermia controlada. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al mejor indicador de la eficiencia de la RCP-A es:

Seleccione una:

- ☒ a. La capnometría/capnografía. ✓
- ☐ b. La pulsioximetría.
- ☐ c. Un electrocardiograma.
- ☐ d. Una gasometria arterial basal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP-A ¿A partir de que descarga se administra la Amiodarona?

Seleccione una:

- ☐ a. 15.

☐ b. 30.

☒ c. 3. ✓

☐ d. 5.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las recomendaciones de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes) la comunicación del planteamiento de la donación, siempre que sea posible, la realizará:

Seleccione una:

☐ a. El mismo profesional que comunicó el fallecimiento.

☐ b. Un psicólogo clínico experto en urgencias y emergencias.

☒ c. Un profesional diferente al que comunicó el fallecimiento. ✓

☐ d. Sólo el coordinador de la ONT del hospital receptor.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Cardiana (FC) de un recién nacido de entre 3 a 4 Kg de peso, son:

Seleccione una:

☐ a. 100 lpm.

☐ b. 80-120 lpm.

☒ c. 120-180 lpm. ✓

☐ d. 100-200 lpm.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Respiratoria (FR) de un niño de 3 a 6 años son:

Seleccione una:

- ☐ a. 15-30 rpm.
- ☒ b. 15-20 rpm. ✓
- ☐ c. 20-30 rpm.
- ☐ d. 10-15 rpm.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuánto julios programaremos en la primera descarga, para desfibrilar en RCP-A con un equipo bifásico?

Seleccione una:

- ☐ a. 100-120 Julios.
- ☐ b. 500 watios.
- ☐ c. 150-360 Julios.
- ☒ d. 150-200 Julios. ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el aviso:

Seleccione una:

- ☒ a. Informar al centro coordinador o central. ✓
- ☐ b. Pedir un DESA/DEA.
- ☐ c. Solicitar servicio de bomberos de apoyo.
- ☐ d. Llamar al 061.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el valor de APGAR del niño sano:

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 7 a 10. ✓
- ☐ b. De 3 a 5.
- ☐ c. De 10 a 12.
- ☐ d. 8.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?

Seleccione una:

- ☐ a. De 1 a 2 minutos.
- ☒ b. De 3 a 5 minutos. ✓
- ☐ c. Cada 10 minutos.
- ☐ d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Diastólica (TAD) de un niño entre los 8 y 10 años medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- ☐ a. 60-80 mmHg.
- ☐ b. 95 mmHg.



c. 50-80 mmHg.



d. 55-90 mmHg. ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un cuidado post-parada:

Seleccione una:



a. Vía aérea avanzada.



b. Control de temperatura.



c. Mantener oxigenación.



d. Retirar capnografía. ✓

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En una OVACE, con tos productiva y sospechando obstrucción parcial, NO es correcto:

Seleccione una:



a. Incentivar y animar a toser.



b. Prepararse para una mala evolución de la obstrucción.



c. Vigilar la posible salida del cuerpo extraño de la o en la orofaringe.



d. Realizar al paciente 5 compresiones abdominales, colocándolo para ello tumbado en el suelo. ✓

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el test de APGAR la puntuación mínima será:

Seleccione una:

- ☒ a. 0. ✓
- ☐ b. 3 como en la escala de coma de glasgow, no puede existir la puntuación 0.
- ☐ c. 2.
- ☐ d. 1.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la dosis de Amioradona que se administra tras la 5ª descarga en PCR-A:

Seleccione una:

- ☐ a. 300 mg.
- ☐ b. 120 mg.
- ☒ c. 150 mg. ✓
- ☐ d. 200 mg.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "H" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- ☐ a. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hiperpotasemia.
- ☐ b. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hipertermia.
- ☒ c. 1)Hipovolemia 2)Hipoxia 3)Hidrogeniones (acidosis) 4)Hipo e Hiper potasemia 5)Hipotermia. ✓
- ☐ d. Son sólo 4 "H": 1)Hipotermia 2)Hipotiroidismo 3)Hipopotasemia 4)Hiperpotasemia.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP pediátrica la relación compresiones torácicas - ventilaciones es

Seleccione una:

- ☐ a. 10:1.
- ☐ b. 11:15.
- ☒ c. 15:2 ✓
- ☐ d. 5:2.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. El médico.
- ☐ b. El centro coordinador.
- ☒ c. El aspirador de secreciones. ✓
- ☐ d. El cardio-compresor.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A que potencia se dan las descargas en un desfibrilador manual monofásico en caso de PCR por TVSP y/o FV:

Seleccione una:

- ☒ a. 360 julios. ✓
- ☐ b. 120 julios.



c. 150 julios.



d. 200 julios.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte súbita, implica:

Seleccione una:



a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓



b. Posible donación en asistolia controlada.



c. Una PCR refractaria que precisara E-RPC (ECMO).



d. Posible donante, sólo si porta el carné que lo identifique como tal.