

Comenzado el	jueves, 10 de agosto de 2017, 12:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 10 de agosto de 2017, 12:43
Tiempo empleado	13 minutos 19 segundos
Puntos	11,00/15,00
Calificación	7,33 de 10,00 (73%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al prolongarse el tratamiento con vancomicina durante seis semanas, se debería empezar a administrarla por vía oral en cuanto el paciente mejore clínicamente

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como alternativa a la vancomicina en el tratamiento de infecciones por MRSA se puede emplear la teicoplanina o el linezolid

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mecanismo de acción de las penicilinas consiste en bloquear la síntesis de la pared bacteriana

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal mecanismo de resistencia a los antibióticos B-lactámicos es la producción de B-lactamasas

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de Mario, al ser un paciente joven no hubiera sido necesaria la monitorización de las concentraciones plasmáticas de vancomicina y gentamicina

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es necesario asegurar una adecuada hidratación de paciente y controlar la excreta de líquidos

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La administración intravenosa de vancomicina en infusión rápida (<1 hora) puede provocar una reacción de tipo alérgico denominada síndrome del cuello rojo

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cloxacilina actúa como bacteriostático

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cloxacilina se asocia habitualmente con ácido clavulánico

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La metadona aparte de emplearse en el tratamiento de deshabituación de drogas se puede emplear como analgésico

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ototoxicidad producida por aminoglucósidos es reversible en todos los casos

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los aminoglucósidos son fármacos prácticamente inocuos que no presentan reacciones adversas significativas

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los hemocultivos se han de recoger antes de comenzar el tratamiento antibiótico

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No se debería haber comenzado el tratamiento antibiótico hasta haber identificado el agente etiológico

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la monitorización de gentamicina es necesario extraer dos muestras de sangre, un valle 5 minutos antes de la administración de la siguiente dosis y un pico 30 minutos después de que haya terminado la infusión del fármaco

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero