



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

La evolución clínica de los pacientes con AME II se caracteriza por... ¿Cuál de las siguientes afirmaciones?

a) Los pacientes presentan una progresión lineal.

b) Los pacientes presentan una fase inicial con un declive relativamente rápido y luego una fase de estabilidad relativa con una lenta progresión de la debilidad y pérdida de las funciones.

c) Una de las escalas recomendada para medir la evolución y efectividad en los pacientes AME II es la CHOP INTEND.

x d) Una de las escalas más empleadas para medir la evolución y efectividad de los nuevos tratamientos en los pacientes con AME II es la escala HINE (Hammersmith Infant Neurological Exam).

e) Los pacientes AME II generalmente no desarrollan escoliosis.

< Anterior

Siguiente >





📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto en la AME tipo IV?:

a) La AME tipo IV puede empezar en cualquier momento de la vida.

x b) La esperanza de vida no suele verse afectada.

c) Esta forma de la enfermedad también se denomina de Kugelberg-Welander.

d) Los síntomas de la enfermedad se limitan a las extremidades inferiores y nunca en las superiores.

e) Se denomina AME tipo IV porque los pacientes presentan 4 copias del gen SMN2.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?:

a) La AME tipo I, como es autosómica recesiva, se encuentra con mayor frecuencia en poblaciones africanas.

b) Es una causa genética poco frecuente entre las enfermedades genéticas neurológicas degenerativas.

c) La incidencia de AME es de 1/20.000 a 50.000 nacidos vivos.

☒ d) Hay que sospechar AME incluso en ausencia de consanguinidad.

e) Es algo más frecuente en varones, por mecanismos epigenéticos.

< Anterior

Siguiente >



❗ Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (naciones-basicas-para-una-adecuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espal/ encuesta).

🏠 (./) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15

📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?:

x a) La AME I es la forma más frecuente de AME.

b) Hay más riesgo de que un niño afectado tenga una forma tipo I si ambos padres tienen menos de dos copias de SMN2 que si tienen más.

c) La insuficiencia respiratoria de AME tipo I es más precoz y grave por la afectación del diafragma que por los intercostales.

d) En las familias con más de un afectado lo más frecuente es que haya gran variabilidad fenotípica (coexistencia de formas graves y leves dentro de la misma familia).

e) La AME I tiene con frecuencia afectación de la musculatura ocular intrínseca. Respuesta correcta: a). Todas las demás respuestas son incorrectas.

< Anterior

Siguiente >





📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Con qué frecuencia se recomienda reevaluar la función respiratoria en la AME tipo I?:

a) Mensualmente los primeros 6 meses.

b) Con ocasión de cada infiltración intratecal de nusinersén.

c) Cada 3 meses.

☒ d) Cada 6 meses.

e) Solo es necesaria si hay sintomatología respiratoria.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Qué frecuencia teórica tiene un tío de primer grado de un paciente con AME (hermano de la madre o del padre) de ser portador heterocigoto?:

☒ a) Hasta un 50 %.

☐ b) Hasta un 25 %.

☐ c) Hasta un 12,5 %.

☐ d) Hasta un 6,25 %.

☐ e) Hasta un 3,1 %.

[< Anterior](#)

[Siguiente >](#)



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

El tratamiento con nusinersén está indicado en:

☒ a) AME tipo I con al menos 2 copias de SMN2.

☐ b) En todo AME tipo I.

☐ c) Precozmente en AME tipo I con una copia de SMN2.

☐ d) En las AME tipo I que llegan a sostener la cabeza.

☐ e) Para su autorización no es necesario determinar el número de copias de SMN2.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Cuál de los siguientes síntomas/signos suele hallarse de manera precoz en los pacientes con AME?:

☒ a) Fasciculaciones linguales.

☐ b) Cardiopatía.

☐ c) Sordera neurosensorial.

☐ d) Diplejía facial.

☐ e) Problemas cognitivos.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

Con relación a la AME tipo IIIb, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a) Son pacientes que inician los síntomas antes de los 18 meses.

b) Pacientes que pueden caminar, pero no se pueden levantar del suelo.

c) Es como se clasifica a los AME III no ambulantes.

☒ d) Pacientes AME III que inician los síntomas después de los 3 años de edad.

e) Las formas IIIb tienden a perder la capacidad de caminar antes de la pubertad.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

La clasificación de los diferentes tipos de AME se basa en:

a) La edad de inicio de los síntomas.

b) La capacidad de caminar.

c) El número de copias del gen SMN2.

d) La necesidad de ventilación mecánica.

☒ e) La edad de inicio de síntomas y la máxima capacidad motora alcanzada.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adecuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

Con relación a las nuevas terapias, las siguientes afirmaciones son todas correctas, excepto:

a) Las terapias de moléculas pequeñas y los oligonucleótidos antisentido actúan para modificar el mecanismo de splicing del gen SMN2.

x b) La terapia génica actúa sobre el gen SMN2.

c) La primera terapia aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es el nusinersén.

d) Los resultados preliminares de los ensayos clínicos de la terapia génica y las moléculas pequeñas muestran un efecto positivo y adecuado perfil de seguridad.

e) Cuanto antes se inicie el tratamiento, el efecto de tratamiento es mayor.

< Anterior

Siguiente >





📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Cuál es el tipo de AME que presenta la mayor incidencia?:

a) Todas las formas de AME tienen la misma incidencia.

b) La AME II es la que presenta mayor incidencia.

c) La AME III es la más frecuente.

☒ d) La AME tipo I es la de mayor incidencia y primera causa de mortalidad de origen neuromuscular en los menores de 1 año.

e) La AME tipo II es la que tiene menor incidencia.

< Anterior

Siguiente >



📢 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

Con relación a la presentación de la AME tipo III, las siguientes afirmaciones son ciertas, excepto:

a) El temblor es un dato característico.

✗ b) Todos los pacientes son capaces de caminar, pero algunos tienen dificultad para levantarse del suelo o subir escaleras.

c) Es característico el apoyo valgo de los pies.

d) Las enzimas musculares son siempre normales.

e) En algunos casos, las enzimas musculares pueden estar elevadas.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

Con relación al patrón de la debilidad muscular en la atrofia muscular espinal (AME) ligada al gen SMN1, es cierto que:

a) Se caracteriza por debilidad de la musculatura distal de las extremidades superiores en la fase inicial de la enfermedad.

b) La afectación de la movilidad ocular es un signo típico.

c) La debilidad es simétrica de predominio en la musculatura proximal, con mayor afectación de las extremidades inferiores que superiores.

✖ d) La afectación de la debilidad de la musculatura respiratoria aparece de forma precoz en todos los tipos de AME.

e) La mayoría de los pacientes presentan debilidad de la musculatura facial y ptosis.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

Con relación a las complicaciones ortopédicas en los pacientes AME III, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

☒ a) Desarrollan escoliosis precoz.

☐ b) Desarrollan escoliosis en la misma proporción que los pacientes AME II.

☐ c) Los pacientes con pérdida de ambulación precoz antes de la pubertad deben seguir los mismos controles que los pacientes AME II y tienen riesgo de desarrollar escoliosis.

☐ d) La pérdida de la ambulación no está relacionada con el desarrollo de escoliosis.

☐ e) Nunca desarrollan escoliosis.

< Anterior

Siguiente >



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto en la AME tipo III?:

a) Los primeros síntomas pueden aparecer a partir del año de vida.

☒ b) La mayoría de estos pacientes pueden mantenerse de pie y caminar.

c) Estos pacientes nunca presentan disfunción bulbar.

d) Los pacientes con AME tipo III presentan atrofia distal, por lo que, si se detecta pseudohipertrofia de pantorrillas, esta nos debe orientar hacia otros diagnósticos.

e) Todos los pacientes con diagnóstico de tipo III son adultos.

[< Anterior](#)

[Siguiente >](#)



📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

Con relación a la historia natural de la AME tipo I, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- ☐ a) Los pacientes generalmente logran el control cefálico, pero lo hacen en un tiempo más tardío que la población general.
- ☐ b) Si el paciente logra el control cefálico, no lo perderá.
- ☐ c) Los pacientes con AME tipo I no presentan dificultad en la deglución.
- ☐ d) La mayoría de los pacientes superan los primeros 2 años sin necesidad de gastrostomía o ventilación invasiva.
- ☒ e) Los pacientes con AME I pierden progresivamente las escasas habilidades motoras alcanzadas y la sobrevida es menor a los 2 años sin ventilación mecánica.

< Anterior

Volver al contenido (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/contenido)





📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta encuesta de valoración del curso (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15 📍 16 📍 17 📍 18

📍 19 📍 20

En relación a la escoliosis, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?:

a) La escoliosis se presenta sobre todo en pacientes capaces de sentarse, pero no de deambular.

b) La fisioterapia no afecta al desarrollo de escoliosis.

c) Los corsés previenen la escoliosis.

d) El tratamiento quirúrgico nunca es el tratamiento de elección de la escoliosis.

x

 e) La mayoría de los pacientes con AME desarrollan una escoliosis con ángulo de Cobb de la curvatura mayor superior o igual a 50°.

< Anterior

Siguiente >





📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adecuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15 📍 16 📍 17 📍 18

📍 19 📍 20

¿Qué aspecto no es importante en la AME?:

a) La valoración de la insuficiencia respiratoria.

b) La valoración de la deglución.

x

c) La evaluación nutricional.

d) Las vacunaciones en regla, incluidas la antigripal y tratamiento preventivo de infección por virus respiratorio sincitial.

e) La prevención de insuficiencia hepática y renal.

< Anterior

Siguiente >





📌 Ayúdanos a mejorar cumplimentando esta **encuesta de valoración del curso** (nociones-basicas-para-una-adeuada-atencion-multidisciplinar-del-paciente-con-atrofia-muscular-espinal/encuesta).

🏠 (/) / Usuario / Mejor calificación del test de evaluación final

Mejor calificación del test de evaluación final

Preguntas del test final	Preguntas respondidas	Aprobado	Tiempo transcurrido	Resultado
20	20	65%	71 min. 41 ^{secs}	Suspenso

📍 1 📍 2 📍 3 📍 4 📍 5 📍 6 📍 7 📍 8 📍 9 📍 10 📍 11 📍 12 📍 13 📍 14 📍 15
📍 16 📍 17 📍 18 📍 19 📍 20

En relación a las manifestaciones respiratorias en la AME, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?:

- ☒ a) Todos los niños con AME tipo I y alrededor de un tercio de los niños con AME tipo II presentarán insuficiencia respiratoria durante la infancia.
- ☐ b) La afectación suele ser inicialmente diafragmática y la musculatura intercostal se afecta más tardíamente.
- ☐ c) Únicamente está indicada la inmunización contra la gripe, el neumococo y el virus VRS durante los primeros 2 años de vida.
- ☐ d) En los pacientes con AME tipo I y II, la progresión de la enfermedad suele comportar la necesidad de iniciar ventilación mecánica con presión positiva continua con CIPAP.
- ☐ e) Las respuestas c) y d) son correctas.

< Anterior

Siguiente >