

Pregunta 1

¿Qué definición tiene el dolor total?

La respuesta correcta es: El dolor que suma aspectos físicos, psicoemocionales, sociales y espirituales

Pregunta 2

A la hora de iniciar el tratamiento farmacológico en el paciente anciano:

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 3

Enunciado de la pregunta

¿Qué escala de valoración de dolor sería más adecuada para aplicar en un niño de 11 años?

La respuesta correcta es: Escala numérica.

Pregunta 4

Señala tres de las terapias complementarias más utilizadas en Cuidados Paliativos.

La respuesta correcta es: Musicoterapia, Reiki y arteterapia.

Pregunta 5

¿Qué deberemos tener en cuenta respecto al tratamiento del dolor al llegar el fin de semana en el paciente en casa?

La respuesta correcta es: a, b y c son correctas.

Pregunta 6

De las siguientes respuestas ante el dolor señale la incorrecta en un niño de dos años

La respuesta correcta es: No recuerda experiencias previas

Pregunta 7

Señala los signos y síntomas de toxicidad opioide

La respuesta correcta es: A, B y C son correctas

Pregunta 8

Cuando se valora el dolor en los niños con la escala LLANTO no es necesario tener en cuenta:

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca

Pregunta 9

Las características que identifican un dolor de etiología orgánica incluyen:

La respuesta correcta es: A, B y D son correctas.

Pregunta 10

¿Cuál es la dimensión espiritual del dolor?

Las respuestas correctas son: Es la visión religiosa del dolor., a y d son correctas.

Pregunta 11

Correcta

Entre los factores que modifican la respuesta farmacológica en el anciano se encuentran:

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 12

En el dolor agudo en niños se valora:

La respuesta correcta es: Cualquiera de los anteriores.

Pregunta 13

Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 14

La escala de valoración del dolor que se utiliza en la demencia avanzada es:

La respuesta correcta es: Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD).

Pregunta 15

¿Qué asociación de fármacos se utiliza en el segundo escalón del tratamiento del dolor pediátrico?

La respuesta correcta es: AINES+opiáceo débil.

Pregunta 16

¿Cuál es la escala o índice más utilizado en Cuidados Paliativos para medir el dolor?

La respuesta correcta es: Escala EVA.

Pregunta 17

Entre los signos y síntomas no específicos del dolor en el anciano se encuentran:

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.