

## AHORA ES TU TURNO. DEMUESTRA LO APRENDIDO.

¡Enhorabuena! Usted contestó un 96% de respuestas correctas. Por tanto, ha superado el test.

- Según la última encuesta ESTUDES sobre el consumo de drogas en España, NO es cierto que:  
Complejidad de la prevención en el adolescente
  - En el último año han iniciado el consumo de tabaco 137.000 adolescentes.
  - Entre los 14 y los 18 años, se calcula que aproximadamente uno de cada cuatro ha fumado en el último mes.
  - Entre los 14 y los 18 años, el 9% fuma a diario.
  - Los estudiantes entre 14 y 18 que consumen tabaco a diario, fuman una media de 5,6 cigarrillos al día.
  - Según esta encuesta, la mayoría roba dinero para poder financiar este consumo.**
- En relación con el consumo de alcohol en la adolescencia, señale la opción CORRECTA:  
Complejidad de la prevención en el adolescente
  - En el último año han iniciado el consumo de esta sustancia menos de 50.000 adolescentes.
  - Un 72% de los estudiantes de 17 años reconoce hacer botellón.**
  - Más de la mitad de los adolescentes reconoce haberse emborrachado en el último mes.
  - Entre el 15% y el 20% reconoce beber a diario.
  - A los 14 años prácticamente el 60% reconoce hacer botellón.
- Respecto a la infección por VPH y su vacunación:  
Complejidad de la prevención en el adolescente
  - Se calcula que entre un 25 y un 30% de los hombres y mujeres sexualmente activos lo pueden contraer en algún momento de su vida.
  - En España, la vacunación de las niñas está incluida en el calendario vacunal desde 2015, para edades comprendidas entre los 11 y los 14 años.
  - En 2016 se consiguió una tasa de vacunación en niñas del 95,3%.
  - La vacunación en niños está incluida a día de hoy en los calendarios vacunales de países como Austria, Croacia, Italia, Suiza, Suecia, o Canadá entre otros.**
  - En España no existen diferencias entre las diferentes comunidades autónomas respecto a la recomendación y financiación de esta vacuna en varones.
- ¿Cuál de las siguientes es una barrera de los padres para la vacunación del VPH en varones?  
Complejidad de la prevención en el adolescente
  - Limitaciones de tiempo.
  - No tener la recomendación de un médico.**
  - Preocupación anticipatoria al dolor de la inyección.
  - Su escaso papel en la toma de decisiones sobre la vacunación.
  - Exceso de conocimiento sobre la vacuna.
- ¿Cuál de las siguientes NO es una barrera de paciente en la aceptación de la vacuna del VPH?  
Complejidad de la prevención en el adolescente









