Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

Comenzado el	lunes, 15 de junio de 2020, 20:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 15 de junio de 2020, 20:51
Tiempo empleado	29 minutos 8 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	**9,00** de 10,00 (**90%**)
Comentario	Apto

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Finalizar revisión

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Ante un taponamiento cardiaco, el diagnóstico se realizaría por?.

Seleccione una:
- a. EKG de 12 derivaciones
- b. Tensión arterial y Frecuencia cardiaca alterados
- c. Ecografía cardiaca ✓
- d. Analítica con enzimas cardiacas

ecografía por personal entrenado en metodo FAST
La respuesta correcta es: Ecografía cardiaca

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál de estos orificios no presenta el músculo diafragma?

Seleccione una:
- a. Aórtico y vena cava inferior
- b. Esofágico
- c. Cúbitico ✓
- d. Todos son correctos

presenta 3 orificios: aórtico, vena cava inferior y esofágico
La respuesta correcta es: Cúbitico

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Para un paciente con neumotórax a tensión, ¿en qué región anatómica puedes pinchar para descomprimir?

Seleccione una:
- a. 4ª espacio intercostal línea media clavicular
- b. 2º espacio intercostal línea media axilar
- c. 5º espacio intercostal línea media axilar ✓
- d. Todas son correctas

se puede pinchar también en 2º espacio intercostal línea media clavicular
La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal línea media axilar

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En el neumotórax a tensión, señale la falsa:

Seleccione una:
- a. Existen una lesión penetrante ✓
- b. Hay una rápida entrada unidireccional de aire en la pleura
- c. Puede comprimir vasos importantes
- d. Puede obstruir el retorno venoso al corazón

no existe lesión penetrante como causa principal
La respuesta correcta es: Existen una lesión penetrante

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando valoramos mediante la palpación, vigilaremos:

Seleccione una:
- a. Escuchar la correcta ventilación de ambos pulmones
- b. Simetría de ambos campos ✓
- c. Aparición de hematomas
- d. Todas son correctas

simetría de ambos campos, si hay correcta expansión o deformidades
La respuesta correcta es: Simetría de ambos campos

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valorar?.

Seleccione una:
- a. Tórax
- b. Abdomen
- c. Vía aérea
- d. Todas son correctas ✓

mediante estas herramientas podemos valorar signos y síntomas de múltiples patologías
La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El área precordial está delimitada por:

Seleccione una:
- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior ✓
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba
- d. Ninguna es correcta



La respuesta correcta es: Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El área toracoabdominal está delimitado por:

Seleccione una:
- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior ✓
- c. Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba
- d. Ninguna es correcta



La respuesta correcta es: Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La acumulación de sangre en tórax menor que 1500 ml se denomina:

Seleccione una:
- a. Neumotórax abierto
- b. Hemotórax simple ✓
- c. Hemotórax masivo
- d. Neumotórax a tensión

si es mayor de 1500 ml se denomina hemotórax masivo
La respuesta correcta es: Hemotórax simple

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El volet costal:

Seleccione una:
- a. El manejo inicial será la ICT precoz anticipándonos al empeoramiento del paciente
- b. La ventilación con presión positiva está contraindicada
- c. El objetivo principal será el control del dolor ✓
- d. Está indicada la inmovilización de la caja torácica para evitar dolor

también se puede administrar oxígeno para mantener?pO2 y la reposición con volumen debe ser cuidadosa. El manejo avanzado de la vía aérea puede ser necesario, pero no tiene porqué ser la primera opción
La respuesta correcta es: El objetivo principal será el control del dolor

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuál de estos signos no aparece en la rotura traqueobronquial:

Seleccione una:
- a. Bradipnea ✓
- b. Palidez y sudoración
- c. Descenso de SpO2
- d. Enfisema subcutáneo

además de taquipnea, disnea, angustia, inquietación yugular, hemoptisis...
La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 12
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La diferencia entre fractura costal y volet costal es:

Seleccione una:
- a. En el volet se dan de 2 o más fracturas de la misma costilla ✗
- b. En la fractura costal puede llegar a desgarro muscular, pulmones y vasos
- c. En el volet costal, la reparación quirúrgica no es una opción terapeútica
- d. A y b son correctas

la reparación quirúrgica puede ser necesario, para reparar esas fracturas en la misma costilla
La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál de estas estructuras es fija y puede producir rotura aórtica?

Seleccione una:
- a. Inicio de aorta descendente ✓
- b. Arco aórtico
- c. Aorta ascendente
- d. Todas son estructuras móviles

el inicio de la aorta descendente está fija a la columna vertebral
La respuesta correcta es: Inicio de aorta descendente

Pregunta 14
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Sobre el taponamiento cardiaco:

Seleccione una:
- a. Es un acúmulo de sangre en cavidades cardiacas
- b. Afecta al gasto cardiaco
- c. La tensión arterial se eleva
- d. A y b son correctas ✗

acúmulo de sangre en pericardio, hipotensión arterial y afecta al gasto cardiaco
La respuesta correcta es: Afecta al gasto cardiaco

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El tratamiento definitivo del taponamiento cardiaco es:

Seleccione una:
- a. Pericardiocentesis
- b. Quirúrgico ✓
- c. Infusión rápida de a.adrenérgicos
- d. Todas son correctas

el tratamiento quirúrgico es el definitivo
La respuesta correcta es: Quirúrgico

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La rotura traqueobronquial:

Seleccione una:
- a. Es común y potencialmente leve
- b. Produciada por lesiones de baja energía
- c. Es una lesión de la traquea intratorácica o alguno de los bronquios ✓
- d. Todas son correctas

es rara, pero letal, provocada por lesiones de alta energía
La respuesta correcta es: Es una lesión de la traquea intratorácica o alguno de los bronquios

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

A qué altura se encuentra el diafragma en espiración forzada:

Seleccione una:
- a. 3º y 5º espacios intercostales
- b. 6º y 7º espacios intercostales
- c. 4º y 5º espacios intercostales ✓
- d. 2º y 3º espacios intercostales

varía según el momento respiratorio
La respuesta correcta es: 4º y 5º espacios intercostales

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El área de los grandes vasos torácicos está delimitada por:

Seleccione una:
- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba ✓
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El hemoneumotórax suele ser causado por:

Seleccione una:
- a. Heridas de bala
- b. Asta de toro
- c. Empalamiento
- d. Todas son correctas ✓

además de arma blanca, metralla, esquirlas óseas...
La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál es la situación más común dentro de las lesiones cardiacas cerradas?

Seleccione una:
- a. Taponamiento cardiaco
- b. Rotura valvular
- c. Contusión cardiaca ✓
- d. Rotura cardiaca

la contusión cardiaca es la más frecuente
La respuesta correcta es: Contusión cardiaca

Finalizar revisión

Volver a: Módulo 4: Actua ◀

©2020 FUDEN Fundación para el desarrollo de la Enfermería
FUDEN | Condiciones de uso | Política de protección de datos | Política de cookies | Seguridad | Ayuda | Foros