

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

La ropivacaína:

Seleccione una:

- ☐ a. No se usa en obstetricia
- ☐ b. Es poco potente
- ☒ c. Es similar a la bupivacaína ✓
- ☐ d. Es de tipo éter

La respuesta correcta es: Es similar a la bupivacaína

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

El nifedipino no se usa:

Seleccione una:

- ☐ a. Como antihipertensivo
- ☒ b. Para el embarazo ectópico ✓
- ☐ c. Como tocolítico
- ☐ d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Para el embarazo ectópico

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

La hidroxicina:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene efectos antiagregantes
- ☐ b. Tiene efectos antianginosos
- ☒ c. Tiene efectos sedantes ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Tiene efectos sedantes

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

La ritodrina:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un antiemético
- ☐ b. Es un fármaco colinérgico
- ☒ c. Es un tocolítico ✓
- ☐ d. Es un antiácido

La respuesta correcta es: Es un tocolítico

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

El dolor de las contracciones en la parturienta:

Seleccione una:

- ☐ a. Deprime el SNC
- ☐ b. Deprime al feto
- ☐ c. Causa miosis
- ☒ d. Estimula la respiración ✓

La respuesta correcta es: Estimula la respiración

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

La oxitocina:

Seleccione una:

- ☒ a. Puede causar intoxicación acuosa ✓
- ☐ b. Frena la contracción uterina
- ☐ c. Causa hipertensión
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Puede causar intoxicación