

[Página Principal](#) > [IT.Q002](#) > [Módulo 2. Ecografía aplicada al acceso vascular venoso en adultos](#)

[Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el	jueves, 28 de marzo de 2024, 18:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 28 de marzo de 2024, 21:10
Tiempo empleado	2 horas 13 minutos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes con más riesgo de salida accidental del catéter como ancianos, niños, pacientes agitados o en casos en los que la piel tenga alergias o intolerancias a apósitos estará indicado el uso de:

Seleccione una:

- a. Sistemas de fijación sin sutura.
- b. Puntos de sutura, dado su elevado riesgo de salida.
- c. Sistemas de fijación sin sutura con vendaje oclusivo.
- d. Sistema de anclaje subcutáneo. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se posicionará la sonda para la comprobación de la punta del midline?

Seleccione una:

- a. En la zona verde de Dawson.
- b. En la zona media infraclavicular. ✓
- c. En zona amarilla de Dawson.
- d. En la zona media supraclavicular.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso del ultrasonido (sonda lineal) intraprocedimiento permítelas siguientes acciones excepto:

Seleccione una:

- a. Confirmar ecográficamente que el catéter no ha avanzado hacia ninguna de las venas yugulares.
- b. Ejercer presión sobre la vena yugular interna del lado ipsilateral con la sonda para comprimirla y así facilitar el paso del catéter.
- c. Confirmación de la posición central de la punta del catéter. ✓
- d. Verificación de la dirección correcta del catéter realizando un control ecográfico las venas del área supraclavicular según se va avanzando el mismo.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se procederá a pelar y retirar el microintrodutor...señala la correcta:

Seleccione una:

- a. Una vez que se ha introducido el PICC hasta la distancia estimada o una vez que se comprueba mediante IC-ECG. ✓
- b. Una vez que se retira la guía y su parte interna se puede empezar a pelar para evitar sangrado.
- c. Una vez que se hayan introducido 5cm del catéter.
- d. Antes de introducir el catéter previamente purgado con suero salino.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al uso de anestésicos locales durante la colocación del catéter señala la respuesta falsa.

Seleccione una:

- a. Es imprescindible comprobar posibles alergias del paciente.
- b. Debe haber una prescripción médica del fármaco o bien estar protocolarizado.
- c. Al realizarse bajo visión ecográfica se considera una práctica segura y recomendable.
- d. El uso de anestésicos locales no es un factor importante a tener en cuenta en la realización de la técnica de seldinger modificada. ✓

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Debido a las características de cada vena, el orden de preferencia más adecuado para la inserción ecoguiada del PICC es:

Seleccione una:

- a. Vena basílica, vena cefálica y venas braquiales.
- b. Venas braquiales, vena cefálica y vena basílica.
- c. Vena cefálica, vena basílica y venas braquiales.
- d. Vena basílica, venas braquiales y vena cefálica. ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué zona de las propuestas por R. Dawson en el método ZIM corresponde con una zona con elevado riesgo de punciones no exitosas, complicaciones trombóticas, infecciosas y riesgo de malposición del catéter?

Seleccione una:

- a. Zona amarilla.
- b. Zona roja. ✓
- c. Zona verde.
- d. No corresponde con ninguna zona.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se procederá a retirar el microintrodutor... Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Una vez se haya realizado el control radiológico en caso de no tener ECG- IC.
- b. Tras realizar la progresión completa del catéter se pelará para permitir su paso a través de él sólo se retirará la parte interna de éste.
- c. Cuando se compruebe que las luces infunden y refluyen sin dificultad.
- d. Una vez que se haya introducido el PICC hasta la distancia estimada o se haya comprobado su posición central mediante ECG-IC y se compruebe que las luces refluyen e infunden sin dificultad. ✓

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La posición anatómica adecuada para la localización de la punta del catéter es:

Seleccione una:

- a. El tercio superior de la vena cava superior hacia la unión cavo-auricular.
- b. El tercio inferior de la vena cava superior hacia la unión cavo-auricular. ✘
- c. El tercio inferior de la vena cava inferior hacia la unión cavo-auricular.
- d. El tercio superior de la vena cava inferior hacia la unión cavo-auricular.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La posición anatómica adecuada para la localización de la punta del catéter es:

Seleccione una:

- a. El tercio superior de la vena cava superior hacia la unión cavo-auricular.
- b. El tercio inferior de la vena cava superior hacia la unión cavo-auricular. ✔
- c. El tercio inferior de la vena cava inferior hacia la unión cavo-auricular.
- d. El tercio superior de la vena cava inferior hacia la unión cavo-auricular.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas consideraciones a cerca de la línea media o midline es verdadera?

Seleccione una:

- a. Es una vía venosa central de acceso periférico.
- b. Es una vía venosa periférica corta de larga duración.
- c. Es una vía venosa periférica de media duración. ✔
- d. Es una vía venosa periférica corta.
- e. Aquellos con un pH entre 5-9 y una osmolaridad menor que 600mOsm/L.
- f. Aquellos con un pH menor que 5 y una osmolaridad menor que 600mOsm/L.
- g. Aquellos con un pH mayor que 9 y una osmolaridad menor que 600mOsm/L.
- h. Aquellos con un pH entre 5-9 y una osmolaridad mayor que 600mOsm/L.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La exploración ecográfica se realizará con la sonda:

Seleccione una:

- a. Plano longitudinal o eje largo.
- b. Plano longitudinal o eje corto.
- c. Plano transversal o eje largo.
- d. Plano transversal o eje corto. ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficios ofrece la técnica de tunelización? Señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- a. Limita los riesgos infecciosos al crear una barrera con la propia piel que protege el catéter alejando el punto de inserción.
- b. Al poder acceder a venas de menor calibre existe más riesgo de eventos trombóticos. ✓
- c. El tejido subcutáneo se adhiere al dispositivo y dificulta su salida.
- d. El protocolo RAVESTO permite estandarizar la evaluación rápida del punto de salida del catéter.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El eje nervio-vascular o paquete braquial está formado por las siguientes estructuras:

Seleccione una:

- a. Vena cefálica, vena braquial, arteria braquial y nervio mediano.
- b. Vena basílica, vena axilar, arteria radial y nervio mediano.
- c. Venas braquiales, arteria braquial y nervio mediano. ✓
- d. Venas braquiales, arteria radial y nervio mediano.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método ZIM propone la división del brazo en:

Seleccione una:

- a. Dos partes iguales desde la zona media del brazo hasta el olecranon.
- b. Tres partes iguales desde la zona media del brazo hasta el olecranon.
- c. Cuatro partes iguales desde el acromion hasta el olecranon.
- d. Tres partes iguales desde el acromion hasta el olecranon. ✓

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la canalización del PICC es falsa?

Seleccione una:

- a. Trás la retirada de la aguja se realizará un corte superficial de la piel con la ayuda del bisturí.
- b. Se insertará el pelo metálico a través de la aguja por su extremo recto pero blando.
- c. Se introducirá el catéter a través de microintrodutor y se purgarán con suero fisiológico las luces del PICC. ✓
- d. A través de la guía metálica se introduce el microintrodutor pelable ejerciendo una pequeña presión.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes con más riesgo de salida accidental del catéter como ancianos, niños, pacientes agitados o en casos en los que la piel tenga alergias o intolerancias a apósitos (MARS!) estará indicado el uso de:

Seleccione una:

- a. Sistemas de fijación sin sutura.
- b. Puntos de sutura, dado su elevado riesgo de salida.
- c. Sistemas de fijación sin sutura con vendaje oclusivo.
- d. Sistema de anclaje subcutáneo. ✓

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala respuesta falsa respecto a la punción en plano transversal estática:

Seleccione una:

- a. Se realizará la sujeción de la sonda con la mano no dominante.
- b. Se trata de un tipo de punción con una curva de aprendizaje corta.
- c. Se debe colocar el vaso objetivo en el centro de la pantalla.
- d. No es necesario tener en cuenta la profundidad del vaso. ✓

Pregunta

19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La localización de la correcta posición del PICC en la radiografía de tórax es...

Seleccione una:

- a. A 3 cm de distancia de la carina traqueal.
- b. A 5 cm de distancia de La unión cavo-auricular.
- c. A nivel de la 4º vertebra torácica. ✗
- d. A 2 cm de distancia de la 4º vertebra torácica.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el orden prioritario de elección atendiendo a las características de las venas para la canalización de PICC?

Seleccione una:

- a. Vena cefálica, basílica y axilar.
- b. Vena basílica, cefálica y axilar.
- c. Vena braquial, cefálica y basílica.
- d. Vena basílica, braquial y cefálica. ✓

Actividad previa

◀ Los Estándares de Práctica de la Terapia de Infusión 2016

Ir a...

Siguiente actividad

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>