

Examen Caso práctico I Agentes Citostáticos

Revisión del intento 1

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el	miércoles, 28 de enero de 2015, 18:01
Completado el	miércoles, 28 de enero de 2015, 18:03
Tiempo empleado	2 minutos 3 segundos
Puntos	14/15
Calificación	9.33 de un máximo de 10 (93%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

1 Ante una exposición accidental a Etoposido, se debe lavar la zona corporal afectada con agua y jabón.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

☐

a. Falso. ✖

☒

b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

2 Cuando el derrame se produce en una zona de paso, el área debe de aislarse para evitar la dispersión de la sustancia vertida.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

☒

a. Verdadero. ✔

☐

b. Falso. ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

3 El kit de derrame no tiene por qué contener mascarillas tipo FFP3.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

☒

a. Falso ✔

☐

b. Verdadero ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

4 En el caso de que se produzca un derrame de agentes citostáticos, podemos intervenir empleando guantes de latex de los que podemos encontrar en cualquier unidad.

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☒ a. Falso. ✓
- ☐ b. Verdadero. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

- 5 En el caso descrito es aconsejable la utilización de Chemozorb como sustancia absorbente.

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Falso. ✗
- ☒ b. Verdadero. ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

- 6 En el supuesto del derrame del caso descrito, en el que se produce una rotura de un recipiente de vidrio, las pautas de actuación son las mismas que en cualquier tipo de derrame.

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☒ a. Falso. ✓
- ☐ b. Verdadero. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

- 7 En los servicios en los que se prepara y administran agentes citostáticos deben tener un kit de derrame.

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Falso. ✗
- ☒ b. Verdadero. ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

- 8 En nuestro caso, como se trata de un derrame de un agente líquido, se debe absorber con un papel o gasa seca.

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☒ a. Verdadero. ✓
- ☐ b. Falso. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

- 9 En todos los centros que se manipulen agentes citostáticos debe existir un protocolo de actuación ante derrames.

Puntos:

- 1 Seleccione una respuesta.
- ☒ a. Verdadero. ✓
- ☐ b. Falso. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

10 En una exposición accidental a Etoposido, si aparece una irritación local, se debe aplicar una solución de bicarbonato

Puntos:
1

Seleccione una respuesta. ☐ a. Verdadero. ✖ ☒ b. Falso. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

11 La limpieza de la zona afectada debe realizarse siempre de la zona más afectada a la menos afectada.

Puntos:
1

Seleccione una respuesta. ☐ a. Verdadero. ✖ ☒ b. Falso. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

12 Las gafas de protección que se empleen en la recogida de un derrame de agentes citostáticos tienen que ser integrales.

Puntos:
1

Seleccione una respuesta. ☐ a. Falso. ✖ ☒ b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

13 Los EPI (Equipos de Protección Individual), empleados en un derrame, una vez finalizada la actuación se eliminan como residuo de clase III.

Puntos:
1

Seleccione una respuesta. ☒ a. Falso. ✔ ☐ b. Verdadero. ✖

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

14 Todo el personal implicado en la limpieza de un derrame tiene que ir provisto de todo el material de protección

Puntos:
1

Seleccione una respuesta. ☐ a. Falso. ✖ ☒ b. Verdadero. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

15 Un derrame puede producirse durante la elaboración, administración o transporte del agente citostático

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Verdadero. ✓
- ☐ b. Falso. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Finalizar revisión

Usted se ha autenticado como [JUAN MARTINEZ MORALES](#) ([Salir](#))

AMAC