

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AS-DC-PVMPE](#)
/ [Módulo VI: Farmacología del aparato respiratorio](#) / [Examen Módulo VI](#)

Comenzado el martes, 27 de febrero de 2018, 17:30

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 27 de febrero de 2018, 17:52

Tiempo empleado 22 minutos 6 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con cuál de los siguientes fármacos puede aparecer candidiasis orofaríngea:

Seleccione una:

- a. Glucocorticoides inhalados ✓
- b. Teofilina
- c. Anticolinérgicos
- d. Agonistas

La respuesta correcta es: Glucocorticoides inhalados

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes características de los fármacos agonistas B₂-adrenérgicos es falsa:

Seleccione una:

- a. Se pueden administrar por vía inhalatoria, oral y parenteral
- b. Los agonistas de acción prolongada se emplean en monoterapia ✓
- c. Los agonistas B₂-adrenérgicos son los broncodilatadores más rápidos que existen
- d. Como reacciones adversas pueden aparecer taquicardia y palpitaciones

La respuesta correcta es: Los agonistas de acción prolongada se emplean en monoterapia

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes indicaciones de los fármacos anticolinérgicos es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Bromuro de tiotropio se emplea como broncodilatador en las crisis asmáticas ✓
- b. Bromuro de tiotropio está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento en pacientes con EPOC
- c. Bromuro de ipratropio se emplea como alternativa en pacientes que no toleran el tratamiento con agonistas
- d. Bromuro de ipratropio se puede utilizar como coadyuvante de agonistas

La respuesta correcta es: Bromuro de tiotropio se emplea como broncodilatador en las crisis asmáticas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes reacciones adversas no es debida a la administración de codeína:

Seleccione una:

- a. Depresión respiratoria con dosis altas
- b. Nauseas
- c. Sedación
- d. Diarrea ✓

La respuesta correcta es: Diarrea

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguiente fármacos agonistas B2-adrenergicos es de acción prolongada:

Seleccione una:

- a. B: terbutalina
- b. A: formoterol
- c. A y C son correctos ✓
- d. C: salmeterol

La respuesta correcta es: A y C son correctos

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes fármacos mucolíticos no se puede administrar por vía inhalatoria:

Seleccione una:

- a. N- Acetilcisteina
- b. Carbocisteina ✓
- c. Mesna
- d. Dornasa alfa

La respuesta correcta es: Carbocisteina

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes fármacos se emplea como fármaco de rescate:

Seleccione una:

- a. Agonistas B2-adrenergicos de acción larga
- b. Agonistas B2-adrenergicos de acción rápida ✓
- c. Glucocorticoides sistémicos
- d. Glucocorticoides inhalados

La respuesta correcta es: Agonistas B2-adrenergicos de acción rápida

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes factores reducen la eliminación de teofilina:

Seleccione una:

- a. Embarazo
- b. Fiebre
- c. Ancianos ✓
- d. Fumadores de tabaco

La respuesta correcta es: Ancianos

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es uno de los errores más frecuentes en el manejo de inhaladores:

Seleccione una:

- a. C: Inspiración bucal en lugar de nasal
- b. A y B son ciertas ✓
- c. A: No realizar la apnea post-inspiratoria
- d. B: Inspiración demasiado rápida

La respuesta correcta es: A y B son ciertas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes analgésicos cuál puede exacerbar el asma:

Seleccione una:

- a. Codeína
- b. Paracetamol
- c. Tramadol
- d. AAS ✓

La respuesta correcta es: AAS

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes factores predisponentes que incrementan el riesgo de padecer asma uno es incorrecto:

Seleccione una:

- a. Edad
- b. Obesidad
- c. Factores genéticos
- d. Ejercicio ✓

La respuesta correcta es: Ejercicio

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo de empleo correcto de los dispositivos de polvo seco multidosis es:

Seleccione una:

- a. Destapar-agitar-espigar-colocar en la boca y comenzar a inspirar-disparar y terminar la inspiración-aguantar la respiración
- b. Destapar-cargar el dispositivo-espigar-colocar la boquilla entre los labios e inspirar-aguantar la respiración ✓
- c. Destapar-cargar el dispositivo -colocar la boquilla entre los labios-espigar- inspirar-aguantar la respiración
- d. Destapar-agitar-colocar en la boca- disparar-espigar- inspirar-aguantar la respiración

La respuesta correcta es: Destapar-cargar el dispositivo-espigar-colocar la boquilla entre los labios e inspirar-aguantar la respiración

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento del asma persistente grave (escalón 5) consiste en:

Seleccione una:

- a. Glucocorticoide inhalado a dosis baja de forma regular
- b. Glucocorticoide inhalado a dosis altas y un agonista ✓
- c. Glucocorticoide inhalado a dosis medias y un agonistas
- d. Glucocorticoide inhalado a dosis bajas y un agonistas

La respuesta correcta es: Glucocorticoide inhalado a dosis altas y un agonista

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la administración de los antagonistas del receptor de leucotrienos una de las siguientes recomendaciones es falsa

Seleccione una:

- a. Zafirlukast y los comprimidos masticables de montelukast deben tomarse en ayunas
- b. Montelukast se debe administrar por la noche
- c. Los comprimidos masticables de montelukast deben tomarse con alimentos ✓
- d. Los comprimidos recubiertos y la presentación en granulado de montelukast pueden administrarse con o sin alimentos

La respuesta correcta es: Los comprimidos masticables de montelukast deben tomarse con alimentos

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tratamiento de las agudizaciones asmáticas se suele emplear:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas ✓
- b. Oxígeno
- c. Agonistas
- d. Glucocorticoides sistémicos

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es cierto de ambroxol que:

Seleccione una:

- a. No se puede administrar por vía intravenosa
- b. Las reacciones adversas más frecuentes son dermatológicas
- c. Disminuye la secreción de las vías respiratorias
- d. La administración intravenosa excesivamente rápida puede provocar cefalea, dolor en piernas y postración ✓

La respuesta correcta es: La administración intravenosa excesivamente rápida puede provocar cefalea, dolor en piernas y postración

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué fármacos constituyen el tratamiento más efectivo del asma persistente:

Seleccione una:

- a. Antagonistas del receptor de leucotrienos
- b. Anticolinérgicos
- c. Agonistas
- d. Glucocorticoides inhalados ✓

La respuesta correcta es: Glucocorticoides inhalados

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inconveniente de los inhaladores de polvo seco unidosis:

Seleccione una:

- a. Permiten controlar si la dosis ha sido administrada
- b. No recomendados en crisis asmática ✓
- c. Puede repetirse la inhalación cuando aún queda polvo en la cápsula
- d. Eliminan la dificultad de sincronizar pulsación con inhalación

La respuesta correcta es: No recomendados en crisis asmática

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las siguientes diferencias entre asma y EPOC es incorrecta

Seleccione una:

- a. El asma puede aparecer a cualquier edad, mientras que la EPOC suele darse a partir de los 40 años
- b. Los pacientes asmáticos frecuentemente presentan rinitis, conjuntivitis y dermatitis, siendo infrecuente en los pacientes con EPOC
- c. En el asma la respuesta a glucocorticoides es muy buena, mientras que en la EPOC es variable
- d. En el asma la obstrucción es irreversible y en la EPOC es reversible. ✓

La respuesta correcta es: En el asma la obstrucción es irreversible y en la EPOC es reversible.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las siguientes sentencias sobre omalizumab es falsa:

Seleccione una:

- a. Una de las reacciones adversas que puede aparecer es anafilaxia
- b. Es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une selectivamente a la inmunoglobulina E
- c. Está indicado como tratamiento adicional en asma alérgico grave y persistente
- d. Se administra por vía intramuscular ✓

La respuesta correcta es: Se administra por vía intramuscular