

Comenzado el	miércoles, 16 de octubre de 2019, 18:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 16 de octubre de 2019, 18:11
Tiempo empleado	2 minutos 33 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define PH como:

Seleccione una:

- a. Presión parcial de dióxido de carbono
- b. Presión parcial de extracción del oxígeno de la sangre arterial
- c. Parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La administración de ON se realiza durante:

Seleccione una:

- a. Previo al inicio de la fase inspiratoria.
- b. La fase inspiratoria.
- c. La fase espiratoria.
- d. Durante ambas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fase inspiratoria.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los estudios realizados con respecto al uso del DP han demostrado que:

Seleccione una:

- a. Mejora la mortalidad.
- b. Disminuye los días del uso de ventilación mecánica.
- c. Produce una mejoría significativa en la oxigenación.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Produce una mejoría significativa en la oxigenación.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

EL SIMV es un modo de ventilación definido como:

Seleccione una:

- a. El paciente respira espontáneamente a través del ventilador y éste proporciona una presión inspiratoria predeterminada

- b. Combina la ventilación controlada con ventilación asistida (iniciada por el paciente)
- c. Periodos de respiración espontánea con un suplemento de O2
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combina la ventilación controlada con ventilación asistida (iniciada por el paciente)

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los criterios a reunir por los candidatos a un trasplante pulmonar son:

Seleccione una:

- a. Que tengan otra enfermedad significativa de otro órgano principal diferente al pulmón.
- b. Enfermedad pulmonar progresiva en situación avanzada.
- c. Edad superior a los 65 años.
- d. Que sean dependiente de un respirador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad pulmonar progresiva en situación avanzada.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con ECMO en el soporte circulatorio la presión de perfusión sistémica va a depender de:

Seleccione una:

- a. De las resistencias vasculares sistémicas.

- b. Del flujo de sangre (flujo de la bomba más gasto cardiaco del paciente)
- c. Todas son falsas.
- d. a y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal factor que limite el número de trasplantes de pulmón es:

Seleccione una:

- a. La elevada tasa de rechazos.
- b. La escasez de donantes de pulmón.
- c. La complicación de la cirugía.
- d. La imposibilidad de encontrar receptores compatibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escasez de donantes de pulmón.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La complicación más frecuente una vez realizado el trasplante pulmonar es:

Seleccione una:

- a. Rechazo crónico.
- b. Infección.
- c. Rechazo agudo.
- d. Fallo agudo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rechazo agudo.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El óxido nítrico es una molécula que actúa como vasodilatador del lecho vascular pulmonar cuando se administra por:

Seleccione una:

- a. Vía inhalatoria.
- b. Vía intravenosa.
- c. Vía intraosea.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía inhalatoria.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La definición de una sustancia ácida es:

Seleccione una:

- a. Toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones.
- b. Toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones
- c. Aumento de la concentración de hidrogeniones.
- d. Disminución de la concentración de hidrogeniones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La acidosis está compensada si:

Seleccione una:

- a. El pH se mantiene mayor o igual a 7.38
- b. El pH se mantiene menor o igual a 7.31
- c. El pH es mayor de 7,35
- d. El pH es menor de 7,38.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El pH es mayor de 7,35

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las contraindicaciones absolutas para la realización del trasplante son:

Seleccione una:

- a. Diagnóstico de cáncer en los últimos 2 años, con excepción de tumores de piel basocelular o escamoso.
- b. Todas son correctas.
- c. Cardiopatía isquémica con mala función ventricular.
- d. Deterioro cardiaco, hepático y renal avanzado e irreversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prueba de respiración espontánea se realizará cuando el paciente presente:

Seleccione una:

- a. Una evolución favorable de la patología que provocó la conexión a la VM.
- b. Todas son correctas.
- c. Deben mantener el reflejo de la tos y tener la capacidad para movilizar las secreciones.
- d. Nivel de consciencia adecuado que nos permita comunicarnos con él correctamente y explicarle todo el procedimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las indicaciones para el trasplante pulmonar son:

Seleccione una:

- a. EPOC.
- b. Enfermedad pulmonar intersticial difusa.
- c. Fibrosis quística.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Diremos que el paciente presenta un fallo en la desconexión de la VM cuando presente:

Seleccione una:

- a. Desaturación (SaTO₂ menor de 90%).
- b. Disminución del nivel de conciencia.
- c. Falta de colaboración por parte del paciente, que puede adoptar una actitud pasiva o agitación.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las contraindicaciones relativas para el trasplante son:

Seleccione una:

- a. Edad superior a los 65 años.
- b. Que el donante esté en una situación de inestabilidad hemodinámica.
- c. Deterioro físico excesivo que impida la realización de rehabilitación ambulatoria
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen tres tipos de pacientes donantes que son:

Seleccione una:

- a. Donantes tras parada cardiaca (asistolia)
- b. Donantes en muerte cerebral.
- c. Todas son correctas.
- d. Donantes vivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el uso con ECMO la anticoagulación se implantará:

Seleccione una:

- a. Desde el inicio de la implantación de las cánulas hasta la retirada total del ECMO
- b. No se utiliza si el sistema es veno-venoso.
- c. Cuando se usa el sistema arterio-venoso se suspende la anticoagulación antes de la retirada del ECMO.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el inicio de la implantación de las cánulas hasta la retirada total del ECMO

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las indicaciones para realizar una gasometría son:

Seleccione una:

- a. Monitorizar la gravedad y progresión de las enfermedades respiratorias.
- b. Sospecha de alteración del equilibrio ácido-base.
- c. Parada cardiorrespiratoria.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los efectos adversos del ON combinado con otras moléculas son:

Seleccione una:

- a. Se convierte en un tóxico pulmonar directo por reacción de ON con O₂
- b. La formación de metahemoglobina al reaccionar con la hemoglobina en el capilar pulmonar.
- c. Todas son ciertas.
- d. En pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, esta puede agravarse por elevación de la presión capilar pulmonar al aumentar el flujo y la precarga del ventrículo izquierdo.

Comenzado el viernes, 25 de octubre de 2019, 18:48

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 25 de octubre de 2019, 18:52

Tiempo empleado 3 minutos 50 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones relacionadas con el aspecto del apoyo psicológico, ¿qué es lo más adecuado? (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- a. Tratar al paciente usando un lenguaje técnico porque no le hace falta que entienda su proceso médico
- b. Facilitar y fomentar la comunicación del paciente con la familia
- c. Fomentar el contacto físico entre la familia y el personal sanitario con el paciente (no usar guante siempre que se pueda)
- d. Tratar al paciente con amabilidad y comprensión, usando lenguaje verbal y no verbal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tratar al paciente usando un lenguaje técnico porque no le hace falta que entienda su proceso médico

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el objetivo es que el paciente participe en la ventilación y emplee su musculatura inspiratoria, se emplean modos asistidos. De las siguientes afirmaciones, cual puede ser un inconveniente en el uso de este sistema. Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. No requiere de esfuerzo activo por parte del paciente
- b. Requiere de esfuerzo activo por parte del paciente
- c. No garantiza un volumen minuto constante ya que no se controla ni el volumen inspiratorio ni la frecuencia respiratoria
- d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No requiere de esfuerzo activo por parte del paciente

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel respiratorio cuales son los principales efectos de la VM

Seleccione una:

- a. Reduce el shunt pulmonar
- b. Aumento espacio muerto
- c. a y b son correctas
- d. a y b son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es responsabilidad de la Enfermera el control, vigilancia y atención a las alarmas del respirador. Cuando hay que revisar los límites de las alarmas de un paciente con VM

Seleccione una:

- a. Al inicio del turno de trabajo
- b. Si la situación del paciente cambia
- c. Tras la conexión del paciente
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes contraindicaciones de la VMNI es cierta

Seleccione una:

- a. Bajo nivel de conciencia
- b. Inestabilidad hemodinámica
- c. Traumatismo facial
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los inconvenientes de la VMNI

Seleccione una:

- a. Inicio y retirada VM de forma flexible
- b. Puede hablar e ingerir alimentos sin problemas
- c. Distensión gástrica y aspiración
- d. Menor riesgo de infección respiratoria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distensión gástrica y aspiración

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tienes un paciente con VM que le suena en el respirador una alerta que nos indica que tiene Presión Pico elevada. Que comprobaciones harías para resolver la alerta.

Seleccione una:

- a. Vigilar acodamiento de las tubuladuras y del TET
- b. Que el paciente esté mordiendo el tubo
- c. Que tengamos que aspirar secreciones
- d. Todos son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes cuidados de Enfermería está relacionado con el control de neumonías asociadas a VM

Seleccione una:

- a. Realizar higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y su entorno
- b. Realizar y mantener la correcta higiene de los equipos usados en la terapia respiratoria
- c. Realizar una correcta higiene oral, al menos tres veces al día o cuando sea necesario, para evitar que las secreciones se acumulen en la orofaringe y se produzca microaspiraciones
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un respirador controlado por Volumen ¿qué inconveniente nos podemos encontrar?

Seleccione una:

- a. Barotrauma
- b. Necesidad de sedación
- c. Atrofia de musculatura respiratoria
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como se define la Ventilación Mecánica

Seleccione una:

- a. La utilización de un dispositivo para sustituir parcial o totalmente, la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma temporal
- b. La utilización de un dispositivo para sustituir parcialmente la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma permanente
- c. Es una terapia paliativa de manejo domiciliario
- d. Su uso es exclusivo de terapias en unidades de Hospitalización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La utilización de un dispositivo para sustituir parcial o totalmente, la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma temporal

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

cual de las siguientes siglas corresponden a una Modalidad Mixta de ventilación

Seleccione una:

- a. BIIPAP
- b. BIPAP y SIMV
- c. BIPP
- d. SIM

Retroalimentación

La respuesta correcta es: BIPAP y SIMV

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando en un paciente sometido a ventilación mecánica se activa la alarma de volumen minuto bajo, puede ser debido a:

Seleccione una:

- a. Presencia de broncoespasmo
- b. Acodamiento del tubo
- c. Aumento de las secreciones.
- d. Desconexión del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desconexión del paciente

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de la higiene bucal en un paciente con TOT cada cuanto se cambia la fijación del dispositivo.

Seleccione una:

- a. En ningún caso se cambia hasta que lo precise
- b. Dos veces al día
- c. Una vez por turno o cuando sea necesario
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una vez por turno o cuando sea necesario

Pregunta 14

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La diferencia de la V. Mecánica y V. espontanea

Seleccione una:

- a. La entrada de aire la produce el propio ventilador supliendo la musculatura respiratoria
- b. El aire que entra produce una presión neutra
- c. La espiración en la VM al igual que en la ventilación espontánea es un proceso pasivo
- d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel endocrino que efectos tiene la utilización de la VM

Seleccione una:

- a. Disminución de la hormona Antidiurética
- b. Aumento de la hormona GH
- c. Aumento de la hormona antidiurética
- d. Disminución de la Oxitocina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la hormona antidiurética

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un respirador controlado por Presión que Parámetros deberás ajustar

Seleccione una:

- a. Volumen tidal o corriente
- b. Presión inspiratoria
- c. Frecuencia respiratoria
- d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las afirmaciones no es una ventaja de la VMNI

Seleccione una:

- a. Menor riesgo de infección
- b. Disminuye el tiempo de VM y de UCI
- c. Mayor sedación
- d. Puede hablar e ingerir

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mayor sedación

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existe un tipo de dispositivo que aplica una presión positiva gracias al denominado “efecto jet” que es capaz de generar un alto flujo continuo mientras el paciente respira de forma espontánea.

Seleccione una:

- a. Mascarilla tipo Boussignac
- b. Mascarilla tipo reservorio
- c. VMNI
- d. Gafas nasales de Alto Flujo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla tipo Boussignac

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué niveles de presión se emplea en el modo BIPAP (VMNI)

Seleccione una:

- a. EPOPP
- b. IPAPP
- c. IPAP y EPAP
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: IPAP y EPAP

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tubo orotraqueal, que presión debe de tener el neumotaponamiento

Seleccione una:

- a. 20-50 mm Hg
- b. 10-20 mm Hg
- c. 20-30 mm Hg
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20-30 mm Hg

Comenzado el viernes, 1 de noviembre de 2019, 23:34

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 1 de noviembre de 2019, 23:36

Tiempo empleado 2 minutos 19 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación **10,00** de 10,00 (**100%**)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cadena de supervivencia consta de los siguientes pasos:

Seleccione una:

- a. Aviso a servicios de emergencia, inicio temprano de maniobras de RCP, desfibrilación temprana, soporte vital avanzado y cuidados post-resucitación.
- b. Maniobras de RCP hasta la llegada de ayuda, que comprobara ritmo ECG y decidirá cuál es el paso siguiente.
- c. Comprobar pulso y respiración, avisar a los servicios de emergencia, iniciar RCP y mantener maniobras hasta la llegada de ayuda.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aviso a servicios de emergencia, inicio temprano de maniobras de RCP, desfibrilación temprana, soporte vital avanzado y cuidados post-resucitación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de bloqueo es aquel en el que el intervalo PR se va alargando hasta que una P no conduce?

Seleccione una:

- a. Bloqueo de rama izquierdo
- b. Bloqueo AV de tercer grado
- c. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I
- d. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El llenado del balón de contrapulsación se produce por medio:

Seleccione una:

- a. Gas nitrógeno
- b. Suero salino fisiológico
- c. Agua estéril
- d. Gas helio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gas helio

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería de un paciente con FA con RVR incluyen

Seleccione una:

- a. Vigilancia neurológica
- b. Monitorización continua
- c. Conocimientos de farmacología cardiaca y protocolos de RCP
- d. Todos son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

A la hora de realizar una revascularización miocárdica o bypass, los dos conductos más utilizados son:

Seleccione una:

- a. Arteria mamaria derecha y vena safena interna
- b. Arteria mamaria izquierda y epigástrica
- c. Vena safena interna y arteria mamaria interna
- d. Arteria radial y arteria mamaria interna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vena safena interna y arteria mamaria interna

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las últimas recomendaciones de la AHA (SVB) indican que al observar un paciente que no responde:

Seleccione una:

- a. Pedir ayuda, activar los servicios sanitarios de respuesta inmediata
- b. Iniciar masaje cardiaco de manera inmediata (30:2) a un ritmo de entre 100 y 120 cpm
- c. Si disponemos de un DE. Analizaremos el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, administraremos un choque y reiniciaremos de nuevo masaje cardiaco
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras la realización de una pericardiocentesis es importante:

Seleccione una:

- a. Valorar el aspecto del líquido pericárdico drenado

- b. Cuantificación del líquido drenado
- c. Iniciar tan pronto como sea acabe la técnica dieta oral
- d. a y b son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes portadores de BCPIAo es necesario revisar al menos una vez por turno:

Seleccione una:

- a. La correcta programación de las alarmas y parámetros pautados
- b. El pulso pedio del miembro por donde se insertó el balón
- c. El punto de inserción en busca de signos de infección
- d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Ante cuál de estas arritmias no haremos una cardioversión eléctrica?

Seleccione una:

- a. Fibrilación auricular
- b. Flutter auricular
- c. Fibrilación ventricular



d. Taquicardia ventricular hemodinámicamente estable

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fibrilación ventricular

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la consola del BCPIAo es posible programar los siguientes parámetros excepto:

Seleccione una:



a. La frecuencia asistencia



b. El volumen de llenado del balón



c. El aumento de la presión sistólica del paciente



d. El modo de sincronización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aumento de la presión sistólica del paciente

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale, de entre las siguiente respuestas, cual es un efecto adverso potencial que puede sufrir un paciente sometido a tratamiento:

Seleccione una:



a. Alteraciones electrolíticas, disminución de la sensibilidad a la insulina.



b. Producción de ritmo sinusal.



c. A y B son correctas.



d. A y B son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alteraciones electrolíticas, disminución de la sensibilidad a la insulina.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son manifestaciones clínicas de la emergencia hipertensiva

Seleccione una:

- a. Disección de aorta
- b. Eclampsia
- c. Accidente cerebro vascular
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para inducir una adecuada hipotermia:

Seleccione una:

- a. No es necesario monitorizar la temperatura, dado que los cuerpos que han estado en PCR siempre están fríos.
- b. Realizaremos una adecuada monitorización de la temperatura, y procederemos a realizar la técnica con mantas térmicas para administrar aire frío, bolsas de hielo y medidas invasivas (inyección de suero iv fríos, lavados nasales, vesicales, gástricos...).
- c. Descenderemos la temperatura hasta conseguir los 32-36°C para mantenerlos durante 24h aproximadamente, siempre y cuando el paciente lo tolere.
- d. B y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más común de mortalidad tras un trasplante son:

Seleccione una:

- a. Infecciones
- b. Tumores
- c. Enfermedad vascular del injerto
- d. Diabetes mellitus

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad vascular del injerto

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se habla de aumento de tensión arterial brusco que puede producir lesiones en órganos diana hablamos de:

Seleccione una:

- a. Hipertensión maligna
- b. Pseudo crisis hipertensiva
- c. Emergencia hipertensiva
- d. Urgencia hipertensiva

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Emergencia hipertensiva

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La manifestación más severa del taponamiento cardiaco es:

Seleccione una:

- a. Disociación electromecánica del corazón
- b. Disnea e hipotensión arterial
- c. Distensión yugular, hipotensión, disminución de los tonos cardíacos a la auscultación y bajo gasto cardiaco.
- d. Hipotensión e ingurgitación yugular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disociación electromecánica del corazón

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los dispositivos de asistencia ventricular están indicados

Seleccione una:

- a. Como "puente" al trasplante
- b. Como "puente" a la recuperación
- c. Como "puente" a la decisión
- d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es cierto sobre la adenosina que...

Seleccione una:

- a. Se debe diluir en un suero de 100 mililitros y administrar en 10 minutos.
- b. La dosis inicial es de 22 mg.
- c. Está contraindicada en pacientes asmáticos.
- d. Está recomendado en las bradiarritmias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicada en pacientes asmáticos.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debemos tener especial cuidado en el postoperatorio de cirugía cardíaca, dado que pueden aparecer complicaciones. Las más comunes son:

Seleccione una:

- a. Infecciones e hipertensión arterial.
- b. Tumores y hemorragias.
- c. Hemorragias y taponamiento cardíaco.
- d. Síndrome de bajo gasto y hemorragias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome de bajo gasto y hemorragias.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La reparación quirúrgica de una válvula del corazón por incapacidad funcional, consiguiendo el cierre correcto de la misma se llama:

Seleccione una:

- a. Insuficiencia aortica
- b. Comisurotoma
- c. Valvuloplastia
- d. Estenosis mitral

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valvuloplastia

Comenzado el viernes, 1 de noviembre de 2019, 23:37

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 1 de noviembre de 2019, 23:39

Tiempo empleado 2 minutos 15 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“Obstrucción mecánica al flujo sanguíneo en el circuito cardiovascular”. Esta definición responde a:

Seleccione una:

- a. Shock cardiogénico
- b. Shock hipovolémico hemorrágico
- c. Shock distributivo
- d. Shock obstructivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock obstructivo

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El fármaco utilizado en caso de que la dopamina no sea efectiva, en el shock cardiogénico es:

Seleccione una:

- a. Adrenalina
- b. Dobutamina
- c. Norepinefrina
- d. Nitroprusiato

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dobutamina

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La pericardiectomía es utilizada como tratamiento del shock:

Seleccione una:

- a. Cardiogénico de tipo IAM
- b. Hipovolémico hemorrágico
- c. Killip 1
- d. Obstructivo de tipo pericarditis constrictiva

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obstructivo de tipo pericarditis constrictiva

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se administraran las DVA preferiblemente por:

Seleccione una:

- a. Vía endotraqueal
- b. Vía venosa central
- c. Vía ósea
- d. Vía periférica de gran calibre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía venosa central

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“Incapacidad del sistema cardiovascular para mantener una perfusión tisular sistémica adecuada durante la evolución de diferentes patologías, caracterizada por un desequilibrio entre transporte, demanda y oferta de oxígeno y nutrientes a los tejidos”. Esta definición responde a:

Seleccione una:

- a. Fallo multiorgánico

- b. Shock cardiogénico
- c. Shock
- d. SIRS

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El shock hiperdinámico cursa con:

Seleccione una:

- a. GC bajo y RVS bajas
- b. GC bajo y RVS altas
- c. Hipotensión, taquicardia y RVS altas
- d. GC alto, hipotensión y RVS bajas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: GC alto, hipotensión y RVS bajas

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los signos y síntomas característicos de SIRS son:

Seleccione una:

- a. Temperatura mayor de 38°C ó menor de 36°C
- b. FC mayor de 90 latidos por minuto (lpm)
- c. FR mayor de 20 respiraciones por minuto (rpm) ó presión parcial de dióxido de carbono (PaCO₂) menor de 32 mmHg



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vasoconstricción arterial en órganos no vitales se produce en:

Seleccione una:



a. Shock hipovolémico hemorrágico



b. Shock compensado



c. Shock irreversible



d. Shock distributivo endocrino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock compensado

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fármacos vasodilatadores por excelencia son:

Seleccione una:



a. Adrenalina y cafinitrina



b. Nitroprusiato y dobutamina



c. Nitroprusiato y nitroglicerina



d. Nitroglicerina y noradrenalina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nitroprusiato y nitroglicerina

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los fármacos inotrópicos usados en pacientes en shock, el más empleado cuando la TA sistólica es ≥ 90 mmHg es:

Seleccione una:

- a. Dopamina
- b. Dobutamina
- c. Adrenalina
- d. Noradrenalina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dobutamina

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando existe daño irreparable y disfunción orgánica, el shock se encuentra en su fase:

Seleccione una:

- a. Inicial
- b. Compensada
- c. Descompensada
- d. Irreversible

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Irreversible

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de asistencia mecánica temporal puede ser:

Seleccione una:

- a. ECMO y BCIAo
- b. BCIAo y SG
- c. SG y PICCO
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ECMO y BCIAo

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Disminución del nivel de conciencia, desviación traqueal hacia el lado contralateral, hipotensión, distensión de las venas del cuello y cianosis son síntomas característicos de:

Seleccione una:

- a. Shock obstructivo
- b. Disección aórtica
- c. Ntx a tensión
- d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ntx a tensión

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Realizaremos una cricotiroidotomía como primera medida en:

Seleccione una:

- a. Shock obstructivo faríngeo
- b. Shock hipovolémico hemorrágico
- c. Shock obstructivo neumotórax a tensión
- d. Shock anafiláctico con edema de glotis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock anafiláctico con edema de glotis

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de antibióticos y antifúngicos como medida para paliar el shock, es utilizado en:

Seleccione una:

- a. Shock séptico
- b. Shock tóxico
- c. Ambas son correctas
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock séptico

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la pérdida de sangre masiva, el organismo responde con

Seleccione una:

- a. Vasoconstricción progresiva, preservando el flujo sanguíneo a órganos vitales.
- b. Vasoconstricción de órganos vitales.
- c. Vasodilatación periférica.
- d. Aumento de la diuresis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vasoconstricción progresiva, preservando el flujo sanguíneo a órganos vitales.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando nos encontramos con mecanismos compensatorios que funcionan correctamente para preservar el flujo a los órganos vitales con vasoconstricción de los demás órganos, el shock se encuentra en su fase:

Seleccione una:

- a. Inicial
- b. Compensada
- c. Descompensada
- d. Irreversible

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compensada

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realizar una correcta resucitación inicial, administrando volumen a altas dosis es necesario:

Seleccione una:

- a. Canalizar VVC
- b. Canalizar 2 vvp de grueso calibre
- c. Ninguna es correcta
- d. Ambas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Canalizar 2 vvp de grueso calibre

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medida se deberá tomar ante un Ntx a tensión?

Seleccione una:

- a. Aporte de oxígeno
- b. Colocación de tubo de tórax
- c. Administración de DVA
- d. Radiografía de tórax

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocación de tubo de tórax

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El shock distributivo se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Vasodilatación periférica
- b. VI hiperdinámico
- c. RVS disminuidas y GC aumentado
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Comenzado el sábado, 9 de noviembre de 2019, 17:16

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 9 de noviembre de 2019, 17:18

Tiempo empleado 1 minutos 52 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente con una escala Glasgow menor de 7, diremos que es un paciente:

Seleccione una:

- a. Totalmente despierto, con alguna deficiencia de respuesta
- b. Un poco adormilado
- c. Un paciente neurológico con una escala Glasgow inferior a 8 debe ser intubado para preservar vía aérea
- d. Un paciente neurológico con dolor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un paciente neurológico con una escala Glasgow inferior a 8 debe ser intubado para preservar vía aérea

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. En el manejo de la Hiper PIC, se encuentra mantener normotermia, tolerando una hipotermia de hasta 34-35°C
- b. Mantendremos una glucemia superior a 190mg/dl
- c. a y b son ciertas
- d. Ninguna de las afirmaciones es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el manejo de la Hiper PIC, se encuentra mantener normotermia, tolerando una hipotermia de hasta 34-35°C

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de esas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. Las enfermedades hematológicas no hacen parte de las causas de hemorragia
- b. Los tumores cerebrales no sangran, por lo que no pueden ser causa de una hemorragia cerebral
- c. Sospecharemos de una hemorragia cerebral, secundaria a malformaciones arterio-venosas en pacientes adultos jóvenes sin HTA.
- d. El consumo de drogas no es causa de riesgo para una hemorragia cerebral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sospecharemos de una hemorragia cerebral, secundaria a malformaciones arterio-venosas en pacientes adultos jóvenes sin HTA.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Unas pupilas con menos de 2mm de diámetro son unas pupilas:

Seleccione una:

- a. Isocóricas
- b. Reactivas
- c. Medias
- d. Mióticas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mióticas

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los cuidados de enfermería en pacientes neurocríticos:

Seleccione una:

- a. No será necesario vigilancia de diuresis horaria

- b. No se realizará valoración motora para no aumentar PIC del paciente
- c. Se realizará valoración pupilar y examinará la función motora
- d. ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizará valoración pupilar y examinará la función motora

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para diagnosticar el SGB:

Seleccione una:

- a. En las primeras horas se observa una disminución importante de las proteínas en el LCR
- b. En las primeras horas se observa un aumento importante de las proteínas en el LCR
- c. En los días posteriores a los primeros síntomas se observa un aumento importante de proteínas en el LCR
- d. En los días posteriores a los primeros síntomas se observa una disminución importante en el LCRT.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los días posteriores a los primeros síntomas se observa un aumento importante de proteínas en el LCR

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los síntomas más frecuentes de la hemorragia se encuentran:

Seleccione una:

- a. Debilidad, entumecimiento o parálisis de cara, brazo o pierna
- b. Dolor de cabeza repentino
- c. Pérdida de coordinación
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales son:

Seleccione una:

- a. Dolor de cabeza
- b. Vómitos inexplicables
- c. Problemas en la visión y audición
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el SGB los síntomas que hay que actuar con urgencia son:

Seleccione una:

- a. Debilidad muscular
- b. Dificultad para deglutir
- c. Ausencia temporal de la respiración



d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la causa más frecuente de hemorragia cerebral?

Seleccione una:



a. Farmacológica



b. Hipertensión arterial



c. Tumores



d. Drogas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertensión arterial

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería en la UCI en pacientes con SGB son:

Seleccione una:



a. Control estricto de los signos vitales (TA, FC, T^a, SatO₂, FR)



b. Valoración neurológica continua para evaluar la progresión de la enfermedad (nivel de conciencia, evaluar la fuerza muscular, etc.)



c. Fomentar la fisioterapia respiratoria para evitar las atelectasias y las neumonías



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una neuropatía:

Seleccione una:

- a. Adquirida que se desencadena tras un proceso de tipo infeccioso
- b. Hereditaria
- c. Es una enfermedad crónica
- d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquirida que se desencadena tras un proceso de tipo infeccioso

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de enfermería en las primeras horas de paciente intervenido de una extirpación de un tumor cerebral hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Vigilar el sangrado y vigilar las posibles convulsiones en las primeras horas postquirúrgicas
- b. Vigilar el estado de conciencia y las pupilas
- c. a y b son ciertas
- d. Vigilar la ingesta y la deambulación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un tumor cerebral se diagnostica a través de las siguientes pruebas:

Seleccione una:

- a. TAC
- b. RM
- c. Biopsia
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al diagnóstico de la hemorragia:

Seleccione una:

- a. Siempre será necesario e imprescindible un electromiograma
- b. Es necesario un TAC
- c. RM para determinar la edad evolutiva del hematoma
- d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de la SGB:

Seleccione una:

- a. Está contraindicado la plasmaféresis
- b. Está indicado la plasmaféresis como único tratamiento
- c. Está indicado la administración de Inmunoglobulina G Humana IV y la plasmaféresis
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicado la administración de Inmunoglobulina G Humana IV y la plasmaféresis

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estas afirmaciones es FALSA:

Seleccione una:

- a. La TA, en una hemorragia, es necesario que tenga valores muy elevados, para mejorar PPC.
- b. La presencia de hipoxia tiende a aumentar la PIC
- c. a y b son ciertas
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento del paciente con hiperPIC:

Seleccione una:

- a. No lo mantendremos con Paco2 más bajos de 40
- b. Siempre se utilizará corticosteroides
- c. Procuraremos mantener tensiones bajas
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de la SGB:

Seleccione una:

- a. La administración de Inmunoglobulina G Humana IV se aconseja en los primeros 7 días de la enfermedad
- b. Las ventajas de la administración de Inmunoglobulina G Humana IV sobre la Plasmaféresis son su fácil administración, y seguridad en pacientes inestables.
- c. a y b son falsas
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existe una mayor incidencia para contraer el SGB en:

Seleccione una:

- a. La población infantil
- b. En la población entre los 50-60 años
- c. a y b son correctas
- d. En adultos jóvenes y en mayores de 55 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En adultos jóvenes y en mayores de 55 años

Comenzado el sábado, 16 de noviembre de 2019, 14:07

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 16 de noviembre de 2019, 14:11

Tiempo empleado 3 minutos 44 segundos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El inicio de la clínica en la hepatitis fulminante suele ser:

Seleccione una:

- a. Insidioso y con síntomas inespecíficos.
- b. Con encefalopatía hepática.
- c. Con ictericia.
- d. Con fetor hepático.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insidioso y con síntomas inespecíficos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es método diagnóstico más fiable para identificar la hipertensión intraabdominal?

Seleccione una:

- a. Tomografía computarizada.
- b. Ecografía.
- c. Medición de la presión intraabdominal.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medición de la presión intraabdominal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los mecanismos implicados en el íleo paralítico son:

Seleccione una:

- a. Neurogénicos.

- b. Inflamatorios
- c. Farmacológicos.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El enfermo ante un caso de íleo paralítico debe, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Manejo de la sonda nasogástrica.
- b. Auscultar los ruidos intestinales.
- c. Administración de fármacos pautados para favorecer el tránsito intestinal.
- d. Realizar ecografía para valorar la evolución del íleo paralítico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar ecografía para valorar la evolución del íleo paralítico

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando existe sangrado por varices esofágicas, estas suelen ser secundarias a:

Seleccione una:

- a. Patología pancreática.
- b. Patología esofágica.
- c. Patología hepática.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Patología hepática.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las principales medidas en el tratamiento de la pancreatitis son:

Seleccione una:

- a. No dar alimentos por boca.
- b. Administración de abundantes líquidos intravenosos.
- c. Administrar medicamentos para aliviar el dolor.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal causa de hemorragia digestiva aguda alta es:

Seleccione una:

- a. Úlcera por estrés.
- b. Varices esofágicas.
- c. Úlcera péptica.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Úlcera péptica.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales causas de fallo hepático fulminante?

Seleccione una:

- a. Hepatitis tóxicas.
- b. Hepatitis víricas.
- c. Fármacos.
- d. Hepatitis autoinmune.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hepatitis víricas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de fallo hepático fulminante, ¿qué pacientes tienen mejor pronóstico sin trasplante hepático?

Seleccione una:

- a. Fallo hepático agudo.
- b. Fallo hepático hiperagudo.
- c. Fallo hepático subagudo
- d. Fallo hepático fulminante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fallo hepático hiperagudo.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se produce una hepatitis fulminante el enfermero debe hacer controles periódicos de:

Seleccione una:

- a. Hematocrito y hemoglobina.
- b. Glucosa.
- c. Coagulación.
- d. Amoniaco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucosa.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una hemorragia digestiva alta siempre se colocará una sonda nasogástrica excepto:

Seleccione una:

- a. Si el sangrado es por varices esofágicas.
- b. Si el sangrado es por úlceras pépticas.
- c. Nunca se colocará sonda nasogástrica si hay hemorragia digestiva alta.
- d. Siempre se colocará sonda nasogástrica si hay hemorragia digestiva alta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si el sangrado es por varices esofágicas.

Pregunta 12

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta con respecto a la dieta que deber de seguir los pacientes con hepatitis fulminante:

Seleccione una:

- a. Reducir el consumo de hidratos de carbono.
- b. Reducir el consumo de grasas.
- c. Reducir el consumo de proteínas.
- d. Reducir el consumo de fibra.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reducir el consumo de proteínas.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal síntoma del íleo paralítico es:

Seleccione una:

- a. Vómitos.
- b. Sangrado.
- c. Detención del tránsito intestinal.
- d. Estreñimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Detención del tránsito intestinal.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al tratamiento de la hemorragia digestiva aguda, lo primero que hay que hacer es:

Seleccione una:

- a. Estabilizar al paciente.
- b. Buscar el punto de sangrado para así estabilizar al paciente.
- c. Una arteriografía para tratar el sangrado.
- d. Una endoscopia independientemente del origen del sangrado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estabilizar al paciente.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El enfermero será el encargado de avisar al médico en caso de que la presión de perfusión abdominal esté:

Seleccione una:

- a. Por encima de 60 mmHg.
- b. Por debajo de 60 mmHg.
- c. Por debajo de 70 mmHg.
- d. Por encima de 70 mmHg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por debajo de 60 mmHg.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si en una hemorragia aguda existe hematemesis, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. La sangre se expulsa por el ano.
- b. La sangre se expulsa por la boca.
- c. Suele ser sangre fresca.
- d. El origen del sangrado está por encima del ángulo de Treitz.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sangre se expulsa por el ano.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal síntoma de la pancreatitis aguda?

Seleccione una:

- a. Náuseas y vómitos.
- b. Fiebre.
- c. Diarrea.
- d. Dolor epigástrico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor epigástrico.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para favorecer la distensibilidad abdominal en la hipertensión intraabdominal, el personal de enfermería mantendrá la cama del paciente crítico:

Seleccione una:

- a. En decúbito supino con más de 20° de inclinación.
- b. En decúbito supino con menos 20° de inclinación.
- c. En decúbito supino, no importa el grado de inclinación.
- d. En decúbito lateral derecho, para así favorecer el retorno venoso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En decúbito supino con menos 20° de inclinación.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal causa de pancreatitis aguda es:

Seleccione una:

- a. Litiasis biliar.
- b. Consumo de alcohol.
- c. Fármacos.
- d. Hipertrigliceridemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Litiasis biliar.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico de la pancreatitis aguda se realiza principalmente:

Seleccione una:

- a. Tomografía computarizada.
- b. Extracción de marcadores inflamatorios.
- c. Extracción de amilasa y lipasa.
- d. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Extracción de amilasa y lipasa.

Cuidados críticos en enfermería intensiva

Comenzado el jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:27

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:42

Tiempo empleado 14 minutos 13 segundos

Puntos 18,00/20,00

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En la UCI qué tipo de terapia extrarrenal es de elección?

Seleccione una:

- a. Terapias alternas.
- b. Terapias continuas.
- c. A y C son de elección.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Terapias continuas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La acidosis metabólica puede producir:

Seleccione una:

- a. Dolor de cabeza.
- b. Vómitos.
- c. Descenso de la presión arterial.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el paciente ya trasplantado, ¿cuál no es un indicador de rechazo?

Seleccione una:

- a. Aumento del BUN.
- b. Aumento de peso.
- c. Disminución de creatinina.
- d. Dolor en la zona de inserción del riñón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de creatinina.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los riñones una vez extraídos del donante, se pueden conservar:

Seleccione una:

- a. 12h.
- b. 24h.
- c. 48h.
- d. 72h.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 72h.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vez colocado el catéter peritoneal ¿cuándo podrá utilizarse para DP?

Seleccione una:

- a. A las 24h de la cirugía.
- b. Entre 4 y 6 semanas después de la cirugía.
- c. A la semana de la cirugía.
- d. Si no hay complicaciones a las 72h de la cirugía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 4 y 6 semanas después de la cirugía.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acceso vascular temporal, para realización de terapia extrarrenal, es de elección por su baja incidencia de trombosis?

Seleccione una:

- a. Vena Yugular.
- b. Vena femoral.
- c. Arteria femoral.



d. Vena subclavia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vena Yugular.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de las siguientes terapias es necesario reponer con líquido de sustitución?

Seleccione una:



a. UF.



b. HFVVC.



c. HDFVVC.



d. B y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué nos permite analizar la gasometría arterial?

Seleccione una:



a. El pH sanguíneo.

- b. Los principales iones en sangre.
- c. El HCO_3^- .
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la principal causa de muerte tras el trasplante renal?

Seleccione una:

- a. Infección.
- b. Enfermedad cardiovascular.
- c. Neoplasias malignas.
- d. Recurrencia de la enfermedad renal original.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad cardiovascular.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los inmunosupresores además de evitar el rechazo tienen los siguientes efectos secundarios:

Seleccione una:

- a. Aumentan el riesgo de infección.
- b. Disminuyen la probabilidad de aparición de neoplasias malignas.
- c. A y B son ciertas.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan el riesgo de infección.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes presiones del Hemofiltro, ¿cuál de ellas es siempre negativa con valores entre -50/-150mmHg?

Seleccione una:

- a. Presión de entrada.
- b. Presión de retorno.
- c. Presión prefiltro.
- d. Todas son negativas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión de entrada.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El órgano que procede de donante vivo tiene ciertas ventajas con respecto al donante cadáver, ¿cuál no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Aumento de las tasas de supervivencia por mejor compatibilidad.
- b. Precisa una dosis mayor de inmunosupresores.
- c. Disponibilidad inmediata de órganos.
- d. Función inmediata por mínimo tiempo de enfriamiento del riñón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Precisa una dosis mayor de inmunosupresores.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes terapias de depuración extrarrenal continua, ¿cuál combina mecanismos de difusión y convección?

Seleccione una:

- a. UF.
- b. HDFVVC.
- c. HFVVC.
- d. HDVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HDFVVC.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de depuración más usada en España?

Seleccione una:

- a. HFVVC.
- b. UF.
- c. HDVVC.
- d. HDFVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HFVVC.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una terapia de depuración extrarrenal alterna?

Seleccione una:

- a. HD.
- b. HFVVC.
- c. DP y HD.



d. HD y HFVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: DP y HD.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una contraindicación de la DP?

Seleccione una:



a. Peritonitis.



b. Enfermedad Pulmonar.



c. Insuficiencia renal.



d. Cirugía abdominal reciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia renal.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La insuficiencia renal produce una disminución de la reabsorción de bicarbonato y un aumento de H^+ , produciendo uno de los siguientes trastornos acido-base:

Seleccione una:



a. Acidosis metabólica.

- b. Alcalosis metabólica.
- c. Acidosis respiratoria.
- d. Alcalosis respiratoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acidosis metabólica.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vez conectado comenzada la terapia de sustitución continua, ¿cuál es la línea que lleva la sangre del paciente hasta el filtro?

Seleccione una:

- a. Línea eferente.
- b. Línea aferente.
- c. Línea del efluente.
- d. Línea de reposición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Línea aferente.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes alteraciones electrolíticas, ¿cuál no se produce a consecuencia de la pérdida de la función renal?

Seleccione una:

- a. Hiponatremia.
- b. Hiperfosfatemia.
- c. Hipercalcemia.
- d. Hipopotasemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipercalcemia.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes ¿cuál es un indicador de rechazo al trasplante renal?

Seleccione una:

- a. Fiebre.
- b. Aumento de Creatinina.
- c. HTA.
- d. Todos son indicadores de rechazo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son indicadores de rechazo.

Comenzado el miércoles, 27 de noviembre de 2019, 01:16

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 27 de noviembre de 2019, 02:49

Tiempo empleado 1 hora 33 minutos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La triada de Whipple se utiliza como uno de los criterios diagnósticos de

Seleccione una:

- a. CAD
- b. CDHNC
- c. Coma hipoglucémico
- d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coma hipoglucémico

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La manifestación clínica de la diabetes insípida

Seleccione una:

- a. Consiste en poliuria, sed y polidipsia
- b. Consiste en polifagia, polaquiuria y sed

- c. Consiste en deshidratación, polifagia y polineuralgia
- d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en poliuria, sed y polidipsia

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana se presenta

Seleccione una:

- a. Como debut de paciente sometido a estrés y no diagnosticado previamente de enfermedad de addison
- b. Pacientes que interrumpen bruscamente el tratamiento con glucocorticoides
- c. a y b son ciertas
- d. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana

Seleccione una:

- a. Es una exacerbación aguda de la insuficiencia hepática
- b. Es una exacerbación aguda de la insuficiencia suprarrenal
- c. Es una enfermedad crónica hepática
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una exacerbación aguda de la insuficiencia suprarrenal

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen diferentes estrategias de tratamiento de la hiperglucemia en UCI:

Seleccione una:

- a. Independientemente de la estrategia a seguir la insulina que se utiliza es la de acción rápida o también conocida como insulina cristalina
- b. En la estrategia ITT la administración de la insulina es vía subcutánea
- c. En la estrategia CIT la administración de la insulina es vía intravenosa.
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independientemente de la estrategia a seguir la insulina que se utiliza es la de acción rápida o también conocida como insulina cristalina

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción verdadera sobre la enfermedad de Addison

Seleccione una:

- a. Siempre es de origen primario
- b. Puede deberse a una producción excesiva de ACTH
- c. La secreción excesiva de ACTH puede ser consecuencia de una enfermedad hipotálamo-hipofisaria



d. La secreción insuficiente de ACTH puede ser consecuencia de una enfermedad hipotálamo-hipofisaria o por atrofia suprarrenal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La secreción insuficiente de ACTH puede ser consecuencia de una enfermedad hipotálamo-hipofisaria o por atrofia suprarrenal

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En ayunas los mecanismos contrarreguladores previenen o corrigen el descenso la glucemia. Señale la no incorrecta

Seleccione una:



a. El primer paso corre a cargo de las células beta que disminuyen la producción de insulina si la glucemia es menor de 65mg/dl



b. El tercer paso es el aumento de la secreción de adrenalina cuando la glucemia se encuentra entre 65-70mg/dl



c. El primer paso corre a cargo de las células alfa que disminuyen la producción de insulina si la glucemia es menor de 70mg/dl



d. Ninguna es incorrecta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tercer paso es el aumento de la secreción de adrenalina cuando la glucemia se encuentra entre 65-70mg/dl

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El manejo y cuidados de enfermería en el paciente con diagnóstico médico: crisis addisonianas consiste en

Seleccione una:

- a. Monitorización de TA, FC, FR, diuresis, temperatura corporal, glucemia y satO2
- b. Reposición de la volemia y si TA refractaria administración de aminos vasopresoras (por orden del facultativo)
- c. Reposición de la volemia y si TA refractaria transfusión sanguínea
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hiperglucemia

Seleccione una:

- a. Mejora el pronóstico de recuperación del paciente en UCI
- b. Aumenta las posibilidades complicaciones (mala cicatrización de heridas, riesgo de infección)
- c. Solo se presenta en pacientes con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo II
- d. Solo se presenta en pacientes con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo I

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta las posibilidades complicaciones (mala cicatrización de heridas, riesgo de infección)

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la respuesta no correcta sobre la fisiopatología de la diabetes insípida

Seleccione una:

- a. La disminución de la actividad de la vasopresina sobre los túbulos colectores del riñón es responsable de la poliuria
- b. Si la ingesta o aporte de líquidos es suficiente para compensar las pérdidas urinarias no llega a producirse deshidratación.
- c. El aumento de la actividad de la ADH produce incapacidad para reabsorber el agua libre
- d. El aumento de la osmolaridad plasmática activa el mecanismo de la sed

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aumento de la actividad de la ADH produce incapacidad para reabsorber el agua libre

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La deficiencia de aldosterona

Seleccione una:

- a. Incrementa la reabsorción de sodio y potasio en el riñón
- b. Incrementa la pérdida de sodio y reabsorción del potasio en el riñón
- c. Incrementa la pérdida de sodio y potasio en el riñón
- d. Incrementa la reabsorción de sodio y la pérdida de potasio en el riñón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incrementa la pérdida de sodio y reabsorción del potasio en el riñón

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana

Seleccione una:

- a. Es una situación de urgencia por el colapso vascular que se produce
- b. Es una situación frecuente que el paciente está preparado para solucionar por sí mismo inyectándose insulina
- c. Es una situación de urgencia por el desequilibrio electrolítico que produce
- d. a y c no son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c no son falsas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La manifestación clínica de la hipoglucemia no es específica y varía entre personas pero suelen presentar

Seleccione una:

- a. Verborrea, exaltación y episodios maniacos
- b. Verborrea, mareos, crisis epilépticas, frío, pupilas mióticas e HTA
- c. Dificultad para hablar, visión borrosa, sudación profusa y palidez cutánea
- d. Verborrea, HTA, episodios maniacos y ecolalia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificultad para hablar, visión borrosa, sudación profusa y palidez cutánea

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes respuestas indique la falsa

Seleccione una:

- a. La corteza suprarrenal secreta glucocorticoides y mineralocorticoides
- b. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides reducen la secreción de potasio
- c. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides aumentan la capacidad de retener sodio
- d. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides producen el descenso de la gluconeogénesis hepática

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides aumentan la capacidad de retener sodio

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La secreción de ADH es regulada por:

Seleccione una:

- a. Cambios agudos de presión arterial
- b. La presión oncótica, cambios agudos de presión arterial y el volumen sanguíneo
- c. La presión osmótica y el volumen sanguíneo
- d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

EL origen de la diabetes insípida es

Seleccione una:

- a. Central o neurogénico
- b. Nefrogénica
- c. Por polidipsia
- d. Todos son posibles orígenes de la diabetes insípida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son posibles orígenes de la diabetes insípida

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermedad de Addison

Seleccione una:

- a. Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula suprarrenal
- b. Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula pineal
- c. Es la estenosis o hiperfunción de la glándula suprarrenal
- d. Es la estenosis o hiperfunción de la glándula pineal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula suprarrenal

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El intervalo glucémico adecuado para el paciente con hiperglucemia en UCI es aún discutido pero los se contemplan en los estudios son valores de glucemia entre:

Seleccione una:

- a. 80-120mg/dl y 120-160mg/dl

- b. 110-140mg/dl y 140-180mg/dl
- c. 95-130mg/dl y 150-180mg/dl
- d. ningún intervalo de los anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 110-140mg/dl y 140-180mg/dl

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El descenso de la glucosa en sangre:

Seleccione una:

- a. Puede causar neuroglucopenia
- b. Se considera hipoglucemia cuando el valor es menor de 70mg/dl
- c. Es frecuencia en personas diabéticas pero puede aparecer también en sujetos sanos y pacientes críticos
- d. todas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: todas son verdaderas

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la diabetes insípida indique la verdadera:

Seleccione una:

- a. No existe ninguna patología llamada diabetes insípida, el nombre correcto es diabetes mellitus
- b. El organismo es incapaz de concentrar la orina y retener el agua

- c. Se produce por aumento en la secreción de vasopresina
- d. Se produce por aumento de la secreción de ADH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El organismo es incapaz de concentrar la orina y retener el agua

Comenzado el miércoles, 4 de diciembre de 2019, 17:47

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 4 de diciembre de 2019, 17:54

Tiempo empleado 7 minutos 13 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los criterios de Davis ¿A qué nivel pertenecen las cirugías subsidiarias de cuidados muy especializados o críticos en su postoperatorio?

Seleccione una:

- a. Nivel I.
- b. Nivel IV.
- c. Nivel V.
- d. Nivel III.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel IV.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hipotermia intraoperatoria no terapéutica tiene efectos fisiológicos. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Vasoconstricción cutánea.
- b. Aumento de la actividad plaquetar.
- c. Estimulación del SNC.
- d. Reducción del aporte de oxígeno a los tejidos quirúrgicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la actividad plaquetar.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se producen la tercera parte de las complicaciones del paciente quirúrgico?

Seleccione una:

- a. En hospitalización quirúrgica.
- b. En URPA y REA.
- c. En el intraoperatorio.
- d. En su domicilio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En URPA y REA.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las complicaciones respiratorias postoperatorias:

Seleccione una:

- a. Son más frecuentes en cirugía traumatológica.
- b. Son la principal causa de muerte en los fallecimientos quirúrgicos.
- c. Suelen ser complicaciones leves.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son la principal causa de muerte en los fallecimientos quirúrgicos.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hipotensión y la bradicardia son efectos secundarios de la anestesia central frecuentes y se previenen con:

Seleccione una:

- a. Drogas vasoactivas.
- b. Relleno vascular con soluciones hipertónicas tras la cirugía.
- c. Relleno vascular previo a la anestesia con soluciones isotónicas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Relleno vascular previo a la anestesia con soluciones isotónicas.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados enfermeros en la sala de recuperación tienen como propósito:

Seleccione una:

- a. Valorar los signos vitales del paciente.
- b. Anticiparse y prevenir complicaciones postoperatorias.
- c. Cubrir las necesidades del paciente.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes hipnóticos endovenosos es preferible usar en anestesia general en caso de inestabilidad hemodinámica:

Seleccione una:

- a. Etomidato.
- b. Propofol.
- c. Midazolam.
- d. Tiopental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etomidato.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una complicación de la anestesia general y regional es la hipotermia intraoperatoria no terapéutica, la cual aumenta el riesgo de morbilidad postoperatoria. ¿Cómo se puede evitar?

Seleccione una:

- a. Monitorización de la temperatura.
- b. Calentamiento con aire caliente.
- c. Administración de fluidos calentado a temperatura corporal.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes anestesis tiene más riesgos:

Seleccione una:

- a. Anestesia general.
- b. Anestesia raquídea.
- c. Bloqueo de Bier.
- d. Bloqueo de nervios periférico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anestesia general.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inducción de la anestesia general tiene 3 objetivos y en un orden concreto. Señale cual:

Seleccione una:

- a. Analgesia, hipnosis y relajación muscular.
- b. Relajación muscular, analgesia e hipnosis.
- c. Relajación muscular, hipnosis y analgesia.
- d. Hipnosis, analgesia y relajación muscular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipnosis, analgesia y relajación muscular.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El shock es una complicación grave postoperatoria y su origen en este caso puede ser:

Seleccione una:

- a. Hipovolémico.
- b. Séptico.
- c. Anafiláctico.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El paciente quirúrgico requiere:

Seleccione una:

- a. Tratamiento quirúrgico.
- b. Tratamiento psicológico.
- c. Medidas higiénicas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué signos vitales deben ser monitoreados por norma general en la sala de recuperación postanestésica? Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Tensión arterial.
- b. Temperatura.
- c. Presión venosa central.
- d. Frecuencia cardíaca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión venosa central.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anestesia epidural está recomendada en cirugías que:

Seleccione una:

- a. No requieran un nivel de bloqueo superior a T10 y con una duración menor a 180 minutos.
- b. No requieran un nivel de bloqueo superior a T8 y con una duración menor a 180 minutos.
- c. No requieran un nivel de bloqueo superior a T10 y con una duración menor a 120 minutos.
- d. Todas las respuestas son incorrectas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las hemorragias se manifiestan clínicamente con: (indique la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Piel seca y fría.
- b. Palidez.
- c. Inquietud.
- d. Aumento de la frecuencia cardiaca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piel seca y fría.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la anestesia raquídea se punciona por debajo de cierto nivel en la columna vertebral lumbar, ya que a partir de este nivel la médula espinal finaliza en el 90% de los pacientes. ¿Cuál es ese nivel?

Seleccione una:

- a. L2-L3.
- b. L5-L6.
- c. L1-L2.
- d. L3-L4.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: L1-L2.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El despertar intraoperatorio es una complicación poco común de la anestesia general y puede estar causado por:

Seleccione una:

- a. Técnica anestésica inadecuada o uso excesivo de bloqueantes neuromusculares.
- b. Pacientes adictos.
- c. Monitorización inadecuada.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El delirium postoperatorio se caracteriza por: (Señale la falsa)

Seleccione una:

- a. Alteración del nivel de conciencia y desorientación.
- b. Fluctuaciones de la actividad motriz.
- c. Alucinaciones.
- d. Normalmente es irreversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Normalmente es irreversible.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el bloqueo de nervios periféricos, el anestesista puede recurrir para localizar de forma más precisa los troncos a bloquear a:

Seleccione una:

- a. Guía por rayos ultrarrojos.
- b. Guía con neuroestimuladores de nervios periféricos.
- c. Guiada por ecografía
- d. b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica del bloqueo regional intravenoso o bloqueo de Bier consta de 6 fases. Indique cuales en orden cronológico a su ejecución:

Seleccione una:

- a. Inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.
- b. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.
- c. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, exanguinación, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.
- d. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, liberación de los torniquetes e inyección de la solución anestésica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.

Comenzado el	martes, 10 de diciembre de 2019, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 10 de diciembre de 2019, 19:09
Tiempo empleado	8 minutos 32 segundos
Puntos	21,00/21,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al tratamiento de una LET:

Seleccione una:

- a. Se retira toda la medicación y solo se deja analgesia para confort de paciente
- b. En el caso de que se determine LET, se decidirá qué patologías se va a tratar y cuáles no, o si solo se van a paliar los síntomas
- c. No hace falta reflejarlo en la historia clínica
- d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el caso de que se determine LET, se decidirá qué patologías se va a tratar y cuáles no, o si solo se van a paliar los síntomas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Llamamos duelo anticipado a aquel:

Seleccione una:

- a. Que se produce antes del proceso de la muerte
- b. Se caracteriza por sentimientos similares a los de un duelo normal
- c. Ayuda a que el shock y el impacto sean menores
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La decisión de LET se realizará en torno a:

Seleccione una:

- a. Preferencia del paciente, preferencia de los allegados, pronóstico (gravedad) y calidad de vida
- b. En la LET no se toma en torno a las preferencias de los allegados
- c. El estilo de vida no es un factor decisivo de LET
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es cierta.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La LET nace por:

Seleccione una:

- a. Las mejoras de las tecnologías, unidas a las mejoras médicas, han modificado las formas y el momento de morir de los pacientes, llegando a plantearse, si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.
- b. Por la necesidad de bajar los costes de la sanidad
- c. Por experimentos científicos
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las mejoras de las tecnologías, unidas a las mejoras médicas, han modificado las formas y el momento de morir de los pacientes, llegando a plantearse, si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de la década de los años 70 del siglo XX la relación médico-paciente ha sido tradicionalmente

Seleccione una:

- a. humanista
- b. paternalista
- c. absolutista
- d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En todas las Comunidades Autónomas existe un Registro Oficial de testamentos vitales:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. falso
- c. La Ley permitirá hasta 2016 que todas las comunidades creen el registro oficial de este documento
- d. Como no es un documento obligatorio no existe registro oficial en todas las comunidades pero puede formalizarse en cualquier ayuntamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entenderemos en las fases del duelo, la fase de desorientación y desesperación:
Seleccione una:

- a. Periodo marcado por sentimientos depresivos y falta de ilusión por la vida
- b. A veces aparece en esta fase reproches, agresividad, pérdida de la seguridad y autoestima.
- c. Se caracteriza por un sentimiento de incredulidad
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Periodo marcado por sentimientos depresivos y falta de ilusión por la vida

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El documento de Voluntades Anticipadas:

Seleccione una:

- a. puede ser anulado en caso de enfermedad terminal
- b. no puede ser revocado ni anulado
- c. solo puede modificarlo el cuidador principal
- d. puede ser anulado en cualquier momento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: puede ser anulado en cualquier momento

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En base al documento sobre la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos, todo paciente tiene derecho a:

Seleccione una:

- a. Recibir apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental
- b. Garantizar que ningún enfermo terminal sea tratado médicamente ni tecnológicamente en contra de su voluntad
- c. Asegurar las formulaciones realizadas en Testamento Vital o Voluntades anticipadas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las siglas LET corresponden a:

Seleccione una:

- a. LET (Limitación del encarnizamiento terapéutico)
- b. LET (Limitación del esfuerzo terapéutico)
- c. Todas verdaderas
- d. Todas falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: LET (Limitación del esfuerzo terapéutico)

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles de las siguientes afirmaciones es FALSA:

Seleccione una:

- a. La LET consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas para la finalidad terapéutica que se plantea en un paciente con mal pronóstico vital y/o mala calidad de vida
- b. No iniciar medidas de tratamiento no se considera una LET
- c. Se tendrá en cuenta las preferencias de los pacientes para tomar la decisión de LET
- d. Los conocimientos médicos unidos a las tecnologías, han permitido modificar las circunstancias modo y momento de la muerte de las personas que acceden a estos recursos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No iniciar medidas de tratamiento no se considera una LET

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas medidas de soporte vital son:

Seleccione una:

- a. La respiración asistida
- b. Higiene
- c. Técnicas de depuramiento extrarrenal
- d. a y c son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son verdaderas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Abstenerse de actuar cuando la muerte o enfermedad parecían ser irreversibles era una obligación moral en:

Seleccione una:

- a. Grecia clásica
- b. Antiguo Egipto
- c. Segunda mitad del siglo XX
- d. Nunca se ha seguido esa obligación moral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grecia clásica

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Unos de los problemas éticos de la LET es:

Seleccione una:

- a. Las dificultades para diagnosticar la irreversibilidad o terminalidad de un paciente
- b. Negación de los familiares a una LET
- c. Obstinación profesional, derivado de falta de experiencia y de una posición vitalista el médico que le trata.
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todo paciente tiene derecho a (señale la falsa)

Seleccione una:

- a. Recibir información veraz y completa y respetando, en su caso, el derecho del paciente a no ser informado.
- b. Recibir los cuidados necesarios dirigidos para conllevar de la forma más confortable el proceso de enfermedad y muerte.
- c. Acto eutanásico.
- d. Recibir apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acto eutanásico.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. Si los familiares se niegan a una LET, no se realizará
- b. El comité de ética toma la decisión de una LET
- c. Se necesita autorización jurídica, siempre que se realice una LET
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Surgimiento de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

Seleccione una:

- a. segunda mitad del siglo XX
- b. primera mitad del siglo XX
- c. tras la Guerra civil
- d. ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: segunda mitad del siglo XX

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La OMS define calidad de vida como:

Seleccione una:

- a. El nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad poseen en un momento y espacio específicos.
- b. Percepción subjetiva de la vida, propia en las facetas físicas, psíquicas y sociales
- c. Niveles de generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Percepción subjetiva de la vida, propia en las facetas físicas, psíquicas y sociales

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre los cuidados de enfermería en paciente con un pronóstico de enfermedad terminal

Seleccione una:

- a. No es tarea ni hace parte de cuidados de enfermería el escuchar a los familiares en duelo.
- b. Deberíamos intentar que el familiar en duelo no llore delante de nosotros
- c. Evitar decir a la persona lo que tiene que hacer, decirle cómo se siente y no darle falsas esperanzas.
- d. Procuraremos decirle lo que debe sentir y cómo debería sentirse.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar decir a la persona lo que tiene que hacer, decirle cómo se siente y no darle falsas esperanzas.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados proporcionados al final de la vida (indique la verdadera)

Seleccione una:

- a. Hay que mantener a la familia al margen
- b. No se tiene en cuenta las preferencias de los pacientes por considerarse que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad emocional.
- c. el médico se desvincula del paciente por no requerir más que cuidados básicos de enfermería.
- d. Ninguna es verdadera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es verdadera

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Poder escoger libremente una muerte digna es

Seleccione una:

- a. eutanasia
- b. una utopía
- c. un derecho individual
- d. Todas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: un derecho individual