

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [A-DC-PNCP](#) / [Anexos](#) / [Exámen caso práctico I](#)

Comenzado el martes, 12 de diciembre de 2017, 16:20

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 12 de diciembre de 2017, 16:24

Tiempo empleado 4 minutos 14 segundos

Puntos 13,00/15,00

Calificación 8,67 de 10,00 (87%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aparece cambio de rol en el paciente.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Como síntomas principales a abordar en este paciente sería el dolor y la disnea.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la valoración, es importante la observación del estado de la piel.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los principales objetivos en cuidados paliativos, se encuentra el control de síntomas y la atención a la familia.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro del nivel de complejidad en pacientes paliativos, podríamos decir que por el proceso oncológico, sería predictorio que tenga un nivel intermedio, alto de complejidad.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El abordaje interdisciplinar, la coordinación y la continuidad asistencial no son importantes en este caso.

Seleccione una:

- a. Falso ✓
- b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El diagnostico enfermero Baja autoestima situacional no debería de abordarse como uno de los problemas prioritarios, después de control de síntomas como dolor o disnea.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El diagnostico enfermero Baja autoestima situacional podemos identificarlo en este caso.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El paciente está incluido dentro de la población diana como paciente paliativo.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

El test de Barthel se le pasaría para valorar la dependencia a las actividades instrumentales de la vida diaria.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✗
- b. Falso

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El test de Katz se pasaría para valorar la dependencia a las actividades básicas de la vida diaria.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los problemas detectados se encuentra el dolor, sería conveniente pasarle la escala de Goldberg para medir el nivel de dolor percibido sobre todo antes y después de la toma de analgésicos.

Seleccione una:

- a. Falso ✓
- b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Identificamos al hijo como cuidador principal.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

La escucha activa es un criterio de resultado a tener en cuenta en el paciente paliativo.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✗
- b. Falso

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Se identifica como cuidadora principal su esposa, que vive con él.

Seleccione una:

- a. Falso ✓
- b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso