

Comenzado el	martes, 30 de octubre de 2018, 23:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 30 de octubre de 2018, 23:32
Tiempo empleado	1 minutos 31 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de un máximo de 10,00 (80%)
Comentario -	Apto

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Paciente neonato que precisa maniobras de resucitación cardiopulmonar tras sufrir accidente de tráfico. Viajaba en coche sin adecuada colocación del arnés, sufriendo fuerte TCE.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la bolsa de ventilación ¿Qué volumen tidal es el adecuado para facilitar la ventilación?

Seleccione una:



a. 5-8 ml/Kg ✓



b. 6-10 ml/kg



c. 2-3 ml/kg



d. Ninguna es correcta

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de necesitar intubación orotraqueal ¿en que posición se debe colocar al niño?

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito lateral izquierdo con la cabeza en posición neutra
- ☐ b. Decúbito supino con la cabeza lateralizada
- ☒ c. Decúbito supino con la cabeza en posición neutra o ligera extensión ✓
- ☐ d. Decúbito lateral izquierdo con la cabeza en ligera extensión

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a las compresiones torácicas, señala la correcta (según nuestra documentación de estudio):

Seleccione una:

- ☐ a. El masaje cardiaco está indicado cuando la FC es menor de 60 lpm
- ☐ b. Después de 30 segundos de adecuada ventilación
- ☐ c. El masaje cardiaco solo se realiza cuando la FC en menor de 40 lpm
- ☒ d. A y B son ciertas ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué dosis de adrenalina es la indicada en estos pacientes?

Seleccione una:

- ☒ a. 0.01-0.03 mg/kg ✓
- ☐ b. 0.01-0.03microgramos /kg
- ☐ c. 0.1-0.3 mg/kg
- ☐ d. 0.01-0.03 mg

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta


Sobre la Naloxona señala la correcta:

Seleccione una:



a. Indicada en Depresión respiratoria en RN cuya madre ha recibido narcóticos en las 5 h previas al parto



b. Puede administrarse sin haber iniciado ventilación 



c. No se debe usar en madre adictas a opiáceos



d. Todas son falsas