

MODULO III

Actuación enfermera paciente renal en tto sustitutivo

1. Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la prueba utilizada para evaluar el transporte de pequeños solutos?

Seleccione una:

- a. TEP ó test de equilibrio peritoneal

2. Dentro de las características que definen a la diálisis peritoneal, no se encuentra:

- d. La utilización de la técnica en pacientes estadio IV

3. El funcionamiento de la DP, deberá permitir que en el paciente se produzca:

- d. Todas las opciones son correctas

4. El peritoneo, desde el punto de vista anatómico, está vascularizado por:

- a. El peritoneo visceral está irrigado por la arteria mesentérica superior y el retorno venoso se realiza por la circulación portal

5. El transporte del peritoneo se realiza por:

- d. Todas las opciones son correctas

6. En la diálisis peritoneal continua ambulatoria DPCA, no se contempla:

- d. Se realiza por la noche

7. La elección de la diálisis peritoneal automática, suele ser la primera opción en:

- a. Las opciones 2 y 3 son correctas

8. En la porción intraperitoneal del catéter encontramos, señale la opción correcta:

- d. Todas las opciones son correctas

9.En la Unidad de DP, el equipo de enfermera tendrá en cuenta los 4 pilares básicos de la actuación en el tratamiento del paciente:

a. Todas las opciones son correctas

10.En la visita domiciliaria se valorará:

c. Todas las opciones son correctas

11.En los cuidados diarios del catéter, no se encuentra:

c. Presión de la porción exterior y del adaptador del catéter para asegurar la permeabilidad

12.Entre la anestesia que se puede utilizar para la implantación del catéter, no se encuentra:

d. Epidural

14.Entre las características ideales de un catéter de peritoneal, no está:

d. La parte interior del catéter será flexible, mientras que la exterior será semirígida.

15.La diálisis peritoneal automática DPA:

Seleccione una:

a. Todas las opciones son correctas

16.La función de los agentes osmóticos es:

d. Opciones 1 y 2 son correctas

17.Las 5 fases de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, no contemplan:

Seleccione una:

a. Limpieza y desinfección

18Las características del líquido de DP serán:

d. Todas las opciones son correctas

19. Para el comienzo de la DP, se valorá:

- b. Todas las opciones son correctas

20. Para la implantación de catéter puede utilizarse:

- c. Todas las opciones son correctas

21. Respecto a la hemodiálisis, la DP mejora la situación funcional del paciente, por:

- d. Las opciones 1 y 2 son correctas

22. Respecto al comienzo de la DP es correcto que:

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas

23. Son contraindicaciones relativas para la posibilidad de utilizar la DP:

- d. Todas las opciones son correctas

24. Tras la cirugía:

- d. Se mantiene el orificio tapado la primera semana

25. Una vez colocado el catéter, es necesario:

- d. Las dos son correctas