

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valorar.

Seleccione una:

- ☐ a. Tórax
- ☐ b. Abdomen
- ☐ c. Vía aérea
- ☒ d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

mediante estas herramientas podemos valorar signos y síntomas de múltiples patologías

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La diferencia entre fractura costal y volet costal es:

Seleccione una:

- ☐ a. En el volet se dan de 2 o más fracturas de la misma costilla
- ☐ b. En la fractura costal puede llegar a desgarrar muscular, pulmones y vasos
- ☐ c. En el volet costal, la reparación quirúrgica no es una opción terapéutica
- ☒ d. A y b son correctas

#### Retroalimentación

la reparación quirúrgica puede ser necesario, para reparar esas fracturas en la misma costilla

La respuesta correcta es: A y b son correctas

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando valoramos mediante la palpación, vigilaremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Escuchar la correcta ventilación de ambos pulmones
- ☒ b. Simetría de ambos campos
- ☐ c. Aparición de hematomas
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

simetría de ambos campos, si hay correcta expansión o deformidades

La respuesta correcta es: Simetría de ambos campos

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el neumotórax a tensión, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Existen una lesión penetrante
- ☐ b. Hay una rápida entrada unidireccional de aire en la pleura
- ☐ c. Puede comprimir vasos importantes
- ☐ d. Puede obstruir el retorno venoso al corazón

Retroalimentación

no existe lesión penetrante como causa principal

La respuesta correcta es: Existen una lesión penetrante

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas estructuras es fija y puede producir rotura aórtica?:

Seleccione una:

- ☒ a. Inicio de aorta descendente
- ☐ b. Arco aórtico
- ☐ c. Aorta ascendente
- ☐ d. Todas son estructuras móviles

Retroalimentación

el inicio de la aorta descendente está fija a la columna vertebral

La respuesta correcta es: Inicio de aorta descendente

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estos signos no aparece en la rotura traqueobronquial:

Seleccione una:

- ☒ a. Bradipnea
- ☐ b. Palidez y sudoración
- ☐ c. Descenso de SpO2
- ☐ d. Enfisema subcutáneo

Retroalimentación

además de taquipnea, disnea, angustia, ingurgitación yugular, hemoptisis...

La respuesta correcta es: Bradipnea

### Pregunta 7

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos orificios no presenta el músculo diafragma?

Seleccione una:

- ☐ a. Aórtico y vena cava inferior
- ☐ b. Esofágico
- ☒ c. Gástrico
- ☐ d. Todos son correctos

Retroalimentación

presenta 3 orificios: aórtico, vena cava inferior y esofágico

La respuesta correcta es: Gástrico

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El volet costal:

Seleccione una:

- ☐ a. El manejo inicial será la IOT precoz anticipándonos al empeoramiento del paciente
- ☐ b. La ventilación con presión positiva está contraindicada
- ☒ c. El objetivo principal será el control del dolor
- ☐ d. Está indicada la inmovilización de la caja torácica para evitar dolor

Retroalimentación

también se puede administrar oxígeno para mantener SpO<sub>2</sub> y la reposición con volumen debe ser cuidadosa. El manejo avanzado de la vía aérea puede ser necesario, pero no tiene porqué ser la primera opción

La respuesta correcta es: El objetivo principal será el control del dolor

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En la valoración de la respiración del trauma torácico, señala la verdadera:

Seleccione una:

- ☐ a. No retirar el collarín cervical para la valoración
- ☐ b. No debemos exponer al paciente para evitar la hipotermia
- ☐ c. La cianosis es un signo precoz de la hipoxia
- ☒ d. Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón

respiratorio

#### Retroalimentación

el resto son falsas, se puede retirar el collarín bajo fijación bimanual y alineación cabeza-cuello- tronco. Debemos exponer al paciente y la cianosis es un signo tardío

La respuesta correcta es: Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón respiratorio

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A qué altura se encuentra el diafragma en espiración forzada:

Seleccione una:

- ☐ a. 5º y 6º espacios intercostales
- ☐ b. 6º y 7º espacios intercostales
- ☒ c. 4º y 5º espacios intercostales
- ☐ d. 2º y 3º espacios intercostales

#### Retroalimentación

varía según el momento respiratorio

La respuesta correcta es: 4º y 5º espacios intercostales

#### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante lesión cardíaca cerrada puede producir

Seleccione una:

- ☐ a. Contusión cardíaca
- ☐ b. Rotura valvular
- ☐ c. Rotura cardíaca
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

se suele producir por impacto de alta energía en la parte anterior del tórax

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino superior se extiende desde:

Seleccione una:

- ☐ a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- ☐ b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior



c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma



d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

#### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La acumulación de sangre en tórax menor que 1500 ml se denomina:

Seleccione una:



a. Neumotórax abierto



b. Hemotórax simple



c. Hemotórax masivo



d. Neumotórax a tensión

#### Retroalimentación

si es mayor de 1500 ml se denomina hemotórax masivo

La respuesta correcta es: Hemotórax simple

#### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para un paciente con neumotórax a tensión, ¿en qué región anatómica puedes pinchar para descomprimir?

Seleccione una:

- ☐ a. 4º espacio intercostal línea media clavicular
- ☐ b. 2º espacio intercostal línea media axilar
- ☒ c. 5º espacio intercostal línea media axilar
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

se puede pinchar también en 2º espacio intercostal línea media clavicular

La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal línea media axilar

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración neurológica del paciente con trauma torácico utilizaremos: señale la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. GCS
- ☐ b. Tamaño pupilar
- ☐ c. Reactividad pupilar
- ☒ d. Color pupilar

Retroalimentación

también asimetría pupilar, nivel de conciencia...

La respuesta correcta es: Color pupilar

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para pinchar neumotórax a tensión, que tipo de técnica es preferible?



Seleccione una:

- ☐ a. Descompresión con aguja si no hay experiencia
- ☐ b. Toracostomía
- ☐ c. Colocación posterior de válvula de Heimlich si hay experiencia
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El hemoneumotórax suele ser causado por:

Seleccione una:

- ☐ a. Heridas de bala
- ☐ b. Asta de toro
- ☐ c. Empalamiento
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

además de arma blanca, metralla, esquirlas óseas...

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino inferior se extiende desde:

Seleccione una:

- ☐ a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- ☐ b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- ☐ c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- ☒ d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

#### Pregunta 19

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El tratamiento definitivo del taponamiento cardiaco es:

Seleccione una:

- ☐ a. Pericardiocentesis
- ☒ b. Quirúrgico
- ☐ c. Infusión rápida de a-adrenérgicos
- ☐ d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

el tratamiento quirúrgico es el definitivo

La respuesta correcta es: Quirúrgico

#### Pregunta 20

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el taponamiento cardiaco:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un acúmulo de sangre en cavidades cardiacas
- ☒ b. Afecta al gasto cardiaco
- ☐ c. La tensión arterial se eleva
- ☐ d. A y b son correctas

Retroalimentación

acúmulo de sangre en pericardio, hipotensión arterial y afecta al gasto cardiaco

La respuesta correcta es: Afecta al gasto cardiaco