

[Página Principal](#)[Mis cursos](#)[CT.Q063](#)[Asignatura 9: Procedimiento clínico asistencial de donación de órganos](#)[Evaluación final Asignatura 9](#)

Comenzado el	viernes, 16 de junio de 2023, 19:04
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 16 de junio de 2023, 19:20
Tiempo empleado	16 minutos 40 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto



Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique que órganos puede donar un donante muerto:

Seleccione una:

- ☐ a. Corazón
- ☐ b. Hígado
- ☐ c. Córneas
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En las alteraciones fisiológicas del donante puede aparecer poliuria, cuáles pueden ser las causas. Indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Diabetes Insípida
- ☐ b. Hipovolemia
- ☐ c. Hiperglucemia
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas



Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El objetivo a nivel renal, en relación a la diuresis debe ser:

Seleccione una:

- ☒ a. Diuresis 1-2 cc/Kg/h. ✓
- ☐ b. Diuresis 3-5 cc/ kg/h
- ☐ c. Diuresis menor a 10 cc/ Kg/h
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Diuresis 1-2 cc/Kg/h.



Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En la Conferencia de Maastricht, se definieron cuatro categorías dentro de los donantes para diferenciar su viabilidad y soporte ético legal. Indica que significa cuando tienes un donante de tipo III

Seleccione una:

- ☐ a. Ingresados cadáveres
- ☐ b. Parada cardiaca durante el diagnóstico de muerte cerebral.
- ☐ c. Resucitación infructuosa
- ☒ d. Parada cardiaca controlada ✓

La respuesta correcta es: Parada cardiaca controlada



Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los DCP extrahospitalarios son:

Seleccione una:

- ☐ a. Son pacientes que han sufrido una PCR irreversible fuera del hospital
- ☐ b. Son trasladados con medidas de soporte vital con el fin de donar órganos
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro de que categoría estaría en la clasificación de Maastricht los llamados donantes incontrolados.

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo I y II ✓
- ☐ b. Tipo III y IV
- ☐ c. Todos estarían dentro de la clasificación
- ☐ d. Solo estaría en el Tipo III

La respuesta correcta es: Tipo I y II



Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué se caracterizan los llamados donantes incontrolados?

Seleccione una:

- ☐ a. Aquellos que a la llegada a la emergencia del hospital sufren PCR reversible
- ☐ b. C y D son correctas
- ☐ c. No podemos conocer con exactitud el tiempo de "isquemia fría"
- ☒ d. Son de tipo I y II ✓

La respuesta correcta es: Son de tipo I y II



Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica los objetivos principales en los DCP extrahospitalarios

Seleccione una:

- ☐ a. Conseguir una óptima coordinación entre el medio extrahospitalario y hospitalario
- ☐ b. El tiempo desde la PCR hasta el inicio del bypass cardiopulmonar tiene que ser menor de dos horas o el menor tiempo posible
- ☐ c. Mantener viables los órganos y tejidos de los DCPE.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas



Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Que rango de edad preferente se necesita para la donación de hígado y riñones

Seleccione una:

- ☐ a. Donante menor de 50 años
- ☒ b. Donante mayor de 50 años ✖
- ☐ c. Donante mayor de 60 años
- ☐ d. Es indistinto la edad que se tenga

La respuesta correcta es: Donante menor de 50 años

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Que rango de edad se establece para la donación de pulmones

Seleccione una:

- ☒ a. Donante mayor de 55 años ✖
- ☐ b. Donante menor de 50 años
- ☐ c. Donante menor de 70 años
- ☐ d. Donante menor de 80 años

La respuesta correcta es: Donante menor de 50 años



Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál es el tiempo total estimado necesario para incluir a un donante desde el inicio de PCR hasta la llegada al Hospital (isquemia caliente).

Seleccione una:

- ☐ a. Inferior a 100 minutos
- ☐ b. Inferior a 120 minutos
- ☒ c. Inferior a 90 minutos ✓
- ☐ d. No hay tiempo estimado siempre y cuando no se haya producido una PCR

La respuesta correcta es: Inferior a 90 minutos



Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál es el proceso que determina una muerte encefálica en un futuro donante de órganos

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando en una patología intracraneal, la PIC desciende y aumenta la perfusión cerebral
- ☒ b. La presión intracraneal (PIC) se eleva por encima de la presión de perfusión cerebral (PPC), dando lugar a una parada circulatoria cerebral ✓
- ☐ c. No hay relación entre el ascenso o descenso de la PIC con el daño cerebral producido
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: La presión intracraneal (PIC) se eleva por encima de la presión de perfusión cerebral (PPC), dando lugar a una parada circulatoria cerebral



Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál es la función del test de atropina

Seleccione una:

- ☐ a. Explora farmacológicamente la actividad del corazón
- ☒ b. Explora farmacológicamente la actividad del nervio vago y de sus núcleos tronco-encefálicos ✓
- ☐ c. Explorar si es viable ampliar la perfusión del corazón
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Explora farmacológicamente la actividad del nervio vago y de sus núcleos tronco-encefálicos

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Identifica cuidados generales en un DCP

Seleccione una:

- ☐ a. Una correcta higiene general
- ☐ b. Mantendrán medidas de curación y de prevención de úlceras por presión
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: A y B son correctas



Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El objetivo de mantenimiento cardiovascular con respecto a la Presión Venosa Central

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 10-12 cmH₂O ✓
- ☐ b. Entre 12-15 cm H₂O
- ☐ c. Entre 5-10 cmH₂O
- ☐ d. menor de 18 cmH₂O

La respuesta correcta es: Entre 10-12 cmH₂O

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

identifica los parámetros correctos para mantener la función respiratoria correcta en un DCP

Seleccione una:

- ☐ a. PaO₂ mayor o igual a 100 mmHg.
- ☐ b. PaCO₂ entre 35 y 45 mmHg.
- ☐ c. SaO₂ entre 95 y 100 %.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas



Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

cuidados de enfermería para mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar acodamientos del tubo orotraqueal y/o tubuladuras del respirador.
- ☐ b. Aspiración de secreciones traqueobronquiales con técnica estéril evitando atelectasias e infecciones
- ☐ c. La cabecera de la cama del donante se colocará en un ángulo entre 30°- 45° para evitar broncoaspiraciones
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas



Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual es el objetivo del mantenimiento de la temperatura corporal del donante.

Seleccione una:

- ☒ a. mayor de 35°C siendo la ideal 37° C. ✓
- ☐ b. Menor de 35°C siendo ideal mantenerle en hipotermia
- ☐ c. mayor de 38°C
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: mayor de 35°C siendo la ideal 37° C.



Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles son los cuidados paliativos para el mantenimiento de la temperatura.

Seleccione una:

- ☐ a. administrar sueros calentados a 37°C
- ☐ b. Colocación de mantas térmicas y de aluminio para evitar la pérdida de calor
- ☐ c. calentamiento de los gases inspirados mediante regulación de la temperatura de los humidificadores y calentamiento externo mediante lámparas de calor a una distancia de 0,5-1 m del donante
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas



Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Actuaciones en caso de diabetes insípida. Señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Control por turno de la diuresis
- ☐ b. Restricción de líquidos
- ☒ c. administración de desmopresina ✓
- ☐ d. Administrar noradrenalina

La respuesta correcta es: administración de desmopresina

Actividad previa

[◀ Evaluación inicial
Asignatura 9](#)[Ir a...](#)

Siguiente actividad

[Documento de estudio ▶](#)

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

[🌐 https://www.fuden.es](https://www.fuden.es)