

# Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

**Comenzado el** jueves, 23 de abril de 2020, 12:11

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 23 de abril de 2020, 12:12

**Tiempo empleado** 1 minutos 12 segundos

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario - Apto**

## Información

Eres un DUE de un centro de salud en una población alejada, en la que el hospital más cercano está a unos 50 km y la ambulancia municipal no está operativa ya que son las fiestas patronales del pueblo de al lado. Te envían a valorar un accidente laboral de un agricultor con caída desde una cosechadora (unos 3-4 metros de altura), arrollamiento del propio vehículo (cosechadora) al caer del mismo y eres el recurso más cercano. Acabas de hacer un curso de politraumatizado por lo que sabes que....

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el 1º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- ☒ a. Lesiones órganos vitales ✓
- ☐ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Shock séptico
- ☐ d. Hemorragias cerebrales

normalmente corazón, cerebro y/o laceración de grandes vasos

La respuesta correcta es: Lesiones órganos vitales

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Fase de la actuación ante un politraumatizado que consiste en “detección de aquellos problemas que poner en riesgo la vida del paciente y resolverlos de inmediato”

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración secundaria
- ☐ b. Tratamiento definitivo
- ☐ c. Exposición neurológica
- ☒ d. Valoración primaria ✓

La respuesta correcta es: Valoración primaria

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la valoración de la vía aérea en la valoración primaria, que maniobra no realizaremos

Seleccione una:

- ☐ a. Intubación orotraqueal
- ☐ b. Colocar collarín cervical
- ☐ c. Retirada de cuerpo extraño en vía aérea
- ☒ d. A y b son incorrectas ✓

en valoración primaria realizaremos maniobras esenciales con estricto control de eje cuello-cabeza y permeabilidad de la vía aérea, como elevación mandibular, retirada de cuerpo extraño, tubo de guedel...

La respuesta correcta es: A y b son incorrectas

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Ante un paciente con apertura ocular a la presión (~dolor), retira el miembro como respuesta motora y orientado como respuesta verbal, tendrá un GCS de:

Seleccione una:

- ☐ a. 10
- ☒ b. 11 ✓
- ☐ c. 12
- ☐ d. 9

AO=2, RM=4, RV=5

La respuesta correcta es: 11

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la estabilización del paciente politraumatizado, cuando valoramos la ventilación, debemos identificar posibles patologías como.... Señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Neumotórax a tensión o abierto
- ☐ b. Hemotórax
- ☒ c. Crepitantes bibasales ✓
- ☐ d. A y b son correctas

este ítem no se valorará en la estabilización

La respuesta correcta es: Crepitantes bibasales

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En la reposición de volumen en el paciente traumatizado, señala lo correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. En extrahospitalaria administrar cristaloides para mantener pulso central hasta que haya control de hemorragia
- ☐ b. En hospital priorizar reposición amplia de volumen hasta el control de hemorragia
- ☐ c. Administrar ácido tranexámico IV para prevenir la coagulopatía
- ☒ d. A y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál de estas actividades no debe incluir la valoración secundaria?

Seleccione una:

- ☐ a. Historia clínica
- ☒ b. Compresión de hemorragias ✓
- ☐ c. Examen físico al detalle
- ☐ d. Toma de constantes

es más propio de valoración primaria

La respuesta correcta es: Compresión de hemorragias

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En la valoración de cuello (valoración secundaria) es falso:

Seleccione una:

- ☒ a. Retiraremos collarín cervical ante un TCE sin inmovilizar previamente con manos ✓
- ☐ b. Buscar cortes, hemorragias
- ☐ c. Buscar desviación traqueal, enfisema subcutáneo
- ☐ d. Movilizar en bloque

se puede retirar el collarín para valora siempre se inmovilice bimanualmente durante la valoración

La respuesta correcta es: Retiraremos collarín cervical ante un TCE sin inmovilizar previamente con manos

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la valoración del abdomen realizaremos...

Seleccione una:

- ☐ a. Auscultación del peristaltismo
- ☐ b. Percusión de abdomen, buscando zonas dolorosas
- ☐ c. Inspección buscando distensión abdominal, hematoma o heridas
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la valoración de la pelvis del paciente politraumatizado, señala la incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Realizar en pacientes con fractura de pelvis evidente ✓
- ☐ b. Inmovilizar con faja pélvica o dispositivo compatible si se dispone
- ☐ c. No realizar exploración en pacientes en shock
- ☐ d. Todas son falsas

No se debe realizar en pacientes con fractura evidente, ya que puede aumentar el sangrado

La respuesta correcta es: Realizar en pacientes con fractura de pelvis evidente

[Volver a: Módulo 2: Atenc... ➡](#)