

Módulo 4: Tumores vasculares en la infancia

1) ¿Cuál de los siguientes tipos de hemangiomas NO se incluye en la clasificación clínica de estos tumores?

- ☐ a) Mixtos.
- ☐ b) Segmentarios.
- ☒ c) Abortivos.
- ☐ d) Multifocales.
- ☐ e) Indeterminados.

2) ¿Cuál de estas lesiones puede confundirse con un angioma infantil?

- ☒ a) Miofibroma infantil.
- ☐ b) Glioma nasal.
- ☐ c) Hemangioma en penacho.
- ☐ d) Malformación venosa.
- ☐ e) Todas las anteriores.

3) ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO está relacionada con el síndrome SACRAL/LUMBAR?

- ☐ a) Disrrafismo espinal.
- ☐ b) Ano imperforado.
- ☐ c) Agenesia renal.
- ☐ d) Anomalías de los genitales.
- ☒ e) Aneurismas de la aorta abdominal.

4) ¿Cuál de estas localizaciones puede llevar asociado un angioma en la vía aérea alta?

- ☐ a) Área mandibular.

- ☐ b) Mentón.
- ☐ c) Labio inferior.
- ☐ d) Las opciones correctas son *a* y *c*.
- ☒ e) Las opciones correctas son *a*, *b* y *c*.

5) ¿Cuál de estos tumores vasculares es maligno?

- ☐ a) Hemangioendotelioma kaposiforme.
- ☐ b) Hemangioendotelioma epiteliode.
- ☐ c) Tumor de Dabska.
- ☐ d) Hemangioma de células fusiformes.
- ☒ e) Todos ellos son malignos.

6) En relación con los angiomas congénitos, identifique la afirmación FALSA.

- ☐ a) Siempre están presentes al nacimiento.
- ☐ b) Los hemangiomas congénitos no involutivos presentan alto flujo en la ecografía Doppler.
- ☐ c) Afectan por igual a ambos sexos.
- ☐ d) Pueden provocar trombocitopenia y coagulopatía.
- ☒ e) Muestran una respuesta parcial al propranolol.

7) En relación con los hemangiomas infantiles, señale la afirmación FALSA.

- ☐ a) Son los tumores más frecuentes en la infancia.
- ☐ b) Son más frecuentes en prematuros.
- ☐ c) Afectan más al sexo femenino.
- ☒ d) Suelen estar presentes al nacimiento.
- ☐ e) El mayor crecimiento ocurre en los tres primeros meses de vida.

8) Respecto a los hemangiomas abortivos, señale la afirmación verdadera.

- ☐ a) Son negativos al GLUT-1.
- ☐ b) Nunca dejan secuelas.
- ☐ c) Se pueden confundir con malformaciones capilares.
- ☐ d) Son más frecuentes en varones.
- ☒ e) Todas son falsas.

9) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento de los angiomas infantiles con propranolol es verdadera?

- ☐ a) Tiene una eficacia similar a la de la vincristina.
- ☐ b) No es eficaz en angiomas de más de un año de evolución.
- ☒ c) Debe administrarse en dos dosis separadas.
- ☐ d) Debe suspenderse reduciendo la dosis de forma progresiva.
- ☐ e) Para iniciar el tratamiento, el paciente ha de ingresar en el hospital.

10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al hemangioendotelioma kaposiforme es verdadera?

- ☐ a) Es un tumor presente siempre al nacimiento.
- ☐ b) Puede provocar metástasis.
- ☒ c) Para su diagnóstico, la prueba más útil es la resonancia magnética.
- ☐ d) Puede afectar a la piel y al hígado.
- ☐ e) El tratamiento de elección es la rapamicina oral.