

1-Con respecto a la temperatura corporal, señale la falsa:

No se considera una constante vital ya que fluctúa continuamente y no se mantiene estable en el tiempo.

2-El centro termorregulador del organismo se encuentra formado por:

Hipotálamo.

3-De las siguientes afirmaciones, señale la opción incorrecta:

El aumento de la temperatura corporal por encima de los 37°C es considerado siempre fiebre, independientemente de que ésta sea central o periférica.

4-Con respecto a la PCT diremos que:

Sus valores en sangre pueden llegar a ser indetectables.

5-Para evitar cuadros hipotensivos se recomienda:

Administrar el metamizol en un intervalo de 20 a 30 minutos por vía intravenosa.

6-Un paciente no podrá presentar fiebre si:

Todas son falsas.

7-Un paciente con fiebre y cefalea que vomita varias veces y que presenta petequias en los miembros inferiores:

Se vigilará la aparición de nuevas manchas o cambios en su estado.

8-¿Cuántos miligramos de ibuprofeno hay en 3.25ml de una solución al 4% de este fármaco?

130mg

9-Independientemente de la temperatura exterior, el humano puede disipar calor gracia a:

La evaporación.

10- La termogénesis es:

Un proceso constante derivado del metabolismo celular.

11-En el shock séptico primará el uso de líquidos de qué tipo:

Cristaloides, como el SSF.

12-Un paciente de 10 días de vida presenta en su domicilio una temperatura axilar de 38.2°C, no ha estado en contacto con otras personas que no sean sus padres pues temían sacarlo de casa o que recibiese visitas, no presenta ningún otro signo alarmante y no tiene enfermedades conocidas.

El paciente puede estar sufriendo una pielonefritis.

13-¿Cuál de éstas es una medida adecuada para evitar los errores de administración medicamentosa?

Una entrevista cuidadosa con el cuidador del menor.

14-Se considera que la medición de la temperatura en esta región es central:

Esófago distal.

15-Son parámetros de la escala de Yale:

Todas son correctas.

16-Un paciente presenta una temperatura ótica de 38.7°C, al comprobar dicha temperatura en el otro oído obtenemos un valor de 35.9°C. ¿Qué haría?

Repetir la medición con un termómetro diferente.

17-Si un paciente es alérgico a la dipirona, ¿qué fármaco no deberemos administrarle?

Nolotil 2g/5ml.

18-El hipotálamo puede dictaminar la elevación de la temperatura del organismo por encima

A y B son correctas.

19-Sobre las medidas físicas se puede decir que:

Pueden recomendarse domiciliariamente.

20-Según los criterios de Rochester un paciente quedará excluido de ellos si:

Presenta signos de infección evidentes.