

Curso online de actualización en infecciones de transmisión sexual para enfermería (FNN)

[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[AS-DC-AITS](#)

[Módulo II](#)


[Examen módulo II](#)

[Principio del formulario](#)

[Pregunta 1](#)

[Respuesta guardada](#)

[Puntúa como 1,00](#)



[Marcar pregunta](#)

[Enunciado de la pregunta](#)

Año del descubrimiento del patógeno causante de la Gonorrea por Albert Neisser


Seleccione una:

- ☒ a. 1879
- ☐ b. 1878
- ☐ c. 1877

[Pregunta 2](#)

[Respuesta guardada](#)

[Puntúa como 1,00](#)



[Marcar pregunta](#)

[Enunciado de la pregunta](#)

Características clínicas de la Gonorrea


Seleccione una:

- ☒ a. Uretritis con disuria
- ☐ b. Diarrea
- ☐ c. Leucorrea blanquecina abundante

[Pregunta 3](#)

[Respuesta guardada](#)

[Puntúa como 1,00](#)



[Marcar pregunta](#)

[Enunciado de la pregunta](#)

Clínica de la sífilis


Seleccione una:

- ☐ a. En la sífilis secundaria la manifestación más precoz es la leucorrea maloliente.
- ☐ b. En la sífilis terciaria el paciente permanece asintomático.
- ☒ c. En la sífilis primaria aparecen los chancros.

[Pregunta 4](#)

[Respuesta guardada](#)

[Puntúa como 1,00](#)



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


Cuál de las siguientes no es una conducta favorecedora de desarrollar una vaginosis bacteriana
Seleccione una:

- ☒ a. Utilización de jabones con pH neutro
- ☐ b. Múltiples parejas sexuales
- ☐ c. Duchas vaginales

Pregunta 5

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


Cuál es el grupo de edad más frecuentemente afectado por Chlamydia Trachomatis
Seleccione una:

- ☐ a. 20 - 45 años
- ☒ b. 25 - 34 años
- ☐ c. 15 - 65 años

Pregunta 6

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


Cuál es el tratamiento de elección para la Chlamydia en mujeres embarazadas o gestantes
Seleccione una:

- ☐ a. Penicilina
- ☒ b. Eritromicina
- ☐ c. Doxiciclina

Pregunta 7

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el tratamiento farmacológico de la vaginosis
Seleccione una:


- ☒ a. Clindamicina

- ☐ b. Doxiciclina
- ☐ c. Eritromicina

Pregunta 8

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las ITS producidas por bacterias no encontramos


Seleccione una:

- ☐ a. Chlamydia trachomatis
- ☐ b. Treponema pallidum
- ☒ c. Cándida albicans

Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Diagnóstico de la Gonococia


Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Detección de la bacteria mediante tinción de Gram
- ☐ c. Cultivo de frotis endocervical en medio de Thayer-Martin.

Pregunta 10

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Linfogranuloma venéreo se conoce también como


Seleccione una:

- ☐ a. Herpes genital
- ☐ b. Granulomatosis
- ☒ c. Enfermedad de Nicolas Favre

Pregunta 11

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuál de sus fases es contagiosa la Sífilis


Seleccione una:

- ☐ a. Sífilis terciaria
- ☒ b. Sífilis primaria y secundaria
- ☐ c. En todas sus fases

Pregunta 12

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la infección gonocócica del recién nacido,Cuál es la principal vía de entrada de la infección


Seleccione una:

- ☒ a. Mucosa conjuntival
- ☐ b. El cordón umbilical
- ☐ c. La piel

Pregunta 13

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las uretritis y cervicitis causadas por Chlamydia es frecuente la coinfección con otro patógeno, a cuál nos referimos


Seleccione una:

- ☐ a. Citomegalovirus
- ☒ b. Neiseria gonorrhoeae
- ☐ c. Papilomavirus

Pregunta 14

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Forma de transmisión de la Chlamydia


Seleccione una:

- ☐ a. Transmisión congénita (madre-hijo)
- ☐ b. Contacto sexual
- ☒ c. Ambas

Pregunta 15

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


ITS originada por una bacteria Gram negativa llamada *Haemophilus ducreyi*
Seleccione una:

- ☐ a. Chlamydia
- ☒ b. Chancro blando
- ☐ c. Gonorrea

Pregunta 16

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


La clínica del Chancro blando se caracteriza por
Seleccione una:

- ☒ a. Exudado necrótico, purulento, de color gris amarillento.
- ☐ b. Suele presentarse una única úlcera.
- ☐ c. Pápula, con halo eritematoso no edematosa.

Pregunta 17

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


O'Farrell y Moi, en 2010, propusieron que la Donovanosis genital tenía cuatro tipos de lesiones y las denominaron: úlcera granulomatosa, hipertrófica, necrótica y
Seleccione una:

- ☐ a. Necrosada
- ☒ b. Esclerótica
- ☐ c. Hipertrofiada

Pregunta 18

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


Patógeno causante de la gonorrea o gonococia
Seleccione una:

- ☐ a. Haemophilus ducreyi
- ☒ b. Neisseria gonorrhoeae o gonococo
- ☐ c. Klebsiella granulomatis

Pregunta 19

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Periodo de incubación del Granuloma inguinal


Seleccione una:

- ☒ a. Entre 1 y 12 semanas
- ☐ b. Entre 1 y 10 semanas
- ☐ c. Entre 1 y 15 semanas

Pregunta 20

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Principal bacteria responsable de la vaginosis bacteriana


Seleccione una:

- ☒ a. Gardnerella
- ☐ b. Prevotella.
- ☐ c. Mobiluncus

Pregunta 21

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué bacteria es la encargada de controlar el crecimiento descontrolado de bacterias a nivel vaginal


Seleccione una:

- ☐ a. Las mitocondrias vaginales
- ☐ b. No existe ninguna bacteria con esa función
- ☒ c. El Lactobacillus acidophilus

Pregunta 22

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué infección sexual es también conocida como Lúes


Seleccione una:

- ☐ a. Chlamydia
- ☒ b. Sífilis
- ☐ c. Gonorrea

Pregunta 23

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué zoólogo y qué dermatólogo descubrieron en 1905 el agente causal de la sífilis


Seleccione una:

- ☒ a. Schaudinn y Hoffmann
- ☐ b. Bruck y Neisser
- ☐ c. Schaudinn y Neisser

Pregunta 24

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Quién descubrió el agente causal del Granuloma inguinal


Seleccione una:

- ☐ a. Mc Douglas
- ☐ b. Mc Leod
- ☒ c. Donovan

Pregunta 25

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Síntoma principal de la vaginosis bacteriana

Seleccione una:

- ☒ a. Leucorrea blanco-grisácea maloliente

- ☐ b. Ausencia de leucorrea
- ☐ c. Leucorrea amarillo-verdosa

Final del formulario