


Comenzado el jueves, 26 de septiembre de 2019, 10:10
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 26 de septiembre de 2019, 10:22
Tiempo empleado 11 minutos 23 segundos
Puntos 17,00/20,00
Calificación **8,50** de un máximo de 10,00 (**85%**)
Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que no haremos ante una PCR intrahospitalaria:


Seleccione una:

- a. Llamar al equipo de reanimación/parada.
- b. Iniciar RCP cuanto antes.
- c. Buscar un DESA/DEA o desfibrilador manual y un carro de parada.
- d. Llamar al 112. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el aviso:


Seleccione una:

- a. Informar al centro coordinador o central. ✓
- b. Pedir un DESA/DEA.
- c. Solicitar servicio de bomberos de apoyo.
- d. Llamar al 061.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde la de la piscina, antes de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):


Seleccione una:

- a. Llamar al socorrista acuático.
- b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓
- c. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, deteniendo si es preciso la RCP básica.
- d. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, SIN detener la RCP básica.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP pediátrica la relación compresiones torácicas - ventilaciones es

Seleccione una:


- a. 10:1.

- b. 11:15.
- c. 15:2 ✓
- d. 5:2.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:


Seleccione una:

- a. Tras la 2ª descarga.
- b. Tras la 3ª adrenalina.
- c. Tras la 3ª descarga. ✓
- d. Tras la 4ª descarga con desfibriladores monofásicos y la 5ª en bifásicos.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?


Seleccione una:

- a. De 1 a 2 minutos.
- b. De 3 a 5 minutos. ✓
- c. Cada 10 minutos.
- d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante una OVACE, indica lo incorrecto:


Seleccione una:

- a. Animaremos a toser, cuando la tos no sea efectiva, daremos 5 golpes interescapulares y de no desobstruirse, en el suelo, realizaremos 5 compresiones abdominales tipo Heimlich. ✓
- b. Iniciar RCP directamente si queda inconsciente en el suelo.
- c. No dar golpes interescapulares si la tos es efectiva.
- d. Ante tos no efectiva, paciente consciente y colaborador, tras los 5 golpes interescapulares, realizar maniobra de heimlich.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "T" que definen las PCR reversibles son:


Seleccione una:

- a. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Pulmonar 5)Trombosis Coronaria.
- b. 1)HemoneumoTórax abierto 2)Talasemia 3)Tóxicos 4)Trauma 5)Torniquete.
- c. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Venosa Profunda 5)Trombosis Coronaria. ✗
- d. 1)Timo 2)Talamo 3)Tiroides 4)Talió 5)Temperatura

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las recomendaciones de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes) la comunicación del planteamiento de la donación, siempre que sea posible, la realizará:


Seleccione una:

- a. El mismo profesional que comunicó el fallecimiento.
- b. Un psicólogo clínico experto en urgencias y emergencias.
- c. Un profesional diferente al que comunicó el fallecimiento. ✓
- d. Sólo el coordinador de la ONT del hospital receptor.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El gasping es:


Seleccione una:

- a. Un patrón respiratorio normal en neonatos.
- b. Respiraciones agónicas. ✓
- c. La canción de Francia en Eurovisión 2017
- d. Una técnica de fisioterapia respiratoria.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:


Seleccione una:

- a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. ✓
- b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.
- c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.
- d. El golpe precordial.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A que potencia se dan las descargas en un desfibrilador manual monofásico en caso de PCR por TVSP y/o FV:


Seleccione una:

- a. 360 julios. ✓
- b. 120 julios.
- c. 150 julios.
- d. 200 julios.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada


Seleccione una:

- a. El médico.
- b. El centro coordinador.
- c. El aspirador de secreciones. ✓
- d. El cardio-compresor.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es motivo de exclusión del procedimiento de donante en asistolia:


Seleccione una:

- a. Neoplasias previas. ✓
- b. Más de 50 años de edad.
- c. Muerte no esperada.
- d. Accidente doméstico.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Diastólica (TAD) de un niño entre los 8 y 10 años medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:


Seleccione una:

- a. 60-80 mmHg.
- b. 95 mmHg.
- c. 50-80 mmHg.
- d. 55-90 mmHg. ✓

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la primera opción de permeabilidad de vía aerea en RCP básica instrumental y avanzada


Seleccione una:

- a. La Frova.
- b. Canula orofaringea.
- c. La maniobra frente-menton. ✗
- d. El combitube.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño con un macarrón, alimento hueco o que presenta un espacio abierto o hueco en su centro, se consideran:


Seleccione una:

- a. Una OVACE especialmente sencilla de resolver, ya que por ese hueco circulará el aire de reserva de pulmones y abdomen, y tanto la tos, como los golpes interescapulares, las maniobras de heimlich y las compresiones torácicas serán más efectivas para movilizar el cuerpo extraño gracias al efecto venturi, además de permitir el paso de aire y una mejor ventilación del paciente durante todo el episodio. ✗
- b. Una OVACE normal.
- c. Una OVACE especialmente compleja, ya que por ese hueco circulará el aire de reserva de pulmones y abdomen, y tanto la tos, como los golpes interescapulares, las maniobras de heimlich y las compresiones torácicas serán menos efectivas para movilizar el cuerpo extraño.
- d. No se considera OVACE, aunque genere los mismos signos y síntomas, se trata de una sensación subjetiva con componente psicossomático, ya que se puede vivir con un macarrón alojado en la vía aérea, si este está correctamente alineado y orientado.

Pregunta 18

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un cuidado post-parada:


Seleccione una:

- a. Vía aérea avanzada.
- b. Control de temperatura.
- c. Mantener oxigenación.
- d. Retirar capnografía. ✓

Pregunta 19

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la comprobación de la respiración en RCP básica usamos la fórmula:


Seleccione una:

- a. Veo-Oigo-Siento. ✓
- b. Ver-Oir-Saber.
- c. A-B-C.
- d. START.

Pregunta 20

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte subita, implica:

Seleccione una:

- a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓
- b. Posible donación en asistolia controlada.
- c. Una PCR refractaria que precisara E-RPC (ECMO).
- d. Posible donante, sólo si porta el carné que lo identifique como tal.

[Finalizar revisión](#)