

Navegación por el
cuestionario[Finalizar revisión](#)

Comenzado el lunes, 25 de marzo de 2019, 17:58
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 25 de marzo de 2019, 17:59
Tiempo empleado 1 minutos 9 segundos
Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario - Apto

Información
 Marcar
pregunta

A nuestro servicio de urgencias hospitalarias, llega en un vehículo particular una mujer de unos 50 años de edad, que es de inmediato por los celadores y personal de seguridad al cuarto de "parada" ya que dicen que NO respira, como primer enfermera asignada ese turno al cuarto de "parada" actuaremos:

Imagen 1: ECG/EKG

**Pregunta 1**

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Nuestra prioridad será:

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer el triaje.
- ☒ b. Valorar A-B-C-D. ✓
- ☐ c. Canalizar una vía venosa periférica de gran calibre.
- ☐ d. Avisar al médico adjunto responsable del cuarto de "parada".

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Al valorar la "A" descubrimos que la vía aérea no esta permeable, cual no es una acción a tomar

Seleccione una:

- ☒ a. Poner oxígeno a alto flujo ✓
- ☐ b. Abrir vía aérea con maniobra frente menton si sabemos que no ha sufrido traumatismo alguno
- ☐ c. Abrir vía aérea con elevación mandibular ante la duda de posible traumatismo
- ☐ d. Colocar una canula orofaríngea

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Una vez abierta la vía aérea y descartado el origen traumático de la situación, la paciente no respira, debemos entonces

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar 5 ventilaciones de rescate con la bolsa de reanimación
- ☐ b. Buscar el pulso carotídeo
- ☒ c. Iniciar RCP con compresiones torácicas - ventilaciones, relación 30:2 ✓
- ☐ d. Pedir un DESA/DEA

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Un residente mayor de familia y comunitaria, curtido en mis batallas, ventila a la paciente con balón de reanimación con aporte extra de oxígeno, mientras un celador realiza compresiones torácicas ¿Cuál es el siguiente paso a dar?

Seleccione una:

- ☒ a. Encender y colocar el monitor desfibrilador. ✓
- ☐ b. Coge la vía ya de una vez.
- ☐ c. Ir a buscar el cardiocompresor automático.
- ☐ d. Llamar al bus de UCI.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Con el médico adjunto coordinando al equipo, la segunda enfermera del cuarto de "parada" canalizando hasta 2 vías ver grueso calibre, el celador con las compresiones torácicas y el residente mayor con la vía aérea y la ventilación, ¿Cuál es siguiente punto de inflexión determinante para el resto de pasos a seguir?

Seleccione una:

- ☐ a. Obtener la muestra de sangre y cursar la analítica
- ☒ b. Determinar si estamos ante un ritmo desfibrilable o no ✓
- ☐ c. La intubación endotraqueal
- ☐ d. La lectura de capnometría

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

El monitor (bifásico) identifica claramente una Fibrilación Ventricular, llegados a este punto

Seleccione una:

- ☒ a. Suspender las maniobras de RCP y cualquier otra manipulación de la paciente y desfibrilar a 200 Julios ✓
- ☐ b. Desfibrilar a 360 julios sin detener las compresiones torácicas

- ☐ c. Defibrilar a 50 julios
- ☐ d. Administrar adrenalina IV

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Tras el primer choque de 200 julios, aparece ritmo cardiaco de 70 lpm, tensión de 60/30 mmHg y respiración espontánea con una SatO2 del 70%, que no nos plantearíamos

Seleccione una:

- ☐ a. Tomar medidas para mejorar la SatO2
- ☐ b. Actuar sobre la hipotensión
- ☒ c. Intubar de inmediato ✓
- ☐ d. Hacer un ECG/EKG de 12 derivaciones

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La oxigenación remonta con O2 adicional, la tensión se mantiene, pero la frecuencia cardíaca desciende a 40 lpm, en el ECG se ve esto (Imagen 1), el siguiente paso a seguir NO sería

Seleccione una:

- ☐ a. Prepararse para usar el marcapasos externo
- ☐ b. Preparar Atropina
- ☒ c. Administrar adrenalina IV en cualquier caso ✓
- ☐ d. Preparar sedoanalgesia, para IOT y uso marcapasos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La paciente despierta y al colocarle el marcapasos transcutáneo, su ritmo cardíaco se normaliza, oxigenación y tensión arterial también mejoran. Es hora de

Seleccione una:

- ☐ a. Llamar a cardiología
- ☐ b. Pedir ingreso en UVI
- ☒ c. Reevaluar el ABCDE y hacer la anamnesis de la paciente ✓
- ☐ d. Apagar el marcapasos

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

En el ECG/EKG de control aparecen signos de isquemia cardíaca, por grupos de fármacos, cuáles serían los indicados

Seleccione una:

- ☒ a. Anticoagulantes, antiagregantes, vasodilatadores, analgésicos, protectores gástricos, antieméticos y drogas vasoactivas (si precisa) ✓
- ☐ b. "Antiagregantes", "nitricos", antiinflamatorios, antieméticos y protectores gástricos
- ☐ c. Anticoagulantes, vasoconstrictores y fluidos
- ☐ d. Diuréticos, antiagregantes-coagulantes, vasodilatadores, sedantes y emetizantes.

[Finalizar revisión](#)