VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

	 Indique cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar la capacidad del individuo para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria:
\circ	a) Índice de Barthel.
\circ	b) Test de Tinetti.
0	c) Índice de Katz.
•	d) Índice de Lawton y Brody.
	2. La demencia vascular se caracteriza por lo siguiente, excepto:
•	a) Tiene un inicio lento e insidioso.
0	b) Es un síndrome anatomo-clínico resultante de lesiones arteriales cerebrales.
0	c) Entre sus posibles causas se encuentran la HTA, isquemia, aterosclerosis.
0	d) Presenta signos neurológicos focales.
	3. ¿Cuál de las siguientes escalas y test, es de específica aplicación en los pacientes con demencia tipo Alzheimer?:
\circ	a) Escala de Lawton y Brody.
•	b) Escalas GDS/FAST de Reisberg.
0	c) Escala de Norton.
\circ	d) Índice de Barthel.
	4. Respecto a los olvidos benignos o deterioro cognitivo leve, señale la respuesta incorrecta:
0	 a) Son alteraciones de la memoria, especialmente de la reciente para hechos cotidianos.
\circ	b) Pueden ser detectadas o no en los test psicométricos de memoria.
<!--</th--><th> c) No son susceptibles de mejoría con adecuado entrenamiento ni a través de ejercicios y estrategias. d) El 50% de los casos de leve deterioro cognitivo evoluciona a demencia trascurridos 5 años. </th>	 c) No son susceptibles de mejoría con adecuado entrenamiento ni a través de ejercicios y estrategias. d) El 50% de los casos de leve deterioro cognitivo evoluciona a demencia trascurridos 5 años.
	 La incapacidad para recordar el nombre de objetos conocidos y usuales, típica de las fases iniciales de la demencia, se denomina:
\circ	a) Apraxia.
\circ	b) Afasia.
•	c) Anomia.
\circ	d) Ecolalia.
	6. Entre los trastornos del comportamiento que presentan los enfermos de Alzheimer, se encuentra:
\circ	a) Perseveraciones verbales.
\circ	b) Negativismo.
0	c) Labilidad emocional.
	d) Todas son ciertas

_	
\circ	a) Escala de valoración OARS.
•	b) Escala de Zarit.
0	c) Escala de Pfeiffer.
0	d) Escala de Lawton.
	8. Para favorecer la comunicación, en una persona afectada de demencia, no debemos:
0	 a) Mantener la calma mientras se habla, procurando evitar otros estímulos que distraigan al paciente (ruidos ambientales, radio, etc.).
•	b) Utilizar un tono de voz enérgico y expresiones de enfado para evitar agresiones
0	c) Mantener el contacto visual tanto si se le habla como si se le escucha.
0	d) Llamarle por su nombre.
	9. Señale la afirmación incorrecta: el esquema de los cambios psíquicos asociados al proceso d envejecimiento incluye:
0	 a) El involucionismo que se suele asociar al anciano forma parte de la disminución de su capacidad de adaptación.
\circ	b) La modificación de las funciones cognitivas.
0	c) Las modificaciones afectivas asociadas a esta etapa de la vida.
•	d) La disminución de la inteligencia y la dificultad para resolver nuestros problemas
	 La escala empleada para la valoración inicial del estado mental de una persona afectada d demencia, se denomina:
0	a) Escala de Lawton y Brody.
•	b) MEC de Lobo.
0	c) Escala de Norton.
0	d) Índice de Barthel.
	11. La no identificación del recuerdo y, por tanto, la situación de creerlo todo nuevo se denomina:
•	a) Amnesia.
\circ	b) Hipermnesia.
\circ	c) Agnosia.
\circ	d) Paramnesia.
	12. En el "síndrome del cuidador o de burn out" que puede aparecer en el cuidador principal de un enfermo de Alzheimer, es falso que:
\circ	a) Aparece con más frecuencia en fases finales o intermedias.
\circ	b) Hay que animar al cuidador a participar en grupos de autoayuda.
•	c) No es necesaria nunca la intervención de un psicólogo o especialista.
0	d) Se previene organizando periodos de descanso para el cuidador.

7. ¿Qué instrumento utilizaremos para obtener datos respecto a la sobrecarga del cuidador?:

	13. Después de la demencia tipo Alzheimer, ¿cuál es el segundo tipo de demencia más
_	frecuente?:
\circ	a) Demencia por cuerpos de Lewy.
\circ	b) Córea de Hungtinton.
•	c) Demencia vascular.
\circ	d) Enfermedad de Pick.
	14. No es un problema de conducta en la persona afectada de demencia:
\circ	a) La agitación.
0	b) Las actuaciones sexuales inadecuadas.
•	c) El sedentarismo.
0	d) El rechazo a la alimentación.
	15. ¿Qué tipo de factores influyen en el proceso de envejecimiento?:
\circ	a) Factores intrínsecos.
0	b) Factores genéticos.
0	c) Factores extrínsecos.
•	d) Todas son ciertas.
	16. Respecto a la relación entre depresión y demencia, señale la respuesta incorrecta:
0	a) La demencia multiplica en 3-4 veces el riesgo de padecer depresión.
•	b) La depresión aparece en fases intermedias y tardías de la demencia.
0	c) La escala de Cornell se utiliza para valorar la depresión en dementes.
0	d) La frecuencia de depresión en los dementes es de 30-50%.
	17. El deterioro de la memoria en la enfermedad de Alzheimer está relacionado con:
0	a) Déficit/alteración en el sistema colinérgico (acetil-colina).
0	b) Aumento en la neurotransmisión de la serotonina.
•	c) Déficit/alteración en el sistema dopaminérgico (dopamina).
0	d) Hiperactividad del GABA.
	18. Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre el apoyo a la familia y al cuidador de un enfermo de Alzheimer, es falso que:
0	a) La información y formación deben ser progresivas y selectivas.
•	b) El apoyo psicológico y emocional es inefectivo y carece de importancia.
0	c) Es necesaria una planificación familiar y social de los cuidados.
0	d) Las Asociaciones de Familiares de Enfermos dan un gran apoyo y servicio.

	19. ¿Cuál es el factor de riesgo más conocido en la demencia?:
•	a) Edad.
0	b) Sexo.
\circ	c) Estado civil.
\circ	d) Nivel sociocultural.
	20. ¿Cuál de las siguientes funciones cognitivas sufre una disminución como consecuencia del envejecimiento fisiológico?:
•	a) La eficiencia intelectual.
0	b) La imaginación.
0	c) El juicio.
0	d) La creatividad.
	21. La demencia degenerativa primaria del sistema nervioso de causa desconocida y sin tratamiento curativo hasta la actualidad se denomina:
\circ	a) Enfermedad de Parkinson.
•	b) Enfermedad de Alzheimer.
\circ	c) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
\circ	d) Enfermedad de Pick.
	22. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica propia de la fase o estadio 2 de la enfermedad de Alzheimer?:
\circ	a) Desorientación en tiempo y espacio.
\circ	b) Dificultad en la deambulación (caídas).
•	c) Lenguaje con monosílabos, ecolalia.
0	d) Alteraciones del comportamiento: agresividad, desinhibición.
	23. Una de las manifestaciones psicóticas más frecuentes, en las personas afectadas de demencia, son las percepciones falsas a partir de la distorsión de un objeto real que se denominan:
•	a) Ilusiones.
\circ	b) Alucinaciones.
\circ	c) Delirios.
0	d) Confabulaciones.
	24. La apraxia se define como:
0	a) Incapacidad para recordar el nombre de objetos conocidos y usuales.
0	b) Alteración del cálculo práctico.
0	c) Incapacidad para el reconocimiento de personas.
•	d) Incapacidad para realizar movimientos finos de forma coordinada.

	25. Dentro de las fases evolutivas de la Enfermedad de Alzheimer, no es una característica del Estadio 1 o Fase 1:
•	a) Necesita ayuda en el entorno doméstico.
0	b) Fallos en memoria a corto plazo, rememoración conservada.
0	c) Lenguaje pobre (imposibilidad de nombrar objetos o de recordar nombres).
0	d) Desorientación en tiempo.
	26. De las siguientes actividades de enfermería, encaminadas a proporcionar una adecuada nutrición e hidratación a una persona afectada de demencia, no es correcta:
•	a) Administrarles la comida para evitar atragantamientos.
0	b) Tener cuidado con la ingestión de objetos extraños no comestibles que pueden causar accidentes serios.
0	c) Favorecer la hidratación y evacuación intestinal con una dieta variada, rica en frutas y verduras.
0	d) Proporcionar utensilios para comer que favorezcan la independencia.
	27. La alteración cognoscitiva caracterizada por un deterioro de las capacidades motoras se denomina:
\circ	a) Agnosia.
\circ	b) Afasia.
0	c) Anomia.
•	d) Apraxia.
	28. ¿Qué afirmación es cierta con respecto a las demencias?:
\circ	a) La enfermedad de Alzheimer tiene cura.
0	b) Un gran porcentaje no es degenerativo y es reversible.
0	c) Su prevalencia es independiente de la variable edad.
•	d) Es necesario un buen diagnóstico etiológico y diferencial.
	29. La manifestación clínica más frecuente en la Enfermedad de Alzheimer es:
\circ	a) La desorientación espaciotemporal.
\circ	b) La alteración del lenguaje.
•	c) La pérdida de memoria.
0	d) La descoordinación de movimientos.
	30. Para controlar los estados de agitación, en una persona afectada de demencia, no es correcto:
\circ	a) Evitar obligar al paciente a realizar actividades que no quiera.
•	b) Convencerle de que las alucinaciones que ve no son reales.
0	c) No entrar en discusión con el paciente, a pesar de las ofensas o provocaciones.
0	d) Hablarle de forma sosegada procurando distraer su atención.