

**Puntos** 20,00/20,00**Calificación** 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)**Comentario** - Apto**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Por muchos coloides y cristaloides que perfundamos a un paciente en shock, tenemos que tener claro que a diferencia de los hemoderivados, la citada sueroterapia no aporta:

Seleccione una:

- ☐ a. Volumen.
- ☐ b. Aumento de tensión arterial.
- ☒ c. Capacidad de transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. ✓
- ☐ d. Lavado gástrico.

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

NO es un tipo de SHOCK:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipovolémico.
- ☐ b. Cardiogénico.
- ☐ c. Séptico.
- ☒ d. Anaerobio. ✓

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

En el shock hipovolémico la dobutamina se administrará en una dosis de:

Seleccione una:

- ☒ a. Si TAS mayor que 90 mm Hg. 250 mg + 230 ml SG5% a 21 ml/h. ✓
- ☐ b. Si TAS menor que 100 mm Hg. 250 mg + 235 ml SG/dx5% a 21 ml/h.
- ☐ c. 250 ml + 230 ml SG/dx 5% a 40 ml/h.
- ☐ d. Si TAS = 90 mm Hg. 150 mg + 250 ml SSF 0.9% a 50 ml/h.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un patrón Electrocardiográfico.
- ☒ b. Respiratorio. ✓
- ☐ c. Diabético.
- ☐ d. Urinario.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Es un coloide natural:

Seleccione una:

- ☐ a. Gelafundina.
- ☐ b. Hemoce.
- ☐ c. Voluven.
- ☒ d. Albumina. ✓

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- ☐ a. Descenso del Ph.
- ☒ b. Aumento del Ph. ✓
- ☐ c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- ☐ d. Descenso del la PIC.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

¿Qué es una Epistaxis?

Seleccione una:

- ☐ a. El momento de extasis tras el uso del EPI (Equipo de Protección Individual) completo.
- ☐ b. Un sangrado interno no exteriorizado.
- ☒ c. Una hemorragia nasal. ✓
- ☐ d. La inflamación de la "epifixis".

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Que podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☐ a. El Ph.
- ☐ b. K+.
- ☐ c. Edema cerebral.
- ☒ d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Se considera crisis hipertensiva:

Seleccione una:

- ☒ a. TAS mayor o igual que 210 mm Hg y/o TAD mayor o igual que 120 mmHg. ✓
- ☐ b. TAS mayor que 200 mmHg y TAD mayor que 130 mmHg.
- ☐ c. Toda TA que no sea 120/80 mmHg.
- ☐ d. TAD mayor que 110 mmHg y TAS mayor que 200 mmHg.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tirotoóxica:

Seleccione una:

- ☐ a. Penicilinas.
- ☐ b. Gluten.
- ☒ c. Yodo. ✓
- ☐ d. Polen.

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Medida a tomar de forma prioritaria ante un paciente inconsciente (en coma):

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer glucemia capilar.
- ☐ b. Administrar Naloxona.
- ☒ c. Valorar ABCD. ✓
- ☐ d. Aplicar escala de coma de glasgow.

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Cual es un signo de complicación en un cólico reno ureteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Fiebre. ✓
- ☐ b. Vómitos.
- ☐ c. Dolor.
- ☐ d. Disuria.

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

La dosis inicial de insulina en bolo IV ante una cetoacidosis diabética será de:

Seleccione una:

- ☐ a. 15 U.I.
- ☒ b. 10 U.I. de insulina regular/rápida. ✓

- ☐ c. 10 U.I de insulina NPH.
- ☐ d. 12 U.I de insulina rápida/regular.

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Ante un Electro Cardiograma con elevación del ST en las derivaciones V1 y V2, sospecharemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Infarto inferior.
- ☐ b. Angina estable.
- ☐ c. Angina inestable.
- ☒ d. Infarto septal. ✓

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

No es un objetivo al colocar una Sonda Nasogástrica (SNG) en el contexto de una posible hemorragia digestiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuantificar pérdidas de volemia.
- ☐ b. Confirmar sangrado/diagnostico.
- ☒ c. Garantizar alimentación y toma de medicación. ✓
- ☐ d. Proteger vía aérea.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

De los siguientes, cual es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:

- ☐ a. Nauseas.
- ☐ b. Cefalea.
- ☐ c. Malestar general.
- ☒ d. Mareo con giro de objetos. ✓

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Cual de estas soluciones cristaloides isotonicas, es ligeramente hipotonica:

Seleccione una:

- ☐ a. Salino 0,9%.
- ☒ b. Glucosa 5%. ✓
- ☐ c. Ringer.
- ☐ d. Ringer Lactato.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

El omeprazol es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓
- ☐ b. Un inhibidor de la bomba de electrones.
- ☐ c. Un antiemético.
- ☐ d. Un emetizante.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

No es una solución cristaloides hipertónica:

Seleccione una:

- ☒ a. Ringer Lactato. ✓
- ☐ b. Bicarbonato 1M.
- ☐ c. Glucosa 20%.
- ☐ d. Salino al 7,5 %.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

En la escala de NIHSS, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:

- ☒ a. 1. ✓
- ☐ b. 0.
- ☐ c. 3.
- ☐ d. 2.