



Navegación por el  
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** martes, 13 de junio de 2017, 18:03  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** martes, 13 de junio de 2017, 18:03  
**Tiempo empleado** 16 segundos  
**Puntos** 5,00/5,00  
**Calificación** **10,00** de un máximo de 10,00 (**100%**)  
**Comentario** - Apto

#### Información

Marcar  
pregunta

Niño de 8 meses de que presenta cuadro de crisis convulsivas de varios minutos de duración tras fiebre de 24 hora: evolución. Los padres refieren que es la primera vez que les pasa y que el episodio ha ocurrido tras la toma de la ma tiene antecedentes familiares. Los padres se muestran muy preocupados ante la situación.

#### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Las crisis febriles son habituales en niños con edad comprendidas entre:

Seleccione una:

- ☐ a. 2 y 3 años
- ☐ b. Desde el nacimiento hasta los 5 meses.
- ☒ c. Desde los 6 meses hasta los 5 años ✓
- ☐ d. Solo se da en niños varones de 2-5 años.

#### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Señala la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Las crisis febriles son tratadas sólo con Paracetamol IV
- ☒ b. Suelen remitir sin necesidad de tratamiento. ✓
- ☐ c. Siempre se debe administrar la dosis de Midazolam indicada independientemente del tiempo de la duración de crisis.
- ☐ d. Todas son correctas.

#### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

En este caso y tras haber administrado Diazepam rectal, ¿Qué dosis de Midazolam se debe administrar?

Seleccione una:

- ☐ a. 0.2-0.5 mg/kg vía intranasal
- ☐ b. 0.2-0.5 mg/kg vía oral
- ☐ c. 0.1-0.3 mg/kg vía IV
- ☒ d. A y C son ciertas ✓

#### Pregunta 4

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

En cuanto a la profilaxis es cierto que :

Seleccione una:

- ☐ a. Puede hacerse de forma intermitente con la administración de diazepam oral (5-10 mg/12h hasta cuatro dosis) Rectal (0.3 mg/kg/día cada 12 horas hasta cuatro dosis).
- ☐ b. Puede hacerse de forma intermitente con la administración de diazepam IV(5-10 mg/12h hasta cuatro dosis) o mg/kg/día cada 12 horas hasta cuatro dosis).
- ☐ c. Administración continuada de un FAE.
- ☒ d. A y C son ciertas. ✓

#### Pregunta 5

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

En cuanto al riesgo de recurrencia es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. es alto para las crisis simples
- ☐ b. siempre se debe administrar tratamiento preventivo
- ☐ c. En casos de importante ansiedad familiar no es eficaz
- ☒ d. Todas son falsas ✓

[Finalizar revisión](#)