

TEST FINAL CURSO MEDICARAMA RADIOLOGÍA BÁSICA PARA ENFERMEROS

100% ACIERTOS

-Al evaluar una radiografía de columna cervical, son importantes una serie de líneas. ¿Como la llama la línea que pasa por el margen posterior del canal medular?

C - Línea espinolaminar

-Todos estos signos sugieren neumoperitoneo, excepto:

B Signo de la escalera

-¿Con cuál de estos huesos no se articula el escafoides de la mano?

D Piramidal

-Como se llama la fractura que ocurre sobre un hueso en el lugar de una metástasis ósea?

D Fractura patológica

-La RX simple de abdomen está indicada en todos estas situaciones, excepto en:

D Valoración de líquido libre abdominal

-¿Cuál de las siguientes fracturas de cadera no afecta al cuello femoral?

D - Trocantéreas

-Cuando en un paciente no se puede realizar una placa en bipedestación, todas estas son proyecciones son alternativas excepto una:

B Radiografía simple de abdomen en AP

-Respecto a la RX de abdomen en bipedestación;

B Se debe de realizar cuando hay dudas de si hay obstrucción por un silencio aéreo en la radiografía AP

-En la obstrucción de intestino delgado

C La causa más frecuente son las bridas intestinales tras la cirugía

-¿Cuál es el hueso que más frecuentemente se fractura en el pie?

B Calcáneo

-Para valorar afectación de partes blandas en una radiografía lateral cervical tras un traumatismo, que distancia le parece patológica para valorar espacio retrotraqueal (entre C5 y C7)?

A - Más de 22 milímetros o el equivalente a un cuerpo vertebral

-¿Cual de estas situaciones se asocia más frecuentemente a traumatismos de alta energía?

A Fracturas de pelvis

-Ante un traumatismo cervical con sospecha de fractura de apófisis odontoides. ¿Qué proyección complementaria sería más adecuada?

C Transbucal

-La clasificación de Neer es ampliamente utilizada para la valoración de fracturas de :

D Extremidad proximal de húmero

-En el íleo paralítico postoperatorio o adinámico o Paralítico se caracteriza:

D Todas son correctas

-En el gas localizado portal, todo es verdadero excepto:

C Se observan imágenes lineales en la región central

-En las hernias incarceradas

D Las válvulas conniventes se delimitan perfectamente

-El aire en el sistema biliar (aerobilia) se caracteriza

D b y c son ciertas

-Respecto al tumor de Pancoast no es cierto:

A La mayoría son adenocarcinomas

-¿Qué articulación es la más frecuentemente implicada en luxaciones?

B Hombro

-De las siguientes entidades cual no presenta brocograma aéreo:

B Adenocarcinoma de pulmón

-Es cierto respecto al signo cervico-torácico:

C Si la lesión es anterior se visualiza de forma parcial hasta las clavículas en RX de tórax

-Son hallazgos propios de la neumonías víricas:

D Todas son ciertas

-Las infecciones pulmonares por micobacterias atípicas :

D Todas son ciertas

-¿Qué cuadro de los siguientes puede cursar con megaesófago en una placa de tórax?:

C Enfermedad de Chagas

-El signo del nenúfar y de la semiluna es típico de uno de los siguientes cuadros:

B Equinocosis

-En las neumonitis por hipersensibilidad es falso:

A Siempre evoluciona a fibrosis pulmonar

-La neumopatía intersticial usual cuando evoluciona a fibrosis pulmonar empieza normalmente por:

B Lóbulos inferiores

-La radiografía simple de tórax es respecto al total de las exploraciones radiológicas supone aproximadamente:

D 40% del total

-Dentro de los signos de líquido libre intrabdominal, están todos menos uno:

C Signo de diafragma continuo