

CUIDADOS ESTANDARIZADOS AL PACIENTE PALIATIVO PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA (P19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > P19 > Evaluación del supuesto > Casos clínicos

Comenzado el	domingo, 25 de agosto de 2019, 11:39
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 25 de agosto de 2019, 11:44
Tiempo empleado	5 minutos 39 segundos
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	iii APTO iii

Pregunta 1

Correcta

Puntuaje 1,00 sobre 1,00

Juan es un paciente de 74 años que acude a urgencias por disnea intensa que se ha acentuado en las últimas horas. Viene acompañado de su hija que está visiblemente nerviosa al observar la dificultad respiratoria de su padre así como la cianosis de labios, lóbulos de orejas y zonas distales de miembros superiores. La tranquilizamos y atendemos de forma personalizada con escucha activa y apoyo psicoemocional. Refiere como antecedentes un cáncer gástrico con metástasis a nivel pulmonar y tracto respiratorio alto en estadio IV (T4) tratado con quimioterapia y radioterapia en los últimos 3 meses. Presenta palidez de piel, deterioro severo de la mucosa oral consecuencia de la quimioterapia, sudoración profusa, piel fría y nerviosismo notable. El aspecto de Juan es caquéxico por alimentación deficitaria entre otros factores, a pesar de portar una sonda de gastrostomía que se utiliza para el aporte de líquidos y alimento que a veces no tolera. Además está en tratamiento con antiparkinsonianos por estar diagnosticado de Parkinson desde hace 7 años. El dolor derivado del tumor está siendo tratado con morfina subcutánea y parches de fentanilo, lo que le ha llevado a padecer un estreñimiento crónico tratado con lactulosa tres veces al día. En la inspección ocular de la zona glútea observamos un enrojecimiento en zona sacra consecuencia de la presión al permanecer encamado muchas horas por la limitación de la movilidad desencadenada por la enfermedad de Parkinson por lo que administramos ácidos grasos hiperoxigenados en la zona. En la auscultación se determina una hipoventilación en ambos pulmones así como en la radiografía torácica se observa condensación pulmonar bilateral. En la determinación de las constantes encontramos:

TA: 96/51 mm/Hg. SatO₂ 85%. Pulso: 115lpm. T^a: Fiebre de 38.5°C.

Gasometría: PO₂: 47mm/Hg. PCO₂: 82mm/Hg.

Se coloca sonda vesical Foley nº 16 para control de diuresis.

Administramos oxigenoterapia en reservorio 50%.

Se le canaliza una vía y administra sueroterapia a 84 ml/h, actocortina 100 mg y aerosoles de atrovent y budesonida.

Una vez estabilizado el paciente se procede a su higiene dado el estado de sudoración y pérdida de heces que sufrió al padecer la crisis disnéica.

101.- El personal de enfermería (enfermero y auxiliar) ha de valorar el nivel del dolor que padece Juan apoyándose en la escala:

Seleccione una:

- a. EVA (Escala análoga visual). ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Escala Montgomery.
- c. Escala de Kitz.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

102.- Será competencia del auxiliar de enfermería:

Seleccione una:

- a. Administrar aerosoles según la pauta establecida.
- b. Controlar la diuresis y favorecer el confort del paciente.
- c. Las dos anteriores son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

103.- En cuál de las siguientes actividades que se le han de realizar al paciente respecto a la higiene, teniendo en cuenta que ha sido tratado con quimioterapia participa el auxiliar de enfermería:

Seleccione una:

- a. Prevenir el agrietamiento de la piel usando hidratantes y aceites.
- b. Evitar traumatismos sobre la piel.
- c. Participará en ambas actividades. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

104.- Las necesidades que según el modelo de Virginia Henderson no se encuentran alteradas, desde el punto de vista orgánico son:

Seleccione una:

- a. Eliminación.
- b. Valores y creencias. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Respiración y oxigenación.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

105.- Serán funciones del auxiliar de enfermería en la atención de los cuidados de la mucosa oral las siguientes:

Seleccione una:

- a. Desfavorecer la hidratación de los labios.
- b. Cepillado traumático en el desayuno sólo.
- c. Ninguna es función del personal de enfermería. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

106.- El fármaco que el auxiliar de enfermería administrará por vía oral para evitar el estreñimiento se llama:

Seleccione una:

- a. Lactulosa. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Metilprednisona.
- c. Ninguna es cierta.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

107.- El auxiliar de enfermería podrá observar si existe la presencia de complicaciones frecuentes derivadas del cáncer gástrico que padece el paciente entre las que pueden estar:

Seleccione una:

- a. Hemorragia y malnutrición. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Obesidad.
- c. Elevación de troponinas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

108.- El auxiliar de enfermería tendrá en cuenta, cuando administre la alimentación a través de la sonda de gastrostomía, ciertos factores como:

Seleccione una:

- a. Que el recipiente de la alimentación no supere los 45 cm de altura.
- b. Administrar la alimentación a razón de 300-500ml en 10-15 minutos.
- c. Ambas opciones son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

109.- El auxiliar de enfermería junto con enfermería procurará aplicar ciertas medidas sobre el paciente relacionadas con su comodidad excepto una de las siguientes; señale cuál es la excepción:

Seleccione una:

- a. Administrar la alimentación y medicación pautadas.
- b. Procurar que el cabecero no esté elevado. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Ayudarle para prepararle en la realización de las pruebas pertinentes.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

110.- La morfina que se aplica al paciente para controlar el dolor se encuentra en qué nivel o escalón de la escala de analgesia:

Seleccione una:

- a. 1er escalón.
- b. 2º escalón.
- c. 3er escalón. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

111.- Tanto auxiliar de enfermería como enfermero han de tener en cuenta en los cuidados destinados a controlar el dolor los siguientes aspectos:

Seleccione una:

- a. Evaluar el dolor de forma cuidadosa.
- b. Establecer una relación de confianza que nos ayude a que el enfermo manifieste sus inquietudes y preocupaciones relacionadas con el dolor.
- c. A y b son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

112.- Los cuidados de enfermería sobre el paciente irán encaminados a:

Seleccione una:

- a. Proporcionar el máximo bienestar posible. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Obligar a que actúe siempre de manera autónoma.
- c. Todas son ciertas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

113.- Los factores que han de estar presentes por parte de enfermería en cuanto al trato proporcionado a la hija del paciente han de ser:

Seleccione una:

- a. Saber escuchar.
- b. Apoyo moral.
- c. A y b son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

114.- La gastrostomía que tiene el paciente ha de ser cuidada meticulosamente. Entre los cuidados que el auxiliar de enfermería debe proporcionar están:

Seleccione una:

- a. Valorar la presencia de eritema o alteraciones de la piel que nos podría informar de la presencia de alergia a algún material presente.
- b. Favorecer la permeabilidad de la sonda de gastrostomía evitando su obstrucción mediante lavados.
- c. Todas son actuaciones adecuadas en los cuidados de la gastrostomía. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

115.- Dada la dificultad de la movilidad de Juan, señale las actividades que están indicadas por parte del auxiliar de enfermería:

Seleccione una:

- a. Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados preventivos de las úlceras por presión. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. No favorecer la higiene de piel y mucosas ni evitar zonas de presión.
- c. Obviar la presencia de arrugas en la cama.