

Postgrados  
UniversitariosFormación  
acreditadaEvaluación de las  
Competencias

Oposiciones

Formación EIR

Proyectos 2019

Aula Virtual

CISC

**CampusVirtual**  
FudenFormación

David Gomez Ramos | Per

Navegación por el  
cuestionario

Finalizar revisión

**Comenzado el** lunes, 8 de abril de 2019, 04:39  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** lunes, 8 de abril de 2019, 05:01  
**Tiempo empleado** 21 minutos 43 segundos  
**Puntos** 19,00/20,00  
**Calificación** 9,50 de un máximo de 10,00 (95%)  
**Comentario -** Apto

**Pregunta 1**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Hematoma subdural.  
☐ b. Hematoma epidural.  
☐ c. Hemorragia subaracnoidea.  
☒ d. Todas son correctas. ✓

**Pregunta 2**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

¿Cuál de los siguientes NO es una causa frecuente de accidentes en la infancia?

Seleccione una:

- ☐ a. Quemaduras.  
☐ b. Caídas.  
☒ c. Accidentes en el trabajo. ✓  
☐ d. Ahogamiento.

**Pregunta 3**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Ante un niño que ha ingerido una dosis tóxica de Paracetamol hace más de 8 horas, ¿qué actuación debemos realizar inicialmente?

Seleccione una:

- ☐ a. Se iniciará tratamiento antibiótico inmediatamente.  
☒ b. Se iniciará la administración de N-acetilcisteína y se realizarán niveles de Paracetamol en sangre y analítica. ✓  
☐ c. Se iniciará la administración de Naloxona y se realizarán niveles de Paracetamol en sangre y analítica.  
☐ d. Todas son falsas.

**Pregunta 4**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

¿Cuál de las siguientes NO es una solución cristalinoide?

Seleccione una:

- ☐ a. Suero Salino Fisiológico.  
☐ b. Suero Glucosado 5%.  
☒ c. Albúmina. ✓  
☐ d. Suero Glucosalino 1/3.

**Pregunta 5**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

¿Cuál de las siguientes sería una dosis tóxica de paracetamol en niños?

Seleccione una:

- ☐ a. 10 ml.  
☐ b. 100 mg.  
☒ c. 140mg/kg. ✓  
☐ d. 80mg/kg.

**Pregunta 6**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

En un TCE el daño cerebral secundario y terciario, puede producirse:

Seleccione una:

- ☒ a. Como consecuencia de alteraciones intracerebrales, como la presencia de crisis convulsivas precoces, o edema intracerebral. ✓  
☐ b. Por complicaciones sistémicas como aumento de la oxigenación, o descenso de la temperatura, entre otros.  
☐ c. a y b son incorrectas.  
☐ d. Todas son correctas.

El daño cerebral secundario y terciario, puede producirse: Como consecuencia del efecto de lesiones externas al parénquima cerebral, como las hemorragias subdurales y epidurales que provocan un aumento de la presión intracraneal. Como consecuencia de alteraciones intracerebrales como la presencia de crisis epilépticas precoces, o edema intracerebral. O por complicaciones sistémicas que pueden ocurrir en el TCE, como el descenso de la tensión arterial (hipotensión arterial), el descenso de la oxigenación (hipoxemia), o el aumento de la temperatura (hipertermia) entre otros.

**Pregunta 7**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Son signos de obstrucción de la vía aérea superior: Señale la respuesta CORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Taquipnea.  
☐ b. Escasa elevación torácica.

- ☐ c. Cianosis, babeo, tos o disociación toracoabdominal.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

¿Qué medidas debemos tener en cuenta ante un paciente quemado?

Seleccione una:

- ☐ a. Sondaje vesical para control de diuresis.
- ☐ b. Soporte psicológico del niño y de sus padres.
- ☐ c. Vigilar la privación del sueño y el prurito, ya que son secuelas frecuentes.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

Son signos sugestivos de fractura de la base del cráneo, la presencia de: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- ☐ a. Equimosis periorbitaria.
- ☐ b. Equimosis retroauricular.
- ☒ c. Hematemesis. ✓
- ☐ d. Hemotímpano o sangre en CAE.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

¿Qué antídoto administraremos ante una intoxicación por Benzodiazepinas?

Seleccione una:

- ☒ a. Flumazenilo. ✓
- ☐ b. Naloxona.
- ☐ c. N-acetilcisteína.
- ☐ d. Carbón activado.

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

Acude a su servicio de urgencias un niño de 2 años que presenta una escaldadura en tórax tras echarse encima accidentalmente un plato de sopa. Presenta eritema en la zona y por el llanto continuo sospechamos dolor intenso. ¿Cómo clasificaríamos la lesión?

Seleccione una:

- ☒ a. Quemadura de primer grado. ✓
- ☐ b. Quemadura de segundo grado tipo A.
- ☐ c. Quemadura de segundo grado tipo B.
- ☐ d. Quemadura de tercer grado.

Clasificación de las quemaduras según profundidad.

Grado	Aspecto	Afectación	Dolor	Curación
Primero	Eritema	Epidermis	Intenso	Espontánea, no secuelas.

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00


⚑ Marcar  
pregunta

Según la extensión de las quemaduras debemos valorar la superficie corporal quemada (SCQ) de un niño de 5 años que presenta quemaduras en ambos brazos:

Seleccione una:

- ☐ a. SCQ 12%
- ☐ b. SCQ 36%
- ☒ c. SCQ 18% ✓
- ☐ d. SCQ 20a%

Valoración de la extensión de las quemaduras según edad.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

¿Qué factores determinan la gravedad de un paciente electrocutado?

Seleccione una:

- ☐ a. La magnitud de la energía recibida.
- ☐ b. El voltaje.
- ☐ c. El tiempo de contacto con la fuente de energía.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Ante un paciente hipotenso/hipovolémico, ¿Qué solución debemos administrar?

Seleccione una:

- ☒ a. SSF a 20cc/Kg en bolo rápido. ✓
- ☐ b. SG5% a 20cc/Kg en bolo rápido.
- ☐ c. SSF 500cc en bolo lento.
- ☐ d. SSF 500cc en bolo rápido.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Señale la definición de ANALGESIA:

Seleccione una:

- ☒ a. Aliviar el dolor sin inducir alteraciones del estado mental. ✓
- ☐ b. Inducir al paciente un estado que le permita tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales.
- ☐ c. Disminución del temor en relación a una situación dada, sin alterar el estado mental.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La opción B es la definición de SEDACIÓN y la C es la definición de ANSIOLISIS.

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Qué tipo de analgésico sistémico emplearemos ante un paciente con dolor intenso?

Seleccione una:

- ☐ a. Metamizol.
- ☒ b. Opioides. ✓
- ☐ c. Ibuprofeno.
- ☐ d. Midazolam.

**Pregunta 17**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Ante la sospecha de una lesión cervical tras un TCE, ¿qué medidas debemos tomar?

Seleccione una:

- ☐ a. Pediremos al paciente que movilice el cuello para comprobar si le duele.
- ☒ b. Inmovilizar con collarín cervical rígido e inmovilizador de cabeza. ✓
- ☐ c. Es suficiente la colocación de collarín cervical, ya que se inmoviliza y se alinea cabeza-cuello-tronco.
- ☐ d. No tomaremos ninguna medida hasta resolver los problemas a consecuencia de TCE, ya que el TCE es prioritario.

Ante la sospecha de una lesión cervical en todo momento debe mantenerse la alineación cabeza-cuello-tronco, evitando los movimientos de flexoextensión (con collarín cervical rígido) y/o rotación (inmovilizador de cabeza – "dama de elche"). La columna cervical se inmovilizará en caso de traumatismo debido a mecanismo violento, caídas desde una altura mayor de 1 metro, accidentes de tráfico, etc. hasta demostrar su indemnidad.

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

En un box de su servicio de urgencias se encuentra un niño de 10 años al que se le va a realizar una reducción de una fr. de cúbito y radio. ¿Qué fármaco prepararemos para realizar la sedoanalgesia?

Seleccione una:

- ☐ a. Clóruro Mórfico.
- ☐ b. Naloxona.
- ☐ c. Dlacepam.
- ☒ d. Ketamina. ✓

**Pregunta 19**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Dónde colocaremos las cinchas con forma de "v" del arnés araña?

Seleccione una:

- ☒ a. Sobre la cabeza del paciente. ✗
- ☐ b. Sobre el pecho, debajo del pecho si es mujer.
- ☐ c. En la cintura pélvica.
- ☐ d. Sobre los hombros.

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

¿Qué es la Salmonelosis?

Seleccione una:

- ☒ a. Un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Sallmonela. ✓
- ☐ b. Un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Costridium.
- ☐ c. Ninguna es correcta.
- ☐ d. Todas son correctas.

[Finalizar revisión](#)