



Navegación por el
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

Comenzado el martes, 11 de julio de 2017, 12:01
Estado Finalizado
Finalizado en martes, 11 de julio de 2017, 12:42
Tiempo empleado 40 minutos 31 segundos
Puntos 25,00/30,00
Calificación 8,33 de un máximo de 10,00 (83%)

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La mascarilla laríngea pertenece a los dispositivos de acceso a la vía aérea:

Seleccione una:

- ☒ a. Supraglóticos ✓
- ☐ b. Infraglóticos
- ☐ c. Transtraqueales
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Supraglóticos

Pregunta 2

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Con respecto a los dispositivos de administración de oxigenoterapia señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La mascarilla reservorio proporciona altas concentraciones de oxígeno
- ☐ b. A flujos mayores de 5- 6l/min las gafas nasales pueden provocar cefaleas, sequedad de mucosas y deglución de aire
- ☐ c. La concentración de oxígeno que proporcionan los sistemas de alto flujo varía en función del patrón respiratorio de paciente
- ☒ d. El mecanismo venturi se basa en el principio de Bernoulli ✗

La respuesta correcta es: La concentración de oxígeno que proporcionan los sistemas de alto flujo varía en función del patrón respiratorio del paciente

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La hipoxia tisular sin hipoxemia ocurre en situaciones de:

Seleccione una:

- ☐ a. EPOC
- ☐ b. Asma
- ☐ c. TEP
- ☒ d. Anemia ✓

La respuesta correcta es: Anemia

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El volumen tidal:

Seleccione una:

- ☐ a. Se obtiene multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente
- ☐ b. Es el cociente entre la duración de la fase inspiratoria y espiratoria de un paciente
- ☒ c. Es la cantidad de aire que el ventilador insufla en cada inspiración al paciente ✓
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Es la cantidad de aire que el ventilador insufla en cada inspiración al paciente

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La cánula de Guedel:

Seleccione una:

- ☐ a. Aíslan y protegen la vía aérea contra la broncoaspiración
- ☐ b. Se colocarán en el paciente con reflejo glossofaríngeo activo
- ☒ c. Debe retirarse inmediatamente si se observan signos de rechazo ✓
- ☐ d. Para lactantes y adultos se utiliza la misma técnica de colocación

La respuesta correcta es: Debe retirarse inmediatamente si se observan signos de rechazo

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La cianosis central, señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce en situaciones de bajo gasto cardiaco
- ☐ b. Se observa coloración azulada en el lecho ungual o cartílago de la oreja
- ☒ c. Es visible tanto en las extremidades como en zonas como la lengua ✓
- ☐ d. Se produce por un exceso de hemoglobina oxigenada en sangre

La respuesta correcta es: Es visible tanto en las extremidades como en zonas como la lengua

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Con respecto a la PEEP, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Se consideran niveles tolerables de PEEP los que no sobrepasen los 15cm H₂O
- ☐ b. La PEEP aumenta la presión intratorácica por lo que debe ser utilizada con precaución
- ☐ c. Puede ser utilizada en todos los modos ventilatorios
- ☒ d. Mantiene una presión positiva al final de la inspiración ✓

La respuesta correcta es: Mantiene una presión positiva al final de la inspiración

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

La aplicación de un plan de cuidados estandarizado nos va a servir para:

Seleccione una:

- ☐ a. Mejorar la calidad de los cuidados que prestamos a nuestros pacientes
- ☐ b. Establecer un lenguaje enfermero común
- ☐ c. Favorecer la continuidad de cuidados
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La intubación orotraqueal es la técnica fundamental para el manejo y aislamiento definitivo de la vía aérea
- ☐ b. La cricotiroidotomía es una técnica utilizada para el acceso de la vía aérea en situaciones de emergencia
- ☒ c. Los dispositivos supraglóticos sellan la vía aérea protegiendo contra la broncoaspiración ✓
- ☐ d. En la colocación de la ML-Fastrach, la cabeza del paciente puede estar en cualquier posición

La respuesta correcta es: Los dispositivos supraglóticos sellan la vía aérea protegiendo contra la broncoaspiración

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

La maniobra de elección para facilitar la visualización de la glotis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Sellick
- ☒ b. BURP ✓
- ☐ c. Epley
- ☐ d. Valsalva

La respuesta correcta es: BURP

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Dentro de las intervenciones NIC más frecuentes que el enfermero realiza en la atención del paciente sometido a oxigenoterapia encontramos:

Seleccione una:

- ☒ a. Manejo de las vías aéreas ✓
- ☐ b. Lavados bronquiales con suero fisiológico
- ☐ c. Comprobación de la correcta ubicación del tubo orotraqueal mediante auscultación
- ☐ d. Tratamiento de la hipoventilación mediante fisioterapia respiratoria

La respuesta correcta es: Manejo de las vías aéreas

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

El espacio cricotiroido se encuentra:

Seleccione una:

- ☒ a. Entre la prominencia laríngea del cartílago tiroides y el cartílago cricoides ✓
- ☐ b. Desde la orofaringe hasta la epiglotis
- ☐ c. Desde el borde superior del cartílago cricoides hasta la porción anterolateral del tiroides
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Entre la prominencia laríngea del cartílago tiroides y el cartílago cricoides

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Los modos ventilatorios más utilizados en ventilación mecánica no invasiva son:

Seleccione una:

- ☐ a. CPAP
- ☐ b. IPPV
- ☐ c. BIPAP
- ☒ d. A y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**Dentro de los criterios de resultados (NOC), los más frecuentes que podemos encontrar en el paciente sometido a oxigenoterapia y ventilación mecánica son:**

Seleccione una:

- ☐ a. Ayuda a la ventilación
- ☐ b. Monitorización respiratoria
- ☒ c. Estado respiratorio: intercambio gaseoso ✓
- ☐ d. Manejo de las vías aéreas

La respuesta correcta es: Estado respiratorio: intercambio gaseoso

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**Con respecto al manejo avanzado de la vía aérea, señala la respuesta incorrecta:**

Seleccione una:

- ☒ a. Antes de proceder a la IOT se debe preoxigenar al paciente durante 1-2 minutos ✗
- ☐ b. La realización de la técnica no debe durar más de 1 minuto
- ☐ c. Se deberá valorar la administración de sedoanalgesia y uso de relajantes musculares
- ☐ d. Es importante preparar y comprobar el correcto funcionamiento del material previo a la administración de relajantes musculares

La respuesta correcta es: La realización de la técnica no debe durar más de 1 minuto

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**Los resultados de la medición de la saturación de oxígeno a través de la pulsioximetría pueden ser erróneos en caso de:**

Seleccione una:

- ☐ a. Anemia
- ☐ b. Hipertermia
- ☐ c. Intoxicación por CO
- ☒ d. A y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**Los problemas de colaboración que podemos encontrar relacionados con la oxigenoterapia y la conexión a ventilación mecánica, son:**

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor
- ☐ b. Función ventilatoria ineficaz
- ☐ c. Atelectasias
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**La elección de la modalidad de ventilación mecánica depende de:**

Seleccione una:

- ☐ a. El nivel de conciencia del paciente
- ☐ b. La autonomía respiratoria del paciente
- ☐ c. El objetivo de la ventilación mecánica
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**Ante un trauma facial severo con secreciones espesas, sangre y contenido alimenticio en la boca del paciente, es recomendable utilizar:**

Seleccione una:

- ☐ a. Sonda Foley
- ☐ b. Sonda Kendall
- ☐ c. Sonda Levin
- ☒ d. Sonda Yankauer ✓

La respuesta correcta es: Sonda Yankauer

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta**Dentro de los sistemas de alto flujo encontramos:**

Seleccione una:

- ☐ a. Gafas nasales
- ☐ b. Mascarilla reservorio
- ☒ c. Mascarilla tipo venturi ✓
- ☐ d. Mascarilla simple

La respuesta correcta es: Mascarilla tipo venturi

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Dentro de las ventajas de los modos asistidos con respecto a los controlados encontramos:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitan la IOT y la conexión a ventilación mecánica
- ☐ b. Reducen la necesidad de sedación
- ☐ c. Previene la atrofia de los músculos respiratorios por desuso
- ☒ d. B y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: B y c son correctas

Pregunta 22

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e inflamable ✗
- ☐ b. Debe almacenarse en un lugar bien ventilado
- ☐ c. En caso de fuga de O₂ en estado líquido hay que lavar la zona afectada con agua durante al menos 15 minutos
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 23

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Indica cual de las siguientes, son causas de la hipoxia:

Seleccione una:

- ☐ a. Cianosis
- ☐ b. Hipercapnia
- ☒ c. Disminución del gasto cardiaco ✓
- ☐ d. Diaforesis

La respuesta correcta es: Disminución del gasto cardiaco

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Son indicaciones de intubación:

Seleccione una:

- ☐ a. Glasgow > 8
- ☐ b. Saturación de oxígeno > 90%
- ☐ c. PaO₂ > 50-60mmHg con oxigenoterapia al 50%
- ☒ d. Hipoxia prolongada o riesgo de ella con saturaciones < 85% a pesar de FiO₂ altas ✓

La respuesta correcta es: Hipoxia prolongada o riesgo de ella con saturaciones < 85% a pesar de FiO₂ altas**Pregunta 25**

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Una saturación de oxígeno de 94% corresponde a una PaO₂ de:

Seleccione una:

- ☐ a. 40-60 mmHg
- ☐ b. 80-100 mmHg
- ☒ c. 70-75 mmHg ✓
- ☐ d. 58-62 mmHg

La respuesta correcta es: 70-75 mmHg

Pregunta 26

Sin contestar
Puntúa como
1,00
Marcar
pregunta

Los respiradores más utilizados en el paciente adulto actualmente en emergencias son:

Seleccione una:

- ☐ a. Limitados por presión
- ☐ b. Limitados por volumen
- ☐ c. Ciclados por tiempo
- ☐ d. De flujo continuo

La respuesta correcta es: Limitados por volumen

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Según la clasificación de Mallampati, un grado III corresponde a:

Seleccione una:

- ☐ a. Visualización de cuerdas vocales, laringe, repliegue aritenopiglotico
- ☐ b. Visualización de paladar blando, úvula y fauces
- ☒ c. Visualización de paladar blando y base de la úvula ✓
- ☐ d. No se visualiza ninguna estructura

La respuesta correcta es: Visualización de paladar blando y base de la úvula

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

En caso de que se produzca una IOT selectiva en bronquio derecho:

Seleccione una:

Marcar pregunta

- ☐ a. Se deberá retirar el tubo orotraqueal y volver a intubar de nuevo
- ☐ b. Se deberá retirar el tubo orotraqueal y utilizar otro dispositivo de acceso a la vía aérea
- ☒ c. Se deberá retirar el tubo orotraqueal unos centímetros, deshinchando previamente el neumotaponamiento ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Se deberá retirar el tubo orotraqueal unos centímetros, deshinchando previamente el neumotaponamiento

Pregunta 29

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

De las siguientes afirmaciones, señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sonido mate a la percusión nos hará sospechar un posible neumotórax a tensión
- ☒ b. En la valoración del estado ventilatorio de un paciente es importante los datos extraídos de la entrevista ✗
- ☐ c. El timpanismo a la percusión nos hará sospechar la presencia de aire en cavidad torácica
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Un sonido mate a la percusión nos hará sospechar un posible neumotórax a tensión

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La fuerza de succión durante la aspiración, en adultos intubados, no deberá superar los:

Seleccione una:

- ☐ a. 500 mmHg
- ☐ b. 300 mmHg
- ☐ c. 80 mmHg
- ☒ d. 100 mmHg. ✓

La respuesta correcta es: 100 mmHg.

[Finalizar revisión](#)