

Navegación por el
cuestionario

1 1 2 3 4 5

Terminar intento...

Información

Marcar
pregunta

Recién nacido de 27 semanas de edad gestacional, parto producido por rotura prematura de membranas, madurado con dosis de corticoides intraútero. Al minuto de nacimiento presenta: cianosis generalizada, frecuencia cardíaca aproximada: latidos por minuto, respiración lenta e irregular, hipotonía generalizada y hace alguna mueca.

Pregunta 1

Sin responder
aún
Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál será la puntuación en el test de Apgar al minuto de vida en el caso anterior?

Seleccione una:

- ☐ a. 2
☐ b. 3
☐ c. 4
☐ d. 5

Pregunta 2

Sin responder
aún
Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- ☐ a. En "el minuto de oro", evaluaremos el estado del bebé por medio de tres preguntas clave.
☐ b. Colocar pulsioxímetro en miembro superior izquierdo: preductal.
☐ c. En neonatos que requieran reanimación no hay suficiente evidencia para recomendar retrasar el pinzamiento del c
☐ d. El ordeño o "milking" está contraindicado en menos de 28 semanas de gestación.

Pregunta 3

Sin responder
aún
Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe reevaluar al neonato cada 30 segundos.
☐ b. Se reevaluará mediante la valoración de la respiración y la frecuencia cardíaca.
☐ c. La aspiración de secreciones se realizará solamente si es estrictamente necesario.
☐ d. Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36 y 37°C.

Pregunta 4

Sin responder
aún
Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

Señala la respuesta correcta con respecto a los cuidados de la piel del gran prematuro:

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar cambios posturales frecuentes.
☐ b. Usar colchones de gel.
☐ c. Usar clorhexidina acuosa para la desinfección de la piel en vez de soluciones alcohólicas.
☐ d. Todas son correctas.

Pregunta 5

Sin responder
aún
Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto al manejo inicial del gran prematuro?

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe limitar la exposición a un exceso de oxígeno siguiendo los rangos recomendados de saturación de oxígeno 98%).
☐ b. Se aconseja el inicio de nutrición parenteral en las primeras 2 horas de vida, y de la nutrición enteral (leche mater siempre que se disponga de ella) en las primeras 48 horas.
☐ c. Se recomienda administrar surfactante en aquellos prematuros que presenten sintomatología en sala de partos.
☐ d. Siempre que se pueda se realizará el transporte postnatal, ya que esto ha demostrado reducir la morbilidad.

Siguiente