

Navegación por el  
cuestionario

1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20  
[Terminar intento...](#)

**Pregunta 1**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

Dentro de la valoración neurológica del recién nacido ¿cuál de los siguientes aspectos no está incluido dentro de la valoración del sistema motor?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración del tono muscular (o postura)  
☒ b. Valoración de la fuerza muscular  
☐ c. Valoración de la simetría del movimiento  
☐ d. Valoración de los reflejos

**Pregunta 2**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

Cuando examinamos la piel de un Rn en busca de signos relacionados con posibles alteraciones en el sistema nervioso. ¿Cuál NO debe llamarnos la atención?

Seleccione una:

- ☐ a. angiomas faciales  
☒ b. lunares faciales  
☐ c. zonas prominentes a lo largo de la columna  
☐ d. zonas hundidas con pelo a lo largo de la columna

**Pregunta 3**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

De los siguientes fármacos ¿cuál NO tiene una acción anticonvulsivante?

Seleccione una:

- ☒ a. Fentanilo  
☐ b. Fenobarbital  
☐ c. Fenitoína  
☐ d. Midazolam

**Pregunta 4**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

Seleccione la respuesta CORRECTA: para medir correctamente el perímetro cefálico, colocaremos la cinta métrica:

Seleccione una:

- ☒ a. desde la protuberancia frontal a la occipital, por encima de las cejas y debajo de la línea del pelo y pasando por encima de los pabellones auriculares.  
☐ b. Desde la protuberancia frontal a la base del cráneo pasando por encima de los pabellones auriculares.  
☐ c. Desde la fontanela anterior hasta la base del cráneo  
☐ d. Desde encima de la protuberancia frontal y por debajo de la protuberancia occipital, por encima de las cejas y la línea del pelo; y pasando por encima de los pabellones auriculares.

**Pregunta 5**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

El perímetro cefálico es:

Seleccione una:

- ☒ a. la circunferencia occipito-frontal máxima  
☐ b. La estimación de la masa cerebral  
☐ c. La circunferencia craneal máxima  
☐ d. La distancia existente entre el vertex craneal y el foramen occipital.

**Pregunta 6**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

¿Cuál es el tipo de convulsión más frecuentemente observado en los recién nacidos?

Seleccione una:

- ☐ a. Convulsiones mioclónicas  
☐ b. Convulsiones Clónicas  
☐ c. Convulsiones tónicas  
☒ d. Convulsiones sutiles

**Pregunta 7**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

Señale cuál de los siguientes escalas permite una valoración neurológica completa del RN

Seleccione una:

- ☐ a. Test de Silverman  
☒ b. Escala de Hammersmith  
☐ c. Escala de Finnegan  
☐ d. Test de Apgar

**Pregunta 8**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

⚑ Marcar  
pregunta

¿Sobre cuál de estos parámetros NO se basa la clasificación del comportamiento del RN?

Seleccione una:

- ☐ a. Vocalización  
☐ b. Apertura de ojos  
☒ c. Llanto  
☐ d. Motricidad gruesa

**Pregunta 9**

Respuesta  
guardada  
Puntúa como  
1,00

¿Qué NO es un evento centinela de sospecha de encefalopatía hipóxico isquémica?

Seleccione una:

- ☐ a. Prolapso de cordón  
☒ b. Líquido teñido de meconio

▼ Marcar pregunta

- ☐ c. Rotura de cordón
- ☐ d. Desprendimiento de placenta

**Pregunta 10**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

¿A partir de qué edad se considera patológico la persistencia del reflejo de moro?

Seleccione una:

- ☐ a. Al año de vida
- ☒ b. A los 6 meses de vida
- ☐ c. Al mes de vida
- ☐ d. A los 4 meses de vida

**Pregunta 11**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

La fusión prematura de las suturas craneales se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Hidrocefalia
- ☒ b. Craneosinostosis
- ☐ c. Onfalocele
- ☐ d. Craneotomía

**Pregunta 12**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes hemorragias puede conllevar un compromiso de la permeabilidad de la vía aérea?

Seleccione una:

- ☒ a. Hemorragia subgaleal
- ☐ b. Hemorragia intraventricular
- ☐ c. Hemorragia subaracnoidea
- ☐ d. Hemorragia subdural

**Pregunta 13**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Acerca de las fontanelas y suturas de la cabeza del recién nacido. ¿Qué respuesta es la FALSA?

Seleccione una:

- ☐ a. son articulaciones fibrosas
- ☒ b. Proporcionan rigidez y resistencia al cráneo del recién nacido
- ☐ c. La fontanela anterior se cierra aproximadamente a los 14 meses
- ☐ d. La suturas no deberían estar ni superpuestas ni muy separadas entre sí.

**Pregunta 14**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Señala la respuesta CORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las convulsiones son peligrosas y conllevan efectos nocivos en el cerebro
- ☐ b. Las convulsiones incrementan el gasto metabólico pero sin afectar los niveles de glucosa.
- ☒ c. Tras una crisis convulsiva se produce un aumento del láctico y alteraciones en el flujo cerebral
- ☐ d. Las convulsiones en el periodo neonatal son típicas y organizadas en su expresión clínica.

**Pregunta 15**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de estas acciones NO previene las hemorragias intracraneales en un RN extremadamente prematuro en las primeras 48h de vida?

Seleccione una:

- ☒ a. Preoxigenación al 100% antes de aspirar secreciones
- ☐ b. Colocar en posición antitrendelemburg
- ☐ c. Método madre canguro.
- ☐ d. Evitar decúbito prono con lateralización extrema de la cabeza hacia un lado.

**Pregunta 16**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Con cuántas horas de vida se ha visto que se obtiene la máxima eficacia terapéutica al aplicar un protocolo de hipotermia leve en un RN con encefalopatía moderada?

Seleccione una:

- ☐ a. primeras 12 horas de vida
- ☒ b. primeras 6 horas de vida
- ☐ c. primeras 4 horas de vida
- ☐ d. No hay límite de horas.

**Pregunta 17**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuántas fontanelas presenta el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. 2 fontanelas
- ☐ b. 4 fontanelas
- ☒ c. 6 fontanelas
- ☐ d. 3 fontanelas

**Pregunta 18**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes hemorragias intracraneales NO suele ser de aparición precoz en las primeras horas de vida tras el nacimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia subdural
- ☐ b. Hemorragia subaracnoidea
- ☒ c. Hemorragia intraventricular
- ☐ d. Hemorragia subgaleal

**Pregunta 19**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

En la exploración de los sentidos de un recién nacido debemos tener en cuenta la edad gestacional. ¿cuál es el último sentido en desarrollarse?

Seleccione una:

- ☒ a. Vista
- ☐ b. Audición
- ☐ c. Olfato
- ☐ d. Gusto

**Pregunta 20**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes situaciones NO es un factor de riesgo para una hemorragia intracraneal en el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Parto prematuro
- ☐ b. Distocia de hombros
- ☐ c. Malformación arteriovenosa
- ☒ d. Parto gemelar.

**Siguiente**