

Comenzado el	domingo, 24 de enero de 2021, 08:43
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 24 de enero de 2021, 09:12
Tiempo empleado	28 minutos 57 segundos
Puntos	20,00/30,00
Calificación	6,67 de 10,00 (67%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas afirmaciones es falsa en cuanto al tratamiento hormonal del cáncer de próstata?

- Seleccione una:
- ☐ a. La ginecomastia es frecuente en pacientes con bicalutamida prolongada.
  - ☐ b. La HT y la RT se pueden combinar.
  - ☒ c. No hay diferencias en cuanto a resultados clínicos con los diversos agonistas LHRH. ✖
  - ☐ d. El tratamiento hormonal continuo es superior en supervivencia al tratamiento intermitente.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué índices geriátricos se asocian con el riesgo de toxicidad por quimioterapia en neoplasia de ovario?

- Seleccione una:
- ☒ a. Dependencia funcional en IADL; comorbilidad y depresión. ✔
  - ☐ b. Comorbilidad.
  - ☐ c. Dependencia funcional.
  - ☐ d. Edad.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los enunciados siguientes NO es cierto?

- Seleccione una:
- ☐ a. La IGRT se basa, entre otras cosas, en el control del movimiento respiratorio.
  - ☒ b. La planificación de la RT se realiza siempre con técnicas de imagen 3D. ✖
  - ☐ c. La IMRT está en desuso.
  - ☐ d. La SBRT se utiliza en tratar tumores pulmonares.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La malnutrición en el ámbito de la oncogeriatría:

- Seleccione una:
- ☐ a. No se ha demostrado su asociación con deterioro funcional ni con mayor estancia hospitalaria.
  - ☐ b. En el concepto actualizado de malnutrición consensuado a nivel mundial no está incluida la pérdida de masa muscular. Así, el objetivo principal de la estrategia nutricional no es preservar la masa magra.
  - ☒ c. Es un factor de riesgo independiente de mortalidad. ✔
  - ☐ d. No tiene una prevalencia significativa, tal y como demuestran recientes estudios.

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como  
1,00

**¿Con cuál de los siguientes parámetros analíticos estaría indicado una reducción del 50% de dosis de antraciclinas?**

Seleccione una:

- ☐ a. GOT:200.
- ☐ b. Transaminasas 2 veces por encima al valor normal.
- ☐ c. Bilirrubina: 2,8
- ☐ d. Bilirrubina total 2 veces superior al valor normal.

Pregunta **6**

Sin contestar

Puntúa como  
1,00

**¿Existen estudios que avalen el empleo de combinaciones de platino en estadio IV en población anciana, sin mutaciones activadoras?**

Seleccione una:

- ☐ a. No, todos los estudios fase III específicos de ancianos utilizan monoterapia.
- ☐ b. Si, actualmente el tratamiento de elección en pacientes con buen PS so los dobletes de carboplatino. La monoterapia es una alternativa para pacientes no fit.
- ☐ c. No, los ancianos no se benefician del tratamiento con quimioterapia, no hay que tratarlos
- ☐ d. No, Existen datos claros de beneficio de unas monoterapias frente a otras, pero no de combinaciones de platinos

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Qué factores se han asociado con el riesgo de complicaciones quirúrgicas en población anciana con neoplasias ginecológicas?**

Seleccione una:

- ☐ a. El índice de Charlson.
- ☐ b. La edad.
- ☐ c. Ninguno.
- ☒ d. Riesgo quirúrgico medido por ASA, comorbilidad, en especial diabetes e hipertensión. ✓

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Señale la opción VERDADERA**

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los ancianos con patología oncológica deben ser valorados por un equipo multidisciplinar de geriatría.
- ☐ b. El soporte sociofamiliar no influye en el pronóstico oncológico del anciano.
- ☒ c. Existen escalas de cribaje para seleccionar aquellos pacientes que deben ser valorados por un equipo multidisciplinar de geriatría. ✓
- ☐ d. La VGI no modifica en nada la aproximación terapéutica del anciano con patología oncológica.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

**El glioblastoma en paciente anciano...**

Seleccione una:

- ☒ a. La biología molecular juega un papel importante en la evolución. ✓
- ☐ b. La sobreexpresión de IDH1 confiere un peor pronóstico.
- ☐ c. La RT juega un papel secundario.
- ☐ d. Es un tumor poco frecuente.

Pregunta **10**  
Sin contestar  
Puntúa como 1,00

Con respecto a la Medición Potencialmente Inapropiada (MPI) es correcto que:

- Seleccione una:
- ☐ a. La expectativa de vida tiene un papel esencial para determinar lo apropiado de un fármaco.
  - ☐ b. Los criterios de Beers y los STOPP-START no sirven para detectar MPIs.
  - ☐ c. Entre las estrategias de intervención sobre MPIs y polifarmacia no se incluye la elaboración de planes de deprescripción o adecuación de la medicación.
  - ☐ d. El uso de MPIs no se ha asociado con una mayor utilización de recursos sanitarios y costes, incluyendo visitas a urgencias y hospitalizaciones.

Respuesta incorrecta.

Pregunta **11**  
Sin contestar  
Puntúa como 1,00

Respecto a bevacizumab en población anciana:

- Seleccione una:
- ☐ a. Se asociado el incremento de toxicidad al empleo en casos con contraindicaciones. Es imprescindible ajustarse a las indicaciones en ficha técnica en esta población.
  - ☐ b. Nunca se ha utilizado bevacizumab en población anciana. Es un fármaco que no debe estar contemplado en la batería de tratamientos de la población anciana.
  - ☐ c. Está indicado en caso de histología epidermoide en pulmón, si existe antecedente de hemoptisis, tras una cirugía mayor de forma inmediata.
  - ☐ d. Podemos utilizarlo en todos los casos.

Pregunta **12**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La valoración geriátrica integral en el paciente anciano en oncología es:

- Seleccione una:
- ☒ a. Es una valoración multidisciplinar y multidimensional ✓
  - ☐ b. Una valoración social.
  - ☐ c. Una valoración nutricional, social y mental.
  - ☐ d. Una valoración funcional exclusivamente.

Respuesta correcta

Pregunta **13**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La RT hipofraccionada en el cáncer de próstata:

- Seleccione una:
- ☐ a. La dosis total equivalente es menor que en fraccionamiento convencional.
  - ☐ b. No hay estudio de evidencia alta todavía para demostrar su beneficio.
  - ☒ c. Reduce el número de horas totales y días de radiación. ✓
  - ☐ d. Ha aumentado la toxicidad en recto.

Pregunta **14**  
Sin contestar  
Puntúa como 1,00

Los bifosfonatos están indicados:

- Seleccione una:
- ☐ a. No está muy definido su papel en población anciana que recibe IA.
  - ☐ b. Siempre de forma intravenosa.
  - ☐ c. No tienen indicación en la osteoporosis.
  - ☐ d. Nunca.
  - ☐ e. Siempre que hay insuficiencia renal.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**¿Cuál es la neoplasia ginecológica más frecuente en la población anciana?**

Seleccione una:

- ☐ a. Neoplasia de ovario.
- ☐ b. Neoplasia de vulva.
- ☒ c. Neoplasia de endometrio. ✓
- ☐ d. Neoplasia de cérvix.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**La Radioterapia y la hormonoterapia...**

Seleccione una:

- ☐ a. Hay evidencia alta que mejoran la supervivencia en paciente de alto riesgo con prostatectomía previa.
- ☐ b. Cuando se administra HT se debe reducir la dosis de RT.
- ☒ c. Hay evidencia alta que en pacientes de riesgo intermedio aumentan la supervivencia. ✓
- ☐ d. Están indicadas en el paciente con cáncer de próstata de bajo riesgo.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**¿Todos los pacientes ancianos intervenidos deben recibir quimioterapia adyuvante?**

Seleccione una:

- ☐ a. Si, los datos se pueden extrapolar tranquilamente a la población anciana general.
- ☐ b. Si, existe amplia información, sobre todo para el subgrupo de 80 años.
- ☒ c. Si, en los casos en los que está indicada la adyuvancia (> 3 cm, >N1). Los resultados de análisis retrospectivos sugieren que los ancianos se benefician de forma similar; pero estos datos son más limitados a partir de los 80 años. ✓
- ☐ d. Si, siempre.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**En relación con la valoración geriátrica integral, ¿cuál de las siguientes ES FALSA?**

Seleccione una:

- ☐ a. Las actividades básicas de la vida diaria incluyen el aseo, vestido, continencia, uso WC, alimentación y capacidad de levantarse de la cama y de la silla.
- ☐ b. Cuadro contusiona agudo (delirium) y demencia son entidades diferentes, con un pronóstico diferente y con una influencia distinta en el pronóstico oncológico.
- ☐ c. La depresión puede afectar a la respuesta al tratamiento oncológico.
- ☒ d. El factor más importante a tener en cuenta a la hora de plantear un tratamiento oncológico de un paciente es su edad. ✓

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**El ejercicio físico en el ámbito de la oncogeriatría:**

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar ejercicio físico no ha demostrado disminución de la mortalidad.
- ☐ b. En las personas ancianas con cáncer, la mayoría de los tratamientos no se asocian con un mayor riesgo de deterioro funcional y de pérdida de masa muscular. Por este motivo no precisan ejercicio físico.
- ☐ c. Realizar ejercicio físico no reduce la toxicidad ni los efectos secundarios.
- ☒ d. Las prescripciones de ejercicio físico por ejemplo programas de rehabilitación que incluyen ejercicio aeróbico y anaeróbico, son eficaces para pacientes ancianos oncológicos y los sobrevivientes. ✓

Respuesta correcta

Pregunta **20**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el tratamiento óptimo de neoplasia de ovario en población anciana?

Seleccione una:

- ☒ a. El mismo que la población adulta, ajustado por comorbilidad y riesgo quirúrgico. ✓
- ☐ b. Quimioterapia a dosis bajas seguido de cirugía.
- ☐ c. Cirugía solo.
- ☐ d. Radioterapia.

Pregunta **21**  
Sin contestar  
Puntúa como 1,00

Uno de los efectos adversos de cetximab, que puede nos puede pasar desapercibido en población anciana es:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipomagnesemia.
- ☐ b. Hipercalcemia.
- ☐ c. Hiponatremia.
- ☐ d. Hiperpotasemia.

Pregunta **22**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las características de la cardiotoxicidad por trastuzumab es:

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce siempre en todas las pacientes, independientemente de su comorbilidad.
- ☒ b. Suele ser reversible, a diferencia de la cardiotoxicidad por antraciclinas. ✓
- ☐ c. Que no existe.
- ☐ d. Una vez establecida, es irreversible.

Pregunta **23**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los pacientes que reciben ADT presentan un riesgo aumentado de:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son ciertas. ✓
- ☐ b. Muerte súbita.
- ☐ c. Ginecomastia.
- ☐ d. Osteopenia.
- ☐ e. Fracturas óseas.

Pregunta **24**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La Radiocirugía esteroatáxica supone una alternativa al tratamiento quirúrgico en:

Seleccione una:

- ☒ a. En pacientes no operables por razones médicas, aunque no existen estudios prospectivos. ✓
- ☐ b. Siempre, los estudios prospectivos aleatorizados demuestran que es mejor.
- ☐ c. Siempre es preferible la Radioterapia externa a la Radiocirugía estereoatáxica.
- ☐ d. Tiene más efectos secundarios que la cirugía.

Pregunta **25**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes receptores no está implicado en la fisiopatología de la emesis inducida por la quimioterapia?

Seleccione una:

- ☒ a. Noradrenalina. ✓
- ☐ b. Dopamina.
- ☐ c. Serotonina.
- ☐ d. Histamina.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**Señale la opción VERDADERA**

Seleccione una:

- ☒ a. La población > 65 está pobremente representada en ensayos clínicos. ✓
- ☐ b. Existe una relación inversa entre cáncer y envejecimiento.
- ☐ c. El cáncer es la segunda causa de mortalidad (después de las enfermedades cardiovasculares) en población de edad avanzada en España.
- ☐ d. El envejecimiento es un proceso complejo y homogéneo.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**¿Qué opción es preferible en estadio III?**

Seleccione una:

- ☐ a. Radioterapia exclusiva.
- ☐ b. Quimioterapia exclusiva.
- ☐ c. Es preferible no tratar a los ancianos.
- ☒ d. Quimioterapia y radioterapia a ser posible concomitante. ✓

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**¿Qué es característico en los pacientes de edad avanzada?**

Seleccione una:

- ☐ a. Su reserva hematopoyética y nutricional es igual al de cualquier otro grupo de edad.
- ☐ b. La pérdida de capacidades funcionales está acelerada en estos pacientes por eso hay que intentar retrasar la rehabilitación al máximo.
- ☒ c. Tienen una mayor fragilidad cutánea y menor elasticidad. ✓
- ☐ d. El desarrollo de úlceras por presión suele estar retrasado en estos pacientes.

Pregunta **29**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00**En relación con el anciano frágil, cuál de las siguientes es VERDADERA?**

Seleccione una:

- ☐ a. En ocasiones y con una intervención adecuada la fragilidad puede revertirse o mejorarse.
- ☐ b. Todo anciano frágil debe considerarse como subsidiario únicamente de tratamiento paliativo.
- ☒ c. Todos los ancianos con algún grado de deterioro cognitivo y discapacidad deben considerarse frágiles. ✗
- ☐ d. No existen criterios aceptados de fragilidad.

Pregunta **30**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00**¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento quimioterápico de pacientes ancianos, NO es correcta?**

Seleccione una:

- ☐ a. Una opción razonable, si la expectativa de vida es corta o existe una comorbilidad importante, es no administrar quimioterapia adyuvante.
- ☐ b. Los estudios clínicos han demostrado que los únicos esquemas que aportan mayor toxicidad son aquellos basados en fluoropirimidinas.
- ☐ c. Los distintos meta-análisis han demostrado beneficio del tratamiento quimioterápico tanto en términos de supervivencia libre de progresión y global, con un leve incremento del riesgo de toxicidad.
- ☒ d. La sustitución de 5-fluorouracilo por capecitabina se ha demostrado no inferior en población anciana. ✗

[◀ Versión en pdf M6](#)

Ir a...

[Evaluación de la Satisfacción ►](#)

