

Tema 1. Conceptos generales

“La violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que esta ocurra, es: **a. Es un acto de violencia contra las mujeres.**

“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”, se recogen por primera vez en: **d. Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena.**

A que colectivo de mujeres nos referimos cuando hablamos de “mujeres en situación de especial vulnerabilidad”. a. Mujeres en etapas vitales como el embarazo y puerperio. b. Mujeres en edad avanzada. d. Mujeres drogodependientes. **c. Son todas correctas.**

Cuál de los siguientes actos violentos se puede considerar como Violencia de Género: a. Maltrato sexual. b. Maltrato físico. d. Maltrato psicológico. **c. Son todas correctas.**

Dónde y cuándo reconocen que la violencia de género se constituye como uno de los principales obstáculos para el abordaje de la libertad, el desarrollo y el disfrute de los derechos de la Mujer. **a. En 1995, en el seno de las Naciones Unidas.**

El ciclo de la violencia es ... **b. La teoría que explica por qué la Violencia de Género llega a cronificarse.**

El contexto en el que se sitúa con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es: **b. La familia.**

El contexto más común de violencia contra las mujeres es el que proviene de: a. De la pareja actual. b. De la pareja anterior. **d. A y B son correctas.**

El enfoque del género en la salud pública, nos ha servido para... **c. Comprender los problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos en mujeres de todas las edades.**

El instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad, las relaciones jerárquicas y de poder de los hombres sobre las mujeres, es: **c. La violencia específica contra las mujeres.**

En cuantas fases se divide el ciclo de violencia. **c. Tres: Tensión, explosión, reconciliación.**

En el ciclo de violencia de género la fase de reconciliación o luna de miel, se caracteriza: **c. El maltratador, expresa su voluntad de no volver a agredir a la pareja y espera que ella no vuelva a “provocarlo” después del castigo que ha recibido.**

Las diferentes formas de violencia: física, psicológica y sexual, suelen ir acompañadas de: a. Maltrato económico. b. Maltrato ambiental. **d. A y B son correctas.**

Que condición se incluye en la LO 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. **c. La violencia que se ejerce hacia la mujer, por parte de sus cónyuges, o personas que hayan estado ligadas a ellas con relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.**

Que significa integrar las perspectivas de género en la salud pública. b. Lograr la igualdad de género. c. Abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos. d. Tener en cuenta las diferentes necesidades de la mujer y el hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. **a. Son todas correctas.**

Tema 2. Marco institucional y líneas generales de abordaje desde el ámbito sanitario

Atender y proteger a la mujer víctima de la violencia de género y /o agresiones sexuales de la forma más eficiente, es: **a. Un objetivo específico del protocolo marco de actuación profesional para casos de violencia de género de Castilla y León.**

Como ejes temáticos en el Plan nacional de sensibilidad y prevención de la violencia de género, tenemos: **d. Salud.**

Como ejes transversales en el Plan nacional de sensibilidad y prevención de la violencia de género, tenemos: **b. Seguimiento y evaluación.**

De las siguientes, identifica cuales son recomendaciones para los centros sanitarios, según el protocolo marco de actuación profesional para casos de violencia de género de Castilla y León. b. Si en una consulta está el agresor, es necesario que salga de la misma. c. Se prestarán atenciones de urgencia apropiadas a las circunstancias. d. Se hará especial mención al estado psíquico de la víctima. **a. Todas son correctas.**

El diagnóstico y la atención en violencia de género, corresponde a: a. Asistencia primaria. b. Asistencia especializada. **d. A y B son correctas.**

El protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, establece pautas homogéneas para: a. La detección precoz. b. Valoración, actuación y seguimiento en una perspectiva de atención integral. **c. A y B son correctas.**

En el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género se establecen: **b. Tres niveles de prevención.**

En la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género se.... a. En el ámbito publicitario, se refuerza una imagen que respete la igualdad y dignidad de las mujeres. b. Proporciona una respuesta legal integral que abarca las normas procesales. c. Se establecen medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo. **d. Todos son correctas.**

En la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, se establecen medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para: a. La coordinación con otras medidas de apoyo. c. Optimizar la detección precoz. d. Optimizar la atención física y psicológica. **b. Todas son correctas.**

La atención de la violencia de género es una competencia incuestionable del sistema sanitario, porque: b. Genera problemas crónicos, afección de la salud sexual y reproductiva. c. Define las consecuencias de los malos tratos sobre la salud. d. Produce muerte y deterioro de la salud física. **a. Todas son correctas.**

La Ley de medidas de protección integral contra la violencia para garantizar ayudas sociales a las mujeres víctimas... **d. En los supuestos que se estime que por unas circunstancias sociales no mejora su empleabilidad, se prevé la incorporación a un programa de acción específico creado al efecto de su inserción profesional.**

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, establece medidas de protección en el ámbito social para: a. Posibilitar la movilidad geográfica. b. Justificar las ausencias del puesto de trabajo. c. La suspensión con reserva de puesto de trabajo. **d. Todas son correctas.**

Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS: **a. Promoverán actuaciones con el personal sanitario que permita la detección precoz.**

Las situaciones de violencia de las mujeres afectan a: **a. Los menores que se encuentren dentro de su entorno familiar.**

Los profesionales que atienden directamente a la víctima de violencia de género.... a. Informará a la paciente que se garantiza la confidencialidad de las actuaciones. b. Deben de transmitir a la víctima calma y confianza. d. Deben de mostrar una actitud receptiva, empática y comprensiva. **c. Todas son correctas.**

Tema 3. La detección de la violencia de género en los servicios de salud

Cuáles son las tareas del Trabajo Social sanitario, ante una víctima de violencia de género. b. Investigar en los factores psicosociales, que inciden en el proceso de salud-enfermedad. c. Elaboración de un proyecto de intervención integral. d. Seguimiento y derivación de las mujeres y sus hijas/os. **a. Son todas correctas.**

Cuando intervenimos con la presencia del conflicto, de qué tipo de prevención estamos hablando: **c. Secundaria.**

Cuántos niveles de prevención hay en la violencia de género: **a. Tres.**

Durante el puerperio, la petición de anticonceptivos lo antes posible por presión de su pareja a reiniciar relaciones sexuales, lo podemos considerar. **d. Como un indicador de sospecha sobre una posible situación de violencia de género.**

El personal directamente implicado en la intervención contra la violencia, es: a. Matrona. b. Fisioterapia. d. Enfermería. **c. Todas son correctas.**

El personal sanitario de los servicios de salud, desempeña un papel crucial para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género, porque: a. La mayoría de las mujeres, en algún momento de su vida, acuden a estos servicios. b. La detección de la situación de violencia predispondrá a la ruptura del silencio. **c. A y B son correctas.**

El sistema sanitario, tiene alguna relevancia en la prevención primaria de la violencia de género. a. Iniciando y proponiendo campañas, en colaboración con otras instituciones y colectivos. b. Colaborando con las asociaciones de la comunidad en charlas y talleres sobre violencia. c. Realizando actividades de sensibilización y prevención en centros educativos. **d. Son todas correctas.**

Las necesidades de atención de las mujeres víctimas de violencia de género, varían en función de: a. La cronicidad de la situación. b. Los recursos personales y económicos. c. El maltrato sufrido. **d. Son todas correctas.**

Los pediatras y enfermeras de pediatría, juegan un papel relevante en la detección e intervención, por qué: a. Indicadores de sospecha por conductas agresivas y trastornos psicosomáticos de repetición. c. Los/as hijo/as de las mujeres víctimas presentan elevadas consultas con síntomas inespecíficos. d. Niños/as con problemas de ansiedad. **b. Son todas correctas.**

No reconocer una situación de maltrato como condicionante de un problema de salud puede conllevar a: **b. La medicalización del problema.**

Por qué las matronas tienen un papel relevante en la detección de la violencia de género: a. Pueden observar cualquier signo de alarma que la mujer presente. c. Es uno de los momentos críticos en el ciclo de violencia. **d. A y C son correctas.**

Que actuaciones, para la detección precoz se deben de introducir en la práctica clínica: **d. Estar alertas a posibles signos y síntomas de maltrato.**

Qué características debe de tener una entrevista clínica ante la sospecha de violencia de género: b. Facilitar la expresión de sentimientos. c. Hacer sentir a la mujer que no es culpable de la violencia sufrida. d. Utilizar el tiempo necesario para la entrevista. **a. Son todas correctas.**

Qué tipo de intervención precisa la mujer víctima de violencia de género: **b. Atención integral.**

Sólo podemos intervenir en situaciones de violencia de género, cuando haya lesiones físicas. a. Verdadero, el maltrato psicológico no existe. b. Verdadero, sólo podemos intervenir ante situaciones de hechos consumados. d. Verdadero y hacer el parte judicial. **c. Todas son falsas.**

Tema 4. Práctica clínica sobre la violencia de género

¿Es responsabilidad del profesional estar alerta e identificar los indicadores de sospecha? **c.**

Sí, es nuestra responsabilidad detectar el maltrato y dar la atención adecuada y canalizar las posibles demandas.

Cuando en la consulta diaria nos encontramos ante un posible caso de violencia de género, nuestra intervención ha de ser: **c. Fundamental mantener la relación con la víctima.**

De los siguientes síntomas físicos, identifica cuales te harían sospecha de la posibilidad del maltrato. a. Consultas reiteradas de urgencia por lesiones atribuidas a accidentes fortuitos. c. Lesiones o hematomas en diferentes estadios evolutivos. d. Discrepancia entre la exploración y el mecanismo de producción referido. **b. Todas son correctas.**

De los siguientes, identifica uno o varios factores asociados a ser mujer maltratada. a. Baja autoestima. b. Desequilibrio de poder en la pareja. **c. A y B son correctos.**

El abordaje de la violencia de género, ha sido considerado como un objetivo estratégico de primera magnitud, por ello... a. Se valora y canalizan las necesidades y demandas. c. Se realiza una detección sistemática en mujeres mayores de 14 años. d. Se identifican factores de riesgo y vulnerabilidad. **b. Todas son correctas.**

El desconocimiento del proceso de génesis y mantenimiento de la violencia de pareja, por los profesionales, puede ser causa de: **b. Errores en el abordaje del problema.**

El Sacyl, ha desarrollado una guía de actuación ante casos de violencia de género, con el objeto de: **d. Establecer los criterios de derivación a los recursos sanitarios o sociosanitarios de apoyo.**

La entrevista clínica con una mujer víctima de violencia de género debe de: a. Estar planificada previamente. c. Si precisa la intervención de otro profesional, previamente se explicará a la mujer el procedimiento. d. No victimizar a la mujer. **b. Son todas correctas.**

La formación del personal de los servicios de salud, ha facilitado: **b. Las actuaciones e intervenciones ante casos de violencia.**

La prevención y la atención a las mujeres víctimas de violencia de género es también un problema... **a. Social, con raíces culturales y educativas.**

Los profesionales sanitarios no precisan formación para intervenir con mujeres víctimas de violencia de género. b. Falso. c. Precisan una formación específica, así como recomendaciones claras y concisas. **d. B y C son correctas.**

Por qué juegan los servicios de salud un papel tan importante, en la violencia de género. a. Constituyen la primera y a veces única oportunidad para detectar a tiempo su existencia. b. Fijan un plan de atención junto con los recursos sociosanitarios disponibles. **d. A y B son correctas.**

Por qué las mujeres no reconocen que son víctimas de violencia de género: a. Ambivalencia respecto a los sentimientos hacia el agresor. b. Sentimiento de fracaso, vergüenza y culpa. d. Miedo a represalias del agresor. **c. Todas son correctas.**

Por qué se ha de realizar el cribado poblacional. a. Las dificultades para la detección del maltrato psicológico. b. El bajo diagnóstico. d. La alta prevalencia de la violencia de género. **c. Todas son correctas.**

Qué tipo de intervención requiere la atención a víctimas de violencia de género: **d. Multidisciplinar, integrada y coordinada.**