

Navegación por el
cuestionario[Finalizar revisión](#)

Comenzado el lunes, 15 de mayo de 2017, 23:00
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 15 de mayo de 2017, 23:05
Tiempo empleado 4 minutos 36 segundos
Puntos 5,00/5,00
Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario - Apto

Información
 Marcar
pregunta

Paciente de dos años que acude al servicio de urgencias acompañado de su padre por aparición brusca de vómitos, malestar general, dolor abdominal, diarrea y fiebre de 38.5.
 El padre refiere que lleva unas 12 h sin tomar ningún tipo de alimento y ha conseguido que beba un vaso de agua con mucha dificultad, ya que el niño se muestra irritable y no tolera ningún alimento.

Pregunta 1

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00

 Marcar
pregunta

¿Qué patología nos hace sospechar que padece el niño con la sintomatología que se indica?

Seleccione una:

- ☐ a. Fibrosis quística
☐ b. Meningitis
☒ c. Gastroenteritis ✓
☐ d. Intoxicación farmacológica

Pregunta 2

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00

 Marcar
pregunta

El tratamiento de la GEA se basa principalmente en:

Seleccione una:

- ☐ a. Dieta pobre en carbohidratos
☒ b. Rehidratación vía oral ✓
☐ c. Administración profiláctica de antibióticos de amplio espectro
☐ d. Rehidratación oral y administración de antidiarreicos tipo Fortasec® hasta desaparición de los síntomas

Pregunta 3

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Respecto a dieta a seguir:

Seleccione una:

- ☒ a. Debe reiniciarse lo antes posible adecuada a su edad y sin restricciones necesarias ✓
☐ b. Solo deberá consumir líquidos de cualquier tipo (zumos, infusiones, agua) durante 48h
☐ c. La dieta deberá ser rica en carbohidratos simples y deberá incluir la ingesta de al menos 1 alimento graso en c comida
☐ d. Todas son falsas

Pregunta 4

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Entre los datos a recoger para una adecuada valoración están:

Seleccione una:

- ☐ a. Ingesta oral, constantes vitales y diuresis
☐ b. Ingesta oral y diuresis
☐ c. Relleno capilar y balance hídrico.
☒ d. peso, tolerancia a la ingesta oral, constantes vitales, estado de conciencia y signos de deshidratación. ✓

Pregunta 5

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00

 Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes signos se deben valorar en un estado de deshidratación?

Seleccione una:

- ☐ a. Fontanela
☐ b. Sed, diuresis y densidad urinaria
☐ c. Relleno capilar y estado de conciencia
☒ d. Todos son correctos ✓

[Finalizar revisión](#)