

Comenzado el Estado	viernes, 23 de junio de 2017, 15:52 Finalizado
Finalizado en	viernes, 23 de junio de 2017, 17:19
Tiempo empleado	1 hora 27 minutos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de un máximo de 10,00 (90%)
Comentario -	APTO

Pregunta 1

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

La necesidad de aspiración de secreciones, es determinada por: SEÑALE LA FALSA

Seleccione una:

- a. La observación visual del acumulo de secreciones.
- b. Por la auscultación.
- c. Por la clínica.
- d. Horario estandarizado.

La dificultad respiratoria se manifiesta como un cuadro clínico compuesto por diversos signos que debemos valorar. ¿Cuál de estos signos NO es correcto en esta valoración?

Seleccione una:

- a. Quejido.
- b. Color.
- c. Aleteo.
- d. Frecuencia Cardiaca.

Pregunta 3

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En la aspiración de secreciones a través del tubo endotraqueal tenemos dos opciones, bien a través de aspiración abierta o bien a través de aspiración cerrada. ¿Qué les diferencia?

Seleccione una:

- a. El colapso pulmonar durante el procedimiento es mayor en la aspiración cerrada.
- b. Ambas necesitan la misma presión pico para recuperar el volumen pulmonar.
- c. Tras la aspiración abierta se necesita un mayor reclutamiento pulmonar.
- d. No hay nada que las diferencie.

Pregunta 4

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la prevención de aparición de las lesiones en las fosas nasales por el uso continuado de "prongs" bien sea en modalidad CPAP o en BIPAP. ¿Qué es cierto?

Seleccione una:

- a. El empeño constante del personal de enfermería en la adecuación, instalación y manutención del material, así como la vigilancia del recién nacido, es primordial.
- b. El gorro no tiene que quedar ajustado, puede quedar holgado.
- c. Es mejor que el "prongs" sea de pequeño tamaño.
- d. No es necesario el entrenamiento de los profesionales en la materia.

Pregunta 5

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la literatura, la frecuencia de lesiones nasales con CPAP es alta. SEÑALE LA FALSA:

Seleccione una:

- a. Los "prongs" totalmente metidos en la nariz están en su posición correcta y no produce lesiones.
- b. El cambio de gorro, cuando deja de quedar ajustado, es necesario para que no se movilicen las tubuladuras y prevenir la formación de lesiones.
- c. Los "prongs" introducidos en la nariz de tal forma que la nariz quede deformada y hacia arriba, puede producir lesiones nasales.
- d. Unos "prongs" pequeños se movilizan dentro de las fosas nasales, pudiendo originar lesiones.

Pregunta 6

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a los cuidados de enfermería en las gafas nasales convencionales, señale la FALSA:

Seleccione una:

- a. Revisar aparataje previo a la colocación. Asegurarnos de que el flujo fijado se adecúa al tipo de gafa nasal elegida.
- b. Protección de la piel con apósitos hidrocoloides, en especial en la zona de las mejillas.
- c. Comprobación periódica de temperatura en humidificador-calentador.
- d. Comprobación de la coloración de piel y mucosas, saturación y patrón respiratorio.

Pregunta 7

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

El Oxígeno es mucha veces esencial para el recién nacido prematuro, pero debe tener una estrecha vigilancia ya que puede producir importante efectos adversos. ¿Cuál es uno de ellos?

Seleccione una:

- a. Neumotórax.
- b. Hemorragia pulmonar.
- c. Enfisema.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de las complicaciones de la CPAP y de la BIPAP puede surgir el edema palpebral. ¿Cómo podremos evitarlo? Señalad la FALSA

Seleccione una:

- a. Colocad adecuadamente el gorro y las tiras del sistema de CPAP o BIPAP.
- b. Posición antitrendelemburg.



c. Haced descansos en la medida de lo posible.



d. Mantened las tiras del sistema sin apretar, tan sólo lo suficiente para que realicen un buen sellado.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Un lactante diagnosticado de Broncodisplasia Pulmonar presenta un cuadro clínico de taquipnea, retracciones intercostales y subcostales, episodios de hipoxia e hipercapnia y escasa ganancia ponderal a pesar de recibir un adecuado aporte calórico. Los cuidados de enfermería dirigidos a la mejoría de estos pacientes son: SEÑALA LA CORRECTA.

Seleccione una:



a. Cuidados relacionados con la asistencia respiratoria que reciba y vigilando continuamente el estado del patrón respiratorio.



b. Aspiración de secreciones periódicas y pautadas.



c. Oxigenoterapia con Fio2 alta sin valorar necesidades y siempre caliente y humedecido.



d. Ninguna es correcta.

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con terapia de NO instaurada, ¿Qué prueba o calibración debemos hacer a diario?

Seleccione una:



a. Prueba de purga.



b. Calibración del límite inferior.



c. Prueba de fugas.



d. No necesita ninguna prueba a diario.

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué método no invasivo para medición de parámetros respiratorios debemos movilizar cada 2-6 horas para evitar quemaduras ya que aplicamos sobre la piel un sensor calentado?

Seleccione una:

- a. Transcutáneas.
- b. Capnógrafo
- c. Pulsioxímetro.
- d. Gases sanguíneos capilares.

Pregunta 12

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Úlceras por presión, distensión abdominal, disconfort, apneas por obstrucción, aspiración por reflujo de contenido gástrico, edema palpebral... Son posibles complicaciones de:

Seleccione una:

- a. CPAP
- b. BIPAP
- c. Ninguna en cierta.
- d. Ambas son ciertas.

Pregunta 13

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué test utilizaremos para valorar el grado de dificultad respiratoria del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Test de Apgar.
- b. Test de Silverman.



c. Test de Ballard.



d. Test de Capurro.

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente sometido a ventilación mecánica, uno de los cuidados de enfermería es el manejo del respirador y sus alarmas. Una de las alarmas más frecuentes es "Volumen minuto bajo", que NO nos indicaría esta alarma.

Seleccione una:



a. Ha disminuido la resistencia.



b. Se interrumpe o se reduce la respiración espontánea.



c. Fallo del funcionamiento del aparato.



d. Fugas en el tubo demasiado altas.

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Un recién nacido intubado, con soporte respiratorio invasivo en modalidad A/C ¿quiere decir?

Seleccione una:



a. Volumen tidal muy bajos, iguales o inferiores a los del espacio muerto con frecuencias respiratorias muy por encima de las fisiológicas.



b. El respirador garantiza un mínimo de respiraciones programadas. El inicio de la inspiración es detectado por los sensores de flujo, poniendo en marcha cada ciclo.



c. Cada ciclo mantiene fijo el volumen tidal, generando la presión necesaria para ello sin sobrepasar los límites de una presión inspiratoria máxima fijada.



d. Respiraciones continuas y automáticas del respirador, independientemente de los esfuerzos que realice el paciente.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es cierto respecto a las precauciones a la hora de realizar aspirado de secreciones?

Seleccione una:

- a. Aspirar no produce náuseas y vómitos.
- b. Aspirar de forma rutinaria.
- c. Puede producir aumento de la presión intracraneal (PIC). Es necesario valorar el adecuado nivel de sedación y relajación antes de aspirar a RN con PIC elevada o prematuros con riesgo de hemorragia intracraneal.
- d. La aspiración de secreciones puede producir taquicardia e hipertensión arterial por estimulación vagal.

Pregunta 17

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué gas, con vida media corta, utilizamos como vasodilatador pulmonar selectivo?

Seleccione una:

- a. Oxígeno.
- b. Óxido Nítrico.
- c. Dióxido de Carbono.
- d. Helio.

Pregunta 18

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

Recién nacido prematuro que manifiesta ausencia de movimientos respiratorios con bradicardia, hipoxemia o ambas. ¿Ante qué nos encontramos?

Seleccione una:

- a. Pausa de apnea.
- b. Respiración periódica del prematuro.
- c. Broncodisplasia pulmonar.
- d. Ninguna es cierta.

Pregunta 19

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

No se deben realizar variaciones en el O₂ administrado sólo por variaciones de SatO₂ en el monitor, antes debemos verificar que:

Seleccione una:

- a. No es necesario una onda de pulxioxímetro buena, nos fijaremos tan sólo en el valor numérico.
- b. Las variaciones en la frecuencia cardiaca o el cambio en el esfuerzo respiratorio, no son síntomas de mayor necesidad de O₂.
- c. Observar hasta cuánto baja la saturación y cuánto cuesta remontar. Tal vez con estímulo táctil tendríamos resuelto el problema.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 20

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué parámetro en el respirador nos indica la "presión inspiratoria máxima"?

Seleccione una:

- a. PIP
- b. MAP
- c. I/E
- d. PEEP