

TEST DE FÁRMACOS INTRAVENOSOS EN URGENCIAS. GUÍA ENFERMERA.

Pregunta 1

133.- ¿Cuándo está contraindicado el Voltaren®?

Seleccione una:

- a. Ancianos.
- b. Asma.
- c. Porfiria.
- d. HTA.

Pregunta 2

131.- La absorción del diazepam por vía intramuscular es:

Seleccione una:

- a. Aumentada.
- b. Disminuida.
- c. Errática.
- d. Igual que la IV.

Pregunta 3

115.- ¿Qué fármaco provoca coloración azul en orina, piel y heces?

Seleccione una:

- a. Atropina.
- b. Azul de metileno.
- c. Verde de metileno.
- d. Adrenalina.

Pregunta 4

172.- ¿En qué patología hay que tener precaución cuando se administre el metamizol magnésico?

Seleccione una:

- a. Hipertensión.
- b. Hipotensión.
- c. Hipoglucemia.
- d. Hiperglucemia.

Pregunta 5

111.- ¿Cuál de los siguientes fármacos debe conservarse en frío?

Seleccione una:

- a. Amiodarona.
- b. Besilato de atracurio.**
- c. Atenolol
- d. Azul de metileno.

Pregunta 6

132.- ¿Cada cuánto tiempo se puede repetir el diazóxido?

Seleccione una:

- a. 2 min.
- b. 5-15 min.**
- c. 15-20 min.
- d. 20-25 min.

Pregunta 7

163.- A partir de que frecuencia cardíaca es necesario la interrupción de la administración de la Aleudrina®:

Seleccione una:

- a. 100 lpm.
- b. 80 lpm.
- c. 110 lpm.**
- d. 200 lpm.

Pregunta 8

144.- ¿Cuál es el antídoto del fentanilo?

Seleccione una:

- a. Naloxona.**
- b. Fisostigmina.
- c. Amiodarona.
- d. Flumaceniilo.

Pregunta 9

160.- ¿Qué fármaco se utiliza para las intoxicaciones por cianuro?

Seleccione una:

- a. Hidrocortisona.
- b. Naloxona.
- c. Hidroxicobalamina.
- d. Flumacenilo.

Pregunta 10

164.- La ketamina es un:

Seleccione una:

- a. Antiinflamatorio no esteroideo.
- b. Anestésico general.
- c. Alfa y beta bloqueante.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 11

134.- La Fenitoina® se utiliza para:

Seleccione una:

- a. Arritmias auriculares.
- b. Arritmias ventriculares.
- c. Epilepsia.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 12

124.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización del clonazepam?

Seleccione una:

- a. TSVP.
- b. Hipotensión.
- c. Convulsiones.
- d. Coma hiperglucémico.

Pregunta 13

157.- ¿Cuál es la dosis inicial de la heparina sódica?

Seleccione una:

- a. 10 UI/kg.
- b. 50 UI/kg.

- c. 25 UI/kg.
- d. 60 UI/kg.**

Pregunta 14

187.- El Zofran® es un:

Seleccione una:

- a. Simpaticomimético.
- b. Antiemético.**
- c. Antihistamínico H2.
- d. Analgésico opioide.

Pregunta 15

117.- ¿Para qué se utiliza el Akineton®?

Seleccione una:

- a. Espasmos gastrointestinales.
- b. Arritmias ventriculares.
- c. Efectos extrapiramidales por neurolépticos.**
- d. Todas son falsas.

Pregunta 16

207.- ¿Cuál es la dosis de vasopresina que se utiliza en PCR?

Seleccione una:

- a. 10 UI.
- b. 40 UI.**
- c. 50 UI.
- d. 5 UI.

Pregunta 17

147.- ¿Cuál es el antídoto de la fisostigmina?

Seleccione una:

- a. Atropina.
- b. Adrenalina.
- c. Pralidoxima.
- d. A y c son verdaderas.**

Pregunta 18

180.- La N-acetilcisteína se considera un:
Seleccione una:

- a. Antiinflamatorio.
- b. Antídoto.**
- c. Miorrelajante.
- d. Vasodilatador directo.

Pregunta 19

166.- Para administrar el labetalol el paciente debe estar:
Seleccione una:

- a. De pie.
- b. En decúbito supino.**
- c. En decúbito prono.
- d. En decúbito lateral.

Pregunta 20

150.- El flumazenilo es el antagonista de:
Seleccione una:

- a. Opiáceos.
- b. Benzodiazepinas.**
- c. Diuréticos.
- d. Hipotensores.

Pregunta 21

189.- ¿Cuál de los siguientes fármacos es necesario su conservación en frío?
Seleccione una:

- a. Adenosina.
- b. Pantoprazol.
- c. Pancuronio.**
- d. Cloruro potásico.

Pregunta 22

197.- ¿Cuál es el riesgo principal de una inyección rápida de ranitidina?
Seleccione una:

- a. Dolor de cabeza.
- b. Dolor abdominal.**

- c. **Riesgo de arritmias.**
- d. Todas son falsas.

Pregunta 23

174.- ¿Cuál de estos fármacos es necesario protegerlo de la luz?

Seleccione una:

- a. Metilprednisolona.
- b. Midazolam.
- c. Metoclopramida.
- d. **Todas son verdaderas.**

Pregunta 24

137.- En la perfusión de la dobutamina en un paciente de 70 kg a una dosis de 10 µg/kg/min ¿qué ritmo en ml/h habría que infundir?

Seleccione una:

- a. 10.
- b. **8,4.**
- c. 17.
- d. 3.

Pregunta 25

202.- ¿Cuál de los siguientes fármacos es necesario protegerlo de la luz?

Seleccione una:

- a. Sulpiride.
- b. Somatostatina.
- c. Ringer.
- d. **Suxametonio.**

Pregunta 26

148.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización del Konakion®?

Seleccione una:

- a. Insuficiencia hepática.
- b. Deficiencia de glucosa 6-PD.
- c. **Hemorragias.**
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 27

159.- Si se administra la Actocortina® de manera rápida se produce:
Seleccione una:

- a. Cefalea.
- b. Prurito genital.**
- c. Vómitos.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 28

168.- ¿Cuál de los siguientes fármacos es necesario su administración por bomba?
Seleccione una:

- a. Lidocaina.**
- b. Sulfato de magnesio.
- c. Metamizol magnésico.
- d. Manitol.

Pregunta 29

178.- ¿Cuál es la dosis inicial del mivacurio?
Seleccione una:

- a. 0,2 mg/kg.**
- b. 0,6 mg/kg.
- c. 0,3 mg/kg.
- d. 0,1 mg/kg.

Pregunta 30

125.- ¿Cuál es el antídoto del clorazepato dipotásico?
Seleccione una:

- a. Naloxona.
- b. Fisostigmina.
- c. Amiodarona.
- d. Flumacenilo.**

Pregunta 31

142.- Hay que tener precaución en la administración del etomidato en:
Seleccione una:

- a. Inmunodeprimidos.
- b. Sepsis.**

- c. **Menores de 10 años.**
- d. Trasplante renal.

Pregunta 32

103.- Si fuera necesario utilizar la vía endotraqueal para la administración de adrenalina ¿qué dosis sería la adecuada?

Seleccione una:

- a. **2-2,5 mg.**
- b. 1 mg.
- c. 5 mg.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 33

127.- El dantroleno sódico se administra:

Seleccione una:

- a. IM.
- b. **IV.**
- c. Endotraqueal.
- d. Rectal.

Pregunta 34

206.- El elgadil es un:

Seleccione una:

- a. Anestésico.
- b. **Antihipertensivo.**
- c. Agonista opioide.
- d. Antigotoso.

Pregunta 35

102.- ¿Cuáles son las dosis de utilización de la adenosina?

Seleccione una:

- a. 3-6-12 mg.
- b. 6-6-12 mg.
- c. **6-12-12 mg.**
- d. 12-12-12 mg.

Pregunta 36

140.- El esmolol es un:
Seleccione una:

- a. Relajante muscular.
- b. Fibrinolítico.
- c. **Betabloqueante cardioselectivo.**
- d. Broncoconstrictor.

Pregunta 37

165.- ¿Cuáles de los siguientes son efectos secundarios del Toradol®?
Seleccione una:

- a. Bradicardia.
- b. **HTA.**
- c. Movimientos tónicoclónicos.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 38

208.- El Clonazepam tiene como categoría farmacológica según la FDA:
Seleccione una:

- a. B.
- b. **C.**
- c. D.
- d. X.

Pregunta 39

179.- ¿En qué patología está contraindicado la administración de morfina?
Seleccione una:

- a. Abdomen agudo no diagnosticado.
- b. **Depresión respiratoria.**
- c. Hipotiroidismo.
- d. IAM inferior.

Pregunta 40

198.- ¿Cuándo se debe suspender el Rapilysin®?
Seleccione una:

- a. En un IAM.
- b. En un EAP.

- c. En una hemorragia.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 41

194.- ¿Cuál de los siguientes son efectos secundarios del propranolol?

Seleccione una:

- a. Agitación.
- b. Diarrea.
- c. Fatiga.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 42

107.- ¿Qué suero se utiliza para la dilución de la amiodarona?

Seleccione una:

- a. Fisiológico.
- b. Glucosalino.
- c. **Glucosado.**
- d. Ringer lactato.

Pregunta 43

205.- Si se administra tramadol rápidamente puede provocar:

Seleccione una:

- a. Hipotensión.
- b. Náuseas.
- c. Vómitos.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 44

173.- ¿Cuál es la dilución que se debe realizar para la administración del Methergin®?

Seleccione una:

- a. 0,4 mg + 9 ml.
- b. **0,2 mg + 9 ml.**
- c. 0,2 mg + 5 ml.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 45

156.- A partir de que dosis es necesario asociar al haloperidol el biperideno:
Seleccione una:

- a. 1 mg.
- b. 5 mg.
- c. 10 mg.
- d. 2 mg.

Pregunta 46

128.- ¿Cuál es la dosis a administrar de mantenimiento de la dexametasona en el edema cerebral?
Seleccione una:

- a. 40-100 mg.
- b. 1-6 mg/kg.
- c. 4-8 mg.
- d. 15-40 mg.

Pregunta 47

190.- ¿En cuál de las siguientes enfermedades hay que tener precaución en la administración de pantoprazol?
Seleccione una:

- a. Enfermedad renal.
- b. Taquicardia.
- c. Hemorragia digestiva.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 48

191.- ¿Cuál es la dosis máxima de administración de piridoxina con levodopa?
Seleccione una:

- a. 1 mg/d.
- b. 20 mg/d.
- c. 5 mg/d.
- d. 2 mg/d.

Pregunta 49

108.- ¿Cuál es la dosis media o de mantenimiento de la amiodarona en las arritmias?
Seleccione una:

- a. 150 mg.
- b. 200 mg.

- c. **300 mg.**
- d. 500 mg.

Pregunta 50

153.- ¿Por qué no se debe administrar conjuntamente Glucosa con sangre?

Seleccione una:

- a. Por aumentar el volumen de la sangre.
- b. Por disminuir el volumen de la sangre.
- c. **Riesgo de hemólisis.**
- d. Todas son falsas.

Pregunta 51

136.- Hay que tener precaución en la utilización del diltiazem en:

Seleccione una:

- a. **Tratamientos con betabloqueantes.**
- b. Bloqueo AV sin marcapasos.
- c. Enfermedad del seno.
- d. Hipotensión.

Pregunta 52

170.- Uno de los problemas que se produce en el manitol es la cristalización ¿qué haríamos?

Seleccione una:

- a. Sumergirlo en agua fría.
- b. Infundirlo de todas maneras.
- c. **Sumergirlo en agua caliente.**
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 53

192.- ¿Qué fármaco se utiliza en la intoxicación por insecticidas organofosforados?

Seleccione una:

- a. Cloruro potásico.
- b. **Pralidoxima.**
- c. Poligelina.
- d. Procainamida.

Pregunta 54

161.- ¿Cuál es la indicación del Isohes® al 6 %?

Seleccione una:

- a. **Expansión de volumen.**
- b. Disminución del dolor.
- c. Disminución del volumen.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 55

152.- ¿Qué efecto secundario no se produce si se inyecta rápidamente el glucagón?

Seleccione una:

- a. HTA.
- b. Náuseas.
- c. Vómitos.
- d. **Hipoglucemias.**

Pregunta 56

146.- ¿Qué tipo de dolor es indicación de la utilización del fentanilo?

Seleccione una:

- a. Leve.
- b. Moderado.
- c. Severo.
- d. **B y c son verdaderas.**

Pregunta 57

171.- ¿Cuál es el antídoto de la Dolantina®?

Seleccione una:

- a. Flumacenilo.
- b. Benerva.
- c. Glucosa.
- d. **Naloxona.**

Pregunta 58

210.- El methergin tiene como categoría farmacológica según la FDA:

Seleccione una:

- a. B.
- b. **C.**

- c. D.
- d. X.

Pregunta 59

186.- ¿Qué problema genera el omeprazol si se administra de manera rápida?

Seleccione una:

- a. Vómitos.
- b. Insuficiencia renal.
- c. **Alteraciones visuales.**
- d. Insuficiencia hepática.

Pregunta 60

158.- ¿Cuál de las siguientes es una indicación de uso en urgencias del Hidrapres®?

Seleccione una:

- a. Crisis hipertensiva.
- b. Eclampsia.
- c. Preeclampsia.
- d. **Todas son verdaderas.**

Pregunta 61

184.- ¿Cuál de los siguientes fármacos es necesario utilizarlo con bomba de perfusión?

Seleccione una:

- a. Neostigmina.
- b. Naloxona.
- c. **Nitroprusiato sódico.**
- d. N-acetilcisteína.

Pregunta 62

114.- ¿Cuál es la dosis máxima de atropina que se debe administrar en una PCR?

Seleccione una:

- a. 1 mg.
- b. 2 mg.
- c. **3 mg.**
- d. 4 mg.

Pregunta 63

118.- ¿Cuál de los siguientes fármacos se deben mantener protegido de la luz?
Seleccione una:

- a. Bicarbonato sódico.
- b. Biperideno.**
- c. Bretilio.
- d. Bromuro butilescolamina.

Pregunta 64

145.- La dosis inicial del fentanilo se administra de manera:
Seleccione una:

- a. IM.
- b. IV en perfusión.
- c. IVD.**
- d. Rectal.

Pregunta 65

143.- ¿Qué dosis de fenobarbital provoca hipnosis?
Seleccione una:

- a. 100-320 mg.**
- b. 50-100 mg.
- c. 25-50 mg.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 66

141.- Si estamos administrando estreptoquinasa ¿cuándo suspenderíamos la infusión?
Seleccione una:

- a. Si aparece cefalea.
- b. Si aparece hemorragia.**
- c. Si aparece dolor abdominal.
- d. No se debe suspender nunca.

Pregunta 67

110.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización del atenolol?
Seleccione una:

- a. TSVP.**
- b. Hipotensión.

- c. Vómitos.
- d. Coma hiperglucémico.

Pregunta 68

201.- ¿Cuál de las siguientes es una indicación de la utilización del Dogmatil®?
Seleccione una:

- a. Estados psicóticos agudos.
- b. Úlcera gastroduodenal.
- c. Vértigo.
- d. Todas son verdaderas.**

Pregunta 69

185.- De los siguientes casos ¿cuándo es necesario la administración de noradrenalina?
Seleccione una:

- a. TAS menor de 100 mmHg.
- b. TAS menor de 90 mmHg.
- c. TAS menor de 80 mmHg.
- d. TAS menor de 70 mmHg.**

Pregunta 70

182.- ¿Cuál de los siguientes no es un efecto secundario de la neostigmina?
Seleccione una:

- a. Disminución de las secreciones.**
- b. Bradicardia.
- c. Broncoespasmo.
- d. Vómitos.

Pregunta 71

123.- ¿Cuándo está contraindicado la utilización del besilato de cisatracurio?
Seleccione una:

- a. Insuficiencia cardíaca.
- b. Dolor abdominal.
- c. Miastenia gravis.**
- d. Todas son falsas.

Pregunta 72

121.- ¿Cuál de los siguientes fármacos es necesario una monitorización constante?
Seleccione una:

- a. Glucobinato cálcico.
- b. Cloruro cálcico.
- c. Besilato cisatracurio.
- d. Todas son verdaderas. ¿?

Pregunta 73

106.- ¿Cuál es el principio activo del Caproamin Fides®?
Seleccione una:

- a. Amiodarona.
- b. **Ácido aminocaproico.**
- c. Amrinona.
- d. Atenolol.

Pregunta 74

204.- La vía de elección que se recomienda para la administración de la tiamina es:
Seleccione una:

- a. Oral.
- b. IV.
- c. **IM.**
- d. Rectal.

Pregunta 75

151.- ¿Cuál es la dosis máxima de furosemida?
Seleccione una:

- a. 100 mg/día.
- b. 200 mg/día.
- c. **500 mg/día.**
- d. mg/día.

Pregunta 76

169.- ¿Cuál es la dosis endotraqueal de la lidocaina?
Seleccione una:

- a. 1-4 mg/kg.
- b. **1-1,5 mg/kg.**

- c. 1-8 mg/kg.
- d. 0,5-1 mg/kg.

Pregunta 77

177.- ¿Cuál es el antídoto del midazolam?

Seleccione una:

- a. Atropina.
- b. Naloxona.
- c. Pralidoxima.
- d. Flumazenilo.

Pregunta 78

126.- ¿Qué tipo de solución se utiliza para la administrar la clorpromazina?

Seleccione una:

- a. Glucosado.
- b. Fisiológico.
- c. Fisiológico de cristal.
- d. Glucosado de cristal.

Pregunta 79

109.- ¿Cuáles de los siguientes son efectos secundarios de la amrinona?

Seleccione una:

- a. Arritmias.
- b. Hipotensión.
- c. Náuseas y vómitos.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 80

200.- Cuando se utiliza el Somiaton® en que enfermedades hay que tener precauciones:

Seleccione una:

- a. HTA.
- b. Diabetes.
- c. Hipercolesterolemia.
- d. Hemorragia digestiva alta.

Pregunta 81

119.- El bretilio es un:
Seleccione una:

- a. Anticolinérgico.
- b. Antiespasmódico.
- c. **Antiarrítmico.**
- d. Miorrelajante.

Pregunta 82

112.- ¿Cuál es la dosis de inicio del Tracrium®?
Seleccione una:

- a. 0,1-0,2 mg/kg.
- b. **0,3-0,6 mg/kg.**
- c. 0,7-0,9 mg/kg.
- d. 0,03-0,006 mg/kg.

Pregunta 83

135.- La dosis de digoxina en arritmias auriculares es de:
Seleccione una:

- a. 0,10-0,20 mg.
- b. **0,25-0,50 mg.**
- c. 0.5-0,75 mg.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 84

116.- ¿Cuál de las siguientes es una indicación de utilización del bicarbonato sódico?
Seleccione una:

- a. Intoxicación por antidepresivos tricíclicos.
- b. PCR prolongada en paciente intubado.
- c. Hiperpotasemia.
- d. **Todas son verdaderas.**

Pregunta 85

138.- ¿Cuál es la dosis de dopamina que produce acción beta adrenérgica?
Seleccione una:

- a. 2-4 µg/kg/min.
- b. **5-10 µg/kg/min.**

- c. 10-20 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$.
- d. 20 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$.

Pregunta 86

129.- El Polaramine® es un antihistamínico que se utiliza para:
Seleccione una:

- a. **Reacciones anafilácticas.**
- b. Situación de flujo sanguíneo reducido.
- c. Vómitos.
- d. Hipotensión.

Pregunta 87

122.- ¿En que patología se debe administrar con precaución el glucobinato cálcico?
Seleccione una:

- a. FV.
- b. **Insuficiencia renal.**
- c. Hipercalcemia.
- d. Intoxicación digitálica.

Pregunta 88

101.- ¿Cuáles de las siguientes opciones es una contraindicación en la administración del acetilsalicilato de lisina?
Seleccione una:

- a. IAM.
- b. Bloqueo AV de 2º grado.
- c. **Cirrosis hepática.**
- d. Cefalea.

Pregunta 89

193.- Cuando se esté administrando propafenona y el complejo QRS se ensancha en más de un 20%
¿qué deberíamos hacer?
Seleccione una:

- a. Aumentar la dosis.
- b. Es normal no hay que hacer nada.
- c. **Disminuir o suspender el fármaco.**
- d. Todas son falsas.

Pregunta 90

167.- El Sinogan® se aconseja que se administre por vía:
Seleccione una:

- a. IV.
- b. IM.
- c. Oral.
- d. Rectal.

Pregunta 91

113.- ¿Cuál es el antídoto de la atropina?
Seleccione una:

- a. Naloxona.
- b. Fisostigmina.
- c. Amiodarona.
- d. Flumaceniilo.

Pregunta 92

209.- El sulfato de magnesio tiene como categoría farmacológica según la FDA:
Seleccione una:

- a. B.
- b. A.
- c. D.
- d. X.

Pregunta 93

181.- ¿Cuál es la dosis máxima de la naloxona?
Seleccione una:

- a. 0,4 mg.
- b. 16 mg.
- c. 10 mg.
- d. 5 mg.

Pregunta 94

162.- En una hiperglucemia ¿cuál es la dosis de mantenimiento de la insulina?
Seleccione una:

- a. 0,1 UI/kg/h.
- b. 0,2 UI/kg/h.

- c. 0,3 UI/kg/h.
- d. 0,4 UI/kg/h.

Pregunta 95

120.- ¿Cuál de los siguientes no es una contraindicación de la Buscapina®?

Seleccione una:

- a. Midriasis.
- b. Sequedad de boca.
- c. Miosis.
- d. Taquicardia.

Pregunta 96

183.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización de la nitroglicerina?

Seleccione una:

- a. EAP.
- b. IC.
- c. Hipertensión pulmonar.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 97

195.- ¿Cuál es la dosis inicial del propofol para conseguir sedación?

Seleccione una:

- a. 0,25-1 mg/kg.
- b. 1-1,25 mg/kg.
- c. 2 mg/kg.
- d. 0,15-0,25 mg/kg.

Pregunta 98

203.- ¿Cuál es la dosis de mantenimiento de la Eufilina® en adultos fumadores?

Seleccione una:

- a. 0,1 mg/kg/h.
- b. 0,8 mg/kg/h.
- c. 0,2 mg/kg/h.
- d. 0,4 mg/kg/h.

Pregunta 99

104.- El Actilyse® es un:
Seleccione una:

- a. Simpaticomimético.
- b. Fibrinolítico.**
- c. Antifibrinolítico.
- d. Miorrelajante.

Pregunta 100

176.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización del metoprolol?
Seleccione una:

- a. Angor.
- b. HTA.
- c. IAM.
- d. Todas son verdaderas.**

Pregunta 101

175.- A partir de que dosis es necesario la dilución del Primperan®:
Seleccione una:

- a. 1 mg.
- b. 10 mg.**
- c. 20 mg.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 102

130.- ¿Cuándo habría que suspender la solución de dextrano?
Seleccione una:

- a. Hipertensión.
- b. Dolor abdominal.
- c. Hipotensión.**
- d. Cefalea.

Pregunta 103

105.- ¿Cuáles de las siguientes son contraindicaciones para la administración de Alteplasa?
Seleccione una:

- a. ACVA.
- b. Postparto o aborto inmediato.**

- c. RCP traumática.
- d. Todas son verdaderas.**

Pregunta 104

149.- ¿Cuál de los siguientes no es un efecto secundario del Apocard®?

Seleccione una:

- a. Bradicardia.
- b. Cefalea.
- c. Taquicardias auriculares.**
- d. Visión borrosa.

Pregunta 105

155.- ¿Cuál es el efecto secundario que se puede producir con una solución glucosalina?

Seleccione una:

- a. HTA.
- b. Náuseas.
- c. Hiperglucemia.**
- d. Taquicardia.

Pregunta 106

199.- ¿Cuál es la dosis media a preparar de Ventolin®?

Seleccione una:

- a. 2 ampollas + 49 ml.
- b. 5 ampollas + 100 ml.
- c. 0,5 mg + 49 ml.**
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 107

196.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización de la protamina?

Seleccione una:

- a. Sobredosis de cocaína.
- b. Sobredosis de heparina.**
- c. Sobredosis de barbitúricos.
- d. Sobredosis de opiáceos.

Pregunta 108

139.- ¿Cuáles de las siguientes es una indicación de urgencia para la utilización del enalaprilato?
Seleccione una:

- a. EAP.
- b. HTA.
- c. IC.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 109

154.- ¿Cuál es la velocidad máxima de infusión de una solución glucosada al 10%?
Seleccione una:

- a. 100 ml/h.
- b. 700 ml/h.
- c. 350 ml/h.
- d. 150 ml/h.

Pregunta 110

188.- ¿Cuál es el ritmo de infusión de la oxitocina?
Seleccione una:

- a. 45-80 mUI.
- b. 85-90 mUI.
- c. 20-40 mUI.
- d. 5-10 mUI.