

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes signos nos indican que el paciente con pancreatitis aguda sufre complicación de la patología?:

Seleccione una:

- a. Hipocalcemia
- b. Hiperglucemia
- c. Ictericia.

d. Todos. ✓

Retroalimentación

Todos los anteriores son posibles.

La respuesta correcta es: Todos.

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El término enfermedad inflamatoria intestinal (EII) incluye dos trastornos, ¿cuáles son?:

Seleccione una:

a. Enfermedad de Crohn y pancreatitis.

b. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ✓

c. Colitis ulcerosa y pancreatitis

d. Pancreatitis y colitis.

Retroalimentación

El término enfermedad inflamatoria intestinal incluye dos trastornos de etiología desconocida, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la cantidad máxima recomendada de fibra al día?:

Seleccione una:

a. 100 gr/día.

b. 10 gr/día.

c. 50 gr/día. ✓

d. 20 gr/día.

Retroalimentación

La dosis diaria recomendada es de 20 a 35 g por día; el máximo gira en torno a los 50 gr/día.

La respuesta correcta es: 50 gr/día.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los síntomas: diarrea malabsortiva, vómitos, cambios de carácter, falta de apetito, estacionamiento de la curva de peso y retraso del crecimiento, hacen sospechar de...

Seleccione una:

a. Celiaquía. ✓

## Rutas de cuidados al paciente adulto en situaciones comunes de hospitalización

b. Pancreatitis.

c. Hepatitis.

d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

Esta clínica nos hace sospechar de celiaquía.

La respuesta correcta es: Celiaquía.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La pérdida de la volemia entre 15 a 30% (750 a 1500 cc.) nos permite clasificar una hemorragia como...

Seleccione una:

a. Masiva.

b. Grave.

c. Leve

d. Moderada. ✓

Retroalimentación

Grado II o moderada: La pérdida de la volemia está entre 15 a 30% (750 a 1500 cc.).

La respuesta correcta es: Moderada.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si a nuestro paciente se le va a realizar una CPRE, ¿Cuáles serán los cuidados de enfermería previos a la prueba?:

Seleccione una:

a. Analítica completa en ayunas

b. Asegurar que en la historia se encuentra el consentimiento informado firmado

c. Canalizar una vía periférica.

d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Los cuidados de enfermería previos a la prueba son: una analítica completa en ayunas, consentimiento informado firmado y una canalizar una vía periférica.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

### Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuándo se le realizará a un paciente con pancreatitis aguda el TAC para la confirmación de la gravedad del cuadro? :

Seleccione una:

a. Antes de las 72 h desde el inicio de los síntomas ✗

b. Después de las 72 horas desde el inicio de los síntomas.

c. Después de las 72 h desde el comienzo del tratamiento.

d. Después de las 72 desde que ha cesado el dolor.

Retroalimentación

El TAC tiene un papel fundamental en la confirmación de la gravedad de una pancreatitis aguda, debe realizarse con contraste y no antes de las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas ya que podría subestimar la gravedad de la pancreatitis.

La respuesta correcta es: Después de las 72 horas desde el inicio de los síntomas.

### Pregunta 8

Correcta

## Recuperación y caso práctico módulo 4

### Rutas de cuidados al paciente adulto en situaciones comunes de hospitalización

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La pérdida de sangre con el vómito se denomina:

Seleccione una:

- a. Enterorragia.
- b. Hematoquecia.
- c. Hematemesis. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

Pérdida de sangre con el vómito se denomina hematemesis.

La respuesta correcta es: Hematemesis.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En qué porcentaje suele aparecer la anemia ferropénica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal?:

Seleccione una:

- a. En un 100%.
- b. En un 10 %
- c. En una 20%
- d. En un 50% ✓

Retroalimentación

Existe anemia ferropénica en el 50% de los pacientes.

La respuesta correcta es: En un 50%

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes alimentos; ¿Cuál puede comer un paciente celiaco?:

Seleccione una:

- a. Trigo
- b. Soja. ✓
- c. Avena
- d. Centeno.

Retroalimentación

Solo puede comer soja los demás alimentos contienen gluten.

La respuesta correcta es: Soja.

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las alteraciones bioquímicas y hematológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal depende de:

Seleccione una:

- a. Actividad inflamatoria.
- b. Trastornos de absorción.
- c. Pérdidas intestinales.
- d. Todas las anteriores. ✓

## Recuperación y caso práctico módulo 4

### Rutas de cuidados al paciente adulto en situaciones comunes de hospitalización

#### Retroalimentación

Las alteraciones hematológicas y bioquímicas dependen de la actividad inflamatoria, de los trastornos de absorción y de las pérdidas intestinales.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

#### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la prueba de oro para el diagnóstico de celiaquía?

Seleccione una:

a. La biopsia duodenal o yeyunal. ✓

b. Marcadores serológicos.

c. Estudio genético.

d. Ninguno de los anteriores.

#### Retroalimentación

El diagnóstico de la celiaquía se basa en: los marcadores serológicos y estudio genético pero la prueba de oro es la biopsia del duodeno proximal o del yeyuno

La respuesta correcta es: La biopsia duodenal o yeyunal.

#### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los cálculos biliares pueden ser de tres tipos atendiendo a su composición

Seleccione una:

a. De colesterol que son radiopacos

b. Pigmentarios negros, también son radiopacos.

c. Pigmentarios marrones que son radiolúcidos.

d. Todas las opciones son correctas. ✓

#### Retroalimentación

Los cálculos biliares pueden ser de tres tipos atendiendo a su composición: de colesterol, son los más frecuentes y son radiopacos), pigmentarios negros (consistencia dura y radiopacos) y pigmentarios marrones (radiolúcidos).

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

#### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Uno de los signos que podemos observar en la pancreatitis es la coloración azul-rojizo-violácea o marrón verdosa de los ?ancos, que se produce debido al catabolismo tisular de la hemoglobina. ¿Cómo se denomina este signo?:

Seleccione una:

a. Signo de Turner ✓

b. Signo pancreático difuso.

c. Signo pancreático idiopático.

d. Todas son falsas.

#### Retroalimentación

El signo de Turner es la coloración azul-rojizo-violácea o marrón verdosa de los ?ancos, debido al catabolismo tisular de la hemoglobina, puede aparecer en la pancreatitis.

La respuesta correcta es: Signo de Turner

#### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes síntomas presentará un paciente que ha sido diagnosticado de cáncer pancreático?:

Seleccione una:

- a. Ictericia.
- b. Dolor.
- c. Obstrucción gastrointestinal.
- d. Posiblemente presente todas las anteriores. ✓

Retroalimentación

El cáncer exocrino puede presentar todo lo anterior.

La respuesta correcta es: Posiblemente presente todas las anteriores.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes consideras que es un objetivo principal de enfermería para el diagnosticado de pancreatitis?:

Seleccione una:

- a. Mantenimiento del control del dolor. ✓
- b. Que el paciente ingiera alimento cuanto antes.
- c. Controlar el riesgo de infección.
- d. Regulación intestinal.

Retroalimentación

La pancreatitis es una patología muy dolorosa, por lo que el principal objetivo a conseguir en primera instancia es el control del dolor.

La respuesta correcta es: Mantenimiento del control del dolor.

**Pregunta 17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento del estreñimiento de tránsito lento o normal incluye:

Seleccione una:

- a. Laxantes formadores de bolo fecal. ✗
- b. Los laxantes.
- c. Enemas.
- d. Todos los anteriores.

Retroalimentación

El tratamiento del estreñimiento de tránsito lento o normal incluye los laxantes formadores de bolo fecal, los laxantes y los enemas.

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el síntoma principal de la Acalasia?

Seleccione una:

- a. Ardor en el pecho.
- b. Digestión pesada.
- c. Sensación de detención del alimento en la mitad del pecho. ✓
- d. Todos los anteriores.

Retroalimentación

El síntoma fundamental es la sensación de detención del alimento en la mitad del pecho

## Recuperación y caso práctico módulo 4

### Rutas de cuidados al paciente adulto en situaciones comunes de hospitalización

La respuesta correcta es: Sensación de detención del alimento en la mitad del pecho.

#### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué se puede observar en la evolución de la Acalasia?:

Seleccione una:

- a. Dilatación del esófago. ✓
- b. Dilatación del estómago.
- c. Estrechamiento del estómago.
- d. Estrechamiento del cardias.

Retroalimentación

En la evolución de esta patología se puede observar una dilatación del esófago en el que se puede albergar incluso 1 litro de contenido.

La respuesta correcta es: Dilatación del esófago.

#### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La hepatitis B o sérica se contagia por...Señala la opción FALSA

Seleccione una:

- a. Al compartir jeringuillas contaminadas con la sangre de una persona infectada durante el consumo de algún tipo de droga.
- b. La madre puede contagiar al bebé durante el parto pero nunca durante la lactancia. ✓
- c. Al compartir utensilios de higiene personal como maquinillas de afeitarse o cepillos de dientes.
- d. Al recibir una transfusión de sangre contaminada.

Retroalimentación

La madre puede contagiar al bebé durante el parto o durante la lactancia.

La respuesta correcta es: La madre puede contagiar al bebé durante el parto pero nunca durante la lactancia.

## Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Aldara de 45 años acude a urgencias a las 18 h por vómitos desde esta mañana con hilos sangre. Antes de salir de casa realiza una deposición abundante de aspecto muy oscuro y olor muy fuerte. Niega tener hemorroides

Malestar general. No síncope previo

AP: Diabetes Mellitus tipo 2. No Alergias conocidas. No fuma. Bebe alcohol muy ocasionalmente

No refiere AP de interés a nivel gastrointestinal.

TTO habitual: Metformina ½ comp en la mañana. Ocasionalmente toma AINES por migraña idiopática

Otros: Se define como persona muy estresada.

Exploración en urgencias:

TA 95-62 mmHg. FC 120 lpm. Frec Resp: 19 rpm. Sat 98%. Tª: 35,6 °C. Peso: 70kg.

Extraemos analítica con bioquímica, hemograma y coagulación.

Juicio clínico: Hemorragia digestiva.

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes actuaciones de enfermería no realizarías a Aldara?:

## Recuperación y caso práctico módulo 4

### Rutas de cuidados al paciente adulto en situaciones comunes de hospitalización

Seleccione una:

- a. Cruzar y reservar concentrados de hematíes.
- b. Colocar sonda nasogástrica y comenzar con lavados gástricos.
- c. Canalizar vía venosa del calibre 20F. ✓
- d. Realizar electrocardiograma.

Retroalimentación

Se canalizarían al menos dos vías venosas del mayor calibre posible (14 F o 16 F), por lo que el calibre 18F es demasiado pequeño y no sería útil para infundir líquidos a velocidad rápida.

La respuesta correcta es: Canalizar vía venosa del calibre 20F.

#### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indica la opción correcta de las siguientes afirmaciones sobre hemorragia digestiva:

Seleccione una:

- a. HDA tiene una forma de presentación y evolución clínica más severa que la HDB. ✓
- b. La HDB es una de las urgencias médicas más frecuentes.
- c. La HDA no requiere hospitalización.
- d. La hemorragia digestiva se presenta solo como melenas.

Retroalimentación

La HDA es una de las urgencias médicas que más frecuentemente y requiere hospitalización. En general las hemorragias digestivas tienen diferentes formas de presentación.

La respuesta correcta es: HDA tiene una forma de presentación y evolución clínica más severa que la HDB.

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál sería una de las causas más frecuente de la HDA?:

Seleccione una:

- a. Úlcera gástrica. ✓
- b. Divertículo de Merkel
- c. Enfermedad inflamatoria intestinal.
- d. Pólipos en colon.

Retroalimentación

El origen gastroduodenal es el más frecuente.

La respuesta correcta es: úlcera gástrica.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando existe un descenso de la volemia de un 25-35% ¿Ante qué tipo de hemorragia estamos?:

Seleccione una:

- a. Leve
- b. Moderada.
- c. Grave. ✓
- d. Muy grave.

Retroalimentación

Sería una hemorragia de tipo grave.

La respuesta correcta es: Grave.

#### Información

Marcar pregunta

**Rutas de cuidados al paciente adulto en situaciones comunes de hospitalización**

Texto informativo

Se programa el ingreso de la paciente en la unidad de digestivo, para poder hacer un estudio en profundidad de la patología en curso. A partir de entonces se plantean las siguientes cuestiones.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A nuestra paciente se le realizarán una serie de pruebas, pero de ellas ¿cuál es la prueba de mayor sensibilidad y especificidad para la HDA?:

Seleccione una:

a. Rectoscopia.

b. Gastroscofia. ✓

c. Conoloscofia

d. Cualquiera de las anteriores.

Retroalimentación

Esta prueba tiene una gran sensibilidad y especificidad para la localización de las lesiones causantes de la HDA y establecer el pronóstico

La respuesta correcta es: Gastroscofia.