

<b>Comenzado el Estado</b>	miércoles, 17 de julio de 2019, 00:02 Finalizado
<b>Finalizado en</b>	miércoles, 17 de julio de 2019, 00:04
<b>Tiempo empleado</b>	1 minutos 20 segundos
<b>Puntos Calificación</b>	5,00/5,00 <b>10,00</b> de un máximo de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

#### Información

Marcar pregunta

#### Texto informativo

Paciente de 46 años que ingresa en planta procedente de urgencias por litiasis en uréter derecho. AP: HTA, DL. IQ: Neferectomía radical izquierda hace 15 años por hidronefrosis. Constantes: TA: 165/90 mm Hg, FC: 122, Tª: 37,7°C. Datos analíticos a destacar: creatinina: 6mgr/dl. Dolor escala EVA: 6

#### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Debido a la creatitina del paciente, se diagnóstica una insuficiencia renal aguda (IRA)¿Qué tipo de IRA es?

Seleccione una:



a. IRA pre renal



b. IRA parenquimatosa



c. IRA intra-renal



d. IRA obstructiva ✓

#### Retroalimentación

Se trata de una IRA obstructiva o posterior. La causa por la que el riñón no funciona de forma adecuada se debe a la litiasis en uréter que no permite el correcto paso de la orina desde el riñón a la vejiga.

#### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El paciente fue intervenido de una nefrectomía hace 15 años. ¿Qué es una nefrectomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Se trata de una derivación urinaria desde la pelvis renal al exterior
- ☐ b. Se trata de una intervención denominada BRICKER
- ☒ c. Es la extirpación de un riñón ✓
- ☐ d. Es la derivación de vejiga a piel, también conocido como talla vesical.

Retroalimentación

Se trata de la extirpación del riñón

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La causa de la nefrectomía fue una hidronefrosis. ¿Qué es una hidronefrosis?

Seleccione una:

- ☐ a. Se trata de un acumulo de líquidos en vejiga
- ☒ b. Es una dilatación de la pelvis renal debido a una obstrucción que impide un correcto vaciamiento de orina ✓
- ☐ c. Es una IRA provocada por hipovolemia
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

Es la dilatación de la pelvis renal debido a una obstrucción que impide el correcto vaciamiento de orina desde el riñón a vejiga.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes cuidados, ¿cuáles consideras esenciales en nuestro paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Toma de constantes
- ☐ b. Control del dolor
- ☐ c. Control de diuresis
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

Todos los cuidados que se enuncian son importantes en este tipo de pacientes

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se diagnostica que la litiasis está provocada por oxalato cálcico. ¿Qué tipo de alimentos deberá eliminar de su dieta nuestro paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Café
- ☐ b. Té
- ☐ c. Legumbres
- ☒ d. Todos son alimentos desaconsejados en litiasis de oxalato cálcico ✓

Retroalimentación

Todos los enunciados son desaconsejados en litiasis por oxalato cálcico

<b>Comenzado el</b>	lunes, 8 de julio de 2019, 22:22
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	lunes, 8 de julio de 2019, 22:49
<b>Tiempo empleado</b>	26 minutos 57 segundos
<b>Puntos</b>	19,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>9,50</b> de un máximo de 10,00 ( <b>95%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué significa disuria?

Seleccione una:

- ☐ a. Diuresis abundante
- ☐ b. Diuresis escasa
- ☒ c. Dolor al orinar ✓
- ☐ d. Hematuria

Retroalimentación

La disuria hace referencia al dolor al orinar

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los alimentos no recomendados en litiasis son:

Seleccione una:

- ☐ a. Leche
- ☐ b. Café
- ☐ c. Verdura de hoja ancha
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

Todos son alimentos desaconsejados en litiasis renales.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes intervenciones, ¿cuáles se utilizan para extirpar la próstata?

Seleccione una:

- ☐ a. RTU de próstata
- ☐ b. Adenomectomía tipo Millin
- ☐ c. Prostatectomía radical
- ☒ d. Todas son intervenciones para extirpación de próstata ✓

Retroalimentación

Todas las enunciadas son intervenciones de próstata

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente portador de una FAV es cierto que...

Seleccione una:

- ☐ a. No se debe tomar TA en el brazo de la FAV
- ☐ b. No se debe utilizar la FAV como acceso venoso para la administración de medicación
- ☐ c. Si una FAV sangra, no se debe hacer un torniquete
- ☒ d. Todos los enunciados son ciertos. ✓

Retroalimentación

Todos los enunciados son ciertos

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El conducto que comunica el riñón con la vejiga se llama....

Seleccione una:

- ☐ a. Uretra
- ☐ b. Nefrona
- ☒ c. Uréter ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

### Retroalimentación

El conducto que comunica riñón con vejiga es el ureter

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Se considera hiperpotasemia a niveles de potasio:

Seleccione una:

- ☒ a. mayor que 5 mEq/l ✓
- ☐ b. menor que 3 mEq/ l
- ☐ c. mayor que 10mEq/l
- ☐ d. mayor que 7mEq/l

### Retroalimentación

Una hiperpotasemia se considera a niveles de potasio por encima de 5 mEq/l

#### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Se considera hipernatremia...

Seleccione una:

- ☐ a. Valores de calcio por encima de 145 mEq/L.
- ☐ b. Valores de potasio menores a 5 mEq/L
- ☒ c. Valores de sodio por encima de 145 mEq/L ✓
- ☐ d. Diuresis menor de 500cc en el turno.

### Retroalimentación

Hipernatremia son valores de sodio por encima de 145 mEq/L.

#### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando hablamos de pielonefritis, nos referimos a una infección de vías urinarias:

Seleccione una:

- ☐ a. Vías urinarias bajas
- ☐ b. Vías urinarias medias
- ☒ c. Vías urinarias altas ✓
- ☐ d. Pielonefritis se refiere a la infección de todas las vías urinarias en su conjunto.

Retroalimentación

Pielonefritis se refiere a la afectación del parenquima renal, por lo que se considera vías urinarias altas.

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La litotricia se utiliza para tratar...

Seleccione una:

- ☐ a. Sondajes vesicales complicados
- ☒ b. Cálculos renales ✓
- ☐ c. Tumores prostáticos
- ☐ d. Infección de vías urinarias bajas

Retroalimentación

Es una técnica que se utiliza para tratar los cálculos renales.

**Pregunta 10**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Anatomicamente el riñón derecho está situado mas bajo que el izquierdo. **X**
- ☐ b. Los riñones se alojan en la cavidad retroperitoneal
- ☐ c. Los riñones son un órgano par con forma de alubia.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Todos los enunciado son correctos

### Pregunta 11

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si realizamos un corte sagital del riñón, podemos diferenciar todas sus estructuras desde la parte mas externa hasta la parte mas interna del órgano en el siguiente orden:

Seleccione una:

- ☐ a. Corteza- cápsula-médula
- ☒ b. Cápsula-corteza-médula **✓**
- ☐ c. Médula-cápsula-corteza
- ☐ d. Cápsula-médula-corteza

Retroalimentación

La parte mas superficial es la cápsula, seguida de la corteza y la parte mas interna se denomina médula

### Pregunta 12

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con insuficiencia renal crónica, deberemos educarle para que identifique los signos y/o síntomas por los cuales debe acudir a su médico. Los principales signos de alarma son:

Seleccione una:

- ☐ a. Tensión arterial elevada
- ☐ b. Edemas





c. Disnea



d. Todas son correctas. ✓

#### Retroalimentación

Aumento de la TA, edemas, disnea, disminución de la cantidad de orina emitida al día... todos son signos de alarma en un paciente que padece insuficiencia renal crónica.

#### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Cuando inspeccionando a un paciente encontramos, masa en hipogastrio con dolor a la palpación y que despierta deseos miccionales, nos encontramos ante:

Seleccione una:



a. Una gastritis



b. Son signos de infección importante



c. Globo vesical ✓



d. Cálculo renal.

#### Retroalimentación

Son signos de presencia de globo vesical en una retención de orina aguda.

#### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Estamos valorando a un paciente con sospecha de infección urinaria. Refiere dolor en zona suprapúbica. La localización del dolor, nos llevará a pensar en:

Seleccione una:



a. ITU alta



b. ITU baja ✓



c. Infección del parenquima renal



d. Tumoración renal.

#### Retroalimentación

Esa localización del dolor nos lleva a pensar en ITU baja

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué se considera oliguria?

Seleccione una:

- ☐ a. Diuresis menos de 1000cc en el turno
- ☐ b. Diuresis mayor de 1000cc en el turno
- ☒ c. Diuresis menos de 500 cc en 24 horas ✓
- ☐ d. Oliguria quiere decir que no hay orina en 24 horas.

Retroalimentación

Oliguria se considera menos de 500 cc de diuresis en 24 horas.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, el tratamiento de elección será:

Seleccione una:

- ☐ a. Diálisis peritoneal
- ☐ b. Trasplante renal
- ☐ c. Hemodiálisis
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

En este estadio de la enfermedad, el único tratamiento se basa en sustitución de la función renal, bien mediante diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) o bien mediante trasplante renal.

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si tenemos una infección en el parenquima renal, hablamos de una...

Seleccione una:

- ☐ a. Cistitis
- ☐ b. Uretritis
- ☒ c. Pielonefritis ✓
- ☐ d. Prostatitis

Retroalimentación

Cuando la infección afecta al parenquima renal, se denomina pielonefritis.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un paciente diagnosticado de insuficiencia renal crónica terminal...señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Precisa sondaje vesical de forma continua
- ☐ b. Precisa hemodiálisis hasta recuperar su función renal.
- ☒ c. Precisa diálisis y/o trasplante renal ✓
- ☐ d. Precisa trasplante renal urgente

Retroalimentación

Precisa tratamiento con diálisis o bien ser trasplantado. El trasplante renal no se puede considerar urgente si el paciente puede recibir terapia de sustitución renal (hemodiálisis o diálisis peritoneal)

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes infecciones urinarias, ¿cuáles son consideradas de vías bajas?

Seleccione una:

- ☐ a. Cistitis
- ☐ b. Prostatitis
- ☐ c. Uretritis
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

Todas las ITU enunciadas hacen referencia a ITU bajas

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La evolución de la insuficiencia renal aguda se divide en 4 fases que son...

Seleccione una:

- ☐ a. Comienzo-Fase diurética-fase oligúrica-recuperación
- ☐ b. Comienzo-recuperación-fase diurética-fase oligúrica
- ☒ c. Comienzo- fase oligúrica-fase diurética-fase de recuperación. ✓
- ☐ d. Fase diurética- recuperación-fase oligúrica-comienzo

Retroalimentación

Las fases son: comienzo- fase oligúrica-fase diurética-recuperación.