

Curso FUDEN cuidados al paciente con intoxicación químicas, medicamentosas y étlicas

1 . Cómo se llama la técnica de depuración extrarrenal en la que la sangre pasa por un filtro que contiene un material adsorbente que generalmente es carbón activado?

☐ Ob. Hemoperfusión. ✓

2 ¿Cuáles son las medidas a realizar ante un caso de ingesta de cáusticos?

☐ Od. Ninguna es correcta. ✓

3 ¿Cómo se llama la técnica de depuración extrarrenal útil en intoxicaciones por monóxido de carbono o sustancias metahemoglobinizantes?

☐ Oc. Exanguinotransfusión.

4 ¿Qué información debemos recopilar al realizar la anamnesis?

☐ Oa. Nombre y cantidad del tóxico.

☐ Ob. Vía de exposición.

☐ Oc. Tiempo transcurrido desde la exposición.

☐ Od. Todas son correctas. ✓

5 ¿Qué fármaco o solución no se utiliza en la diuresis forzada neutra?

☐ Ob. Bicarbonato. ✓

6Cuál de las siguientes sustancias no es adsorbible por el carbón activado?

☐ Oc. Etanol. ✓

7 ¿Qué signos y síntomas de los siguientes no encontramos en una intoxicación por benzodiazepinas?

☐ Ob. Hiperreflexia. ✓

8 ¿Qué tipo de información es importante recabar durante la anamnesis ante un caso de sospecha de intoxicación por setas?

☐ Oa. Tiempo transcurrido desde la ingesta hasta la aparición de la sintomatología.

☐ Ob. Síntoma predominante.

☐ Oc. Morfología de las setas.

☐ Od. Todas son correctas. ✓

9 ¿Cuál es el antídoto de la heparina?

☐ Oc. Protamina. ✓

10 ¿Cómo se puede prever la gravedad de un paciente intoxicado por salicilatos?

Ob. A través del Nomograma de Done. ✓

11 ¿Cuáles son los signos y síntomas de gravedad en una intoxicación aguda?

Oa. Arritmias.

Ob. Insuficiencia respiratoria.

Oc. Coma.

Od. Todas son correctas. ✓

12 ¿En qué fase se desarrolla el periodo de máxima hepatotoxicidad en una intoxicación por paracetamol?

Oc. Fase III. ✓

13 ¿Cuáles serían las actuaciones correctas que debemos realizar en la sala de clasificación ante una posible intoxicación?

Oa. Tomar las constantes vitales.

Ob. Identificar los signos y síntomas de gravedad.

Oc. Realizar una anamnesis completa.

Od. Todas son correctas. ✓

14 ¿Qué tipo de actuación no estaría indicada en caso de intoxicación por etilenglicol?

Ob. Administración de carbón activado. ✓

15 ¿Qué medidas adoptaremos en caso de que el contacto con el tóxico haya sido vía oftálmica?

Oc. Lavado conjuntival a baja presión y tapar con apósito el ojo afectado. ✓

16 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no aparece en caso de intoxicación aguda por neurolépticos?

Oc. Hipotermia. ✓

17 ¿Cuál es la dosificación correcta del carbón activado?

Oa. Dosis única de 50 g.

Ob. Dosis repetidas de 12'5 g/h.

Oc. Dosis repetidas de 50 g cada 4 horas.

Od. Todas son correctas. ✓

18 ¿En qué consiste la diuresis forzada alcalina?

Oc. Mantener pH urinario entre 7'5-8 y forzar la producción de orina a 5 ml/kg/h. ✓

19 ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye contraindicación para la realización de técnicas de descontaminación digestiva?

- ☐ a. Vía aérea no protegida.
- ☐ b. Cirugía abdominal reciente.
- ☐ c. Intoxicaciones leves.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

20 ¿Qué medida principal debemos tener en cuenta durante el manejo de un paciente con una intoxicación por paraquat para evitar acelerar la patología pulmonar?

- ☒ a. No administrar oxigenoterapia si $PaO_2 > 50$ mmHg. ✓