

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AS-AU-GNDTCAE](#) / [Módulo IV: Nutrición artificial](#)  
/ [Módulo IV : Nutrición artificial](#)

**Comenzado el** lunes, 20 de noviembre de 2017, 17:40

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** lunes, 20 de noviembre de 2017, 18:57

**Tiempo empleado** 1 hora 16 minutos

**Puntos** 21,00/25,00

**Calificación** 8,40 de 10,00 (84%)

**Comentario -** Buen trabajo - Continue con el curso

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Al administrar la medicación a través de una sonda enteral (señala la opción incorrecta).

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos administrar preferentemente formas líquidas.
- ☐ b. Las preparaciones con cubierta entérica no deben triturarse
- ☒ c. No mezclar con la fórmula nutricional. ✗
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de estos métodos no está indicado para la realización de gastrostomía en caso de achalasia.

Seleccione una:

- ☐ a. Gastrostomía radiológica percutánea (PRG)
- ☐ b. Gastrostomía quirúrgica.
- ☐ c. Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)
- ☒ d. Todas están indicadas. ✖

La respuesta correcta es: Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El control de la diuresis en el seguimiento de la NPD se incluye en:

Seleccione una:

- ☒ a. Cuidados clínicos básicos ✔
- ☐ b. Control de las vías de acceso enteral.
- ☐ c. Controles analíticos
- ☐ d. Controles nutricionales

La respuesta correcta es: Cuidados clínicos básicos

## Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En caso de administración continua de nutrición enteral (señala la opción correcta).

Seleccione una:

- ☒ a. Debe detenerse la administración durante el aseo. ✗
- ☐ b. Por regla general no debe administrarse agua mezclada con la fórmula nutricional
- ☐ c. Debe ser administrada con bomba de infusión.
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo está indicada una gastrostomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando va a recibir nutrición enteral durante más de 8 semanas.
- ☐ b. Cuando va a recibir nutrición enteral durante más de 10 semanas.
- ☐ c. Cuando va a recibir nutrición enteral durante más de 4 semanas.
- ☒ d. Cuando va a recibir nutrición enteral durante más de 6 semanas. ✓

La respuesta correcta es: Cuando va a recibir nutrición enteral durante más de 6 semanas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuál de los siguientes casos no está indicada la Nutrición Parenteral:

Seleccione una:

- ☐ a. Tolerancia oral limitada
- ☐ b. Cuando la vía enteral no es segura
- ☐ c. Periodo de ayuno superior a 14 días.
- ☒ d. Todas ellas son incorrectas ✓

La respuesta correcta es: Todas ellas son incorrectas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una complicación relacionada con la sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones esofágicas
- ☒ b. Otitis media ✓
- ☐ c. Colocación intrabronquial
- ☐ d. Lesiones nasales

La respuesta correcta es: Otitis media

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se debe detener la nutrición enteral continua (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☒ a. Durante la noche. ✓
- ☐ b. Durante los cambios posturales.
- ☐ c. Durante el aseo.
- ☐ d. Durante la movilización.

La respuesta correcta es: Durante la noche.

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la administración de nutrición enteral intermitente (señala la respuesta correcta).

Seleccione una:

- ☐ a. Puede utilizarse en la administración en intestino.
- ☒ b. Puede administrarse con jeringa ✓
- ☐ c. No produce elevados residuos gástricos.
- ☐ d. No es la forma más fisiológica.

La respuesta correcta es: Puede administrarse con jeringa


Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Es contraindicación relativa de la nutrición enteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Ileo paralítico 
- ☐ b. Malabsorción grave
- ☐ c. Vómitos incoercibles
- ☐ d. HDA grave activa

La respuesta correcta es: Vómitos incoercibles


Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La causa más frecuente de extracción de SNG es:

Seleccione una:

- ☐ a. Limpieza inadecuada de la sonda
- ☒ b. Pacientes desorientados y agitados. 
- ☐ c. Movilización del paciente
- ☐ d. Tos.

La respuesta correcta es: Pacientes desorientados y agitados.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción oral en la educación del paciente/cuidador de la Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) debe ser... (señala la opción incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Afianzando lo aprendido.
- ☐ b. Sencilla y con lenguaje comprensible
- ☒ c. En una sola sesión y de forma no repetitiva ✓
- ☐ d. Con diálogo abierto

La respuesta correcta es: En una sola sesión y de forma no repetitiva

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La longitud mínima de la SNG en adultos debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 cm.
- ☐ b. 120 cm.
- ☐ c. 75 cm.
- ☒ d. 90 cm. ✓

La respuesta correcta es: 90 cm.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la nutrición parenteral domiciliaria...

Seleccione una:

- ☐ a. Está legislada su utilización.
- ☒ b. No está legislada en nuestro país. ✓
- ☐ c. No es correcta ninguna de las otras respuestas
- ☐ d. Es una opción que tiene unas leyes muy estrictas.

La respuesta correcta es: No está legislada en nuestro país.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La osmolalidad idónea para que un nutrición enteral sea isotónica es:

Seleccione una:

- ☐ a. 1000 mOsm/l
- ☐ b. 600 mOsm/l
- ☐ c. 1200 mOsm/l
- ☒ d. 350 mOsm/l ✓

La respuesta correcta es: 350 mOsm/l



Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cual no es una medida que tengamos que realizar antes de administrar una nutrición enteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Ponerse guantes estériles. ✓
- ☐ b. Que la nutrición se encuentre a temperatura ambiente.
- ☐ c. Ponerse guantes no estériles.
- ☐ d. Lavado de manos

La respuesta correcta es: Ponerse guantes estériles.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La yeyunostomía está contraindicada en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. A. Fístula digestiva alta.
- ☒ b. A y C son correctas ✓
- ☐ c. C. Ascitis masiva
- ☐ d. B. Estenosis pilórica.

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las complicaciones más frecuentes relacionadas con la Nutrición Enteral son:

Seleccione una:

- ☒ a. B y C son correctas. ✓
- ☐ b. A. Metabólicas
- ☐ c. B. Complicaciones de la sonda
- ☐ d. C. Gastrointestinales

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las formulas poliméricas suelen incluir como fuente de hidratos de carbono. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Polisacáridos de glucosa.
- ☒ b. Disacáridos ✓
- ☐ c. Dextrinomaltosa
- ☐ d. Almidón

La respuesta correcta es: Disacáridos