



Navegación por el  
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** martes, 11 de julio de 2017, 12:45

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** martes, 11 de julio de 2017, 13:47

**Tiempo empleado** 1 hora 1 minutos

**Puntos** 22,00/30,00

**Calificación** 7,33 de un máximo de 10,00 (73%)

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Una solución cristaloides con respecto al plasma, puede ser:**

Seleccione una:

- a. Hipotónica
- b. Isotónica
- c. Hipertónica
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 2**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Los valores normales de PVC se encuentran entre:**

Seleccione una:

- a. 0-3 cmH2O
- b. 3-7 cmH2O
- c. 7-11 cmH2O X
- d. 11-15 cmH2O

La respuesta correcta es: 3-7 cmH2O

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**En relación a los cuidados enfermeros sobre los accesos vasculares, es cierto que:**

Seleccione una:

- a. Es fundamental mantener unas condiciones de asepsia y esterilidad
- b. Ante una posible obstrucción del catéter se debe administrar un bolo rápido de 5ml SF para empujar el coágulo
- c. Ante la aparición de extravasación se debe retirar el catéter y canalizar nuevo acceso venoso si es necesario
- d. A y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Entre las precauciones especiales que debemos tener durante la administración de Ringer Lactato® se encu**

Seleccione una:

- a. No administrar en situaciones de hipotermia ✓
- b. Monitorizar los niveles de Na plasmático
- c. Vigilar la aparición de mioclonias
- d. Tener en cuenta que provoca errores en la medición de la glucemia

La respuesta correcta es: No administrar en situaciones de hipotermia

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**La diferencia entre la cantidad de líquidos administrados a un paciente y la cantidad de líquidos perdidos re nombre de:**

Seleccione una:

- a. Balance Hidroelectrolítico ✓
- b. Desajuste Hídrico Diario
- c. Check List del hidratante personal
- d. Todas son falsas

La respuesta correcta es: Balance Hidroelectrolítico

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Entre los signos y síntomas de la hipovolemia podemos mencionar:**

Seleccione una:

- a. Aumento de peso, ingurgitación yugular y aparición de edemas
- b. Irritabilidad, temblores, sed y febrícula
- c. Calambres, polidipsia y debilidad muscular
- d. Sequedad de piel, ausencia de pulsos distales, hipotensión y taquicardia ✓

La respuesta correcta es: Sequedad de piel, ausencia de pulsos distales, hipotensión y taquicardia

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Con respecto a la vía intraósea, señale la incorrecta:**

Seleccione una:

- a. Permite una velocidad de infusión similar a una VVP de 16-18 G
- b. Se considera una medida temporal de emergencia hasta que se pueda conseguir otro acceso vascular
- c. En menores de 8 años el lugar de punción recomendado es 1-2 cm por encima del maléolo tibial interno ✓
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: En menores de 8 años el lugar de punción recomendado es 1-2 cm por encima del maléolo tibial interno

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Entre los signos que la enfermera debe vigilar para controlar el estado de volemia se encuentran:**

Seleccione una:

- a. TA y FC
- b. Estado de turgencia tisular
- c. Diuresis
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**La cantidad de agua endógena perdida por el cuerpo se cuantifica para hacer el balance hídrico como:**

Seleccione una:

- a. 250 cc/24h
- b. 300 cc/24h ✓
- c. 1000 cc/24h
- d. 1500 cc/24h

La respuesta correcta es: 300 cc/24h

**Pregunta 10**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**La monitorización del estado de volemia de un paciente se basa en los siguientes datos:**

Seleccione una:

- a. Signos clínicos, datos de laboratorio y diagnóstico de imagen ✗
- b. Diagnóstico de imagen, signos clínicos y monitorización invasiva
- c. Monitorización invasiva, signos clínicos y datos de laboratorio
- d. Datos de laboratorio, diagnóstico de imagen y test de O`Sullivan

La respuesta correcta es: Monitorización invasiva, signos clínicos y datos de laboratorio

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**¿Cuál de las siguientes no es una complicación derivada del volumen o las características del líquido perfundido?**

Seleccione una:

- a. Embolismo gaseoso ✓
- b. Edema agudo de pulmón
- c. Edema cerebral
- d. Reacciones de hipersensibilidad

La respuesta correcta es: Embolismo gaseoso

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**La relación más usual entre las unidades de los derivados sanguíneos es de:**

Seleccione una:

- a. 2 unidades de plasma/2 concentrados de hematíes
- b. 1 concentrado de hematíes/2 unidades de plasma
- c. 1 unidad de plasma/3 concentrados de hematíes ✓
- d. 1 concentrado hematíes/3 unidades de plasma

La respuesta correcta es: 1 unidad de plasma/3 concentrados de hematíes

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Las necesidades hídricas diarias básicas de un adulto normopeso oscilan entre:**

Seleccione una:

- a. 750-1000 cc
- b. 1000-1300 cc
- c. 1300-2300 cc ✓
- d. 2500-4200 cc

La respuesta correcta es: 1300-2300 cc

**Pregunta 14**

Sin contestar  
Puntúa como  
1,00

Marcar  
pregunta

**Con respecto a la transfusión de sangre, es falso que:**

Seleccione una:

- a. En el shock hemorrágico está indicado el uso de sangre total
- b. La sangre debe administrarse a través de un catéter 18G como mínimo
- c. Si la sangre se va a administrar de forma rápida, es necesario recalentar la bolsa
- d. No debe administrarse sangre a la que no se le haya realizado la determinación de compatibilidad cruzada bajo ninguna circunstancia

La respuesta correcta es: No debe administrarse sangre a la que no se le haya realizado la determinación de compatibilidad cruzada bajo ninguna circunstancia

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Entre las contraindicaciones para la canalización de una vía intraósea en un miembro podemos citar:**

Seleccione una:

- a. Fracturas
- b. Heridas infectadas
- c. Osteoporosis
- d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**El ciclo LADME se refiere a:**

Seleccione una:

- a. Los accesos vasculares en situaciones de emergencia
- b. Los procesos farmacocinéticos ✓
- c. Los factores farmacodinámicos
- d. Los reguladores del ritmo de infusión

La respuesta correcta es: Los procesos farmacocinéticos

**Pregunta 17**

Sin contestar  
Puntúa como  
1,00

Marcar  
pregunta

**Señale la respuesta falsa con respecto a las soluciones coloides:**

Seleccione una:

- a. Las soluciones coloides retienen agua en el espacio intravascular
- b. El Ringer Lactato® es el coloide más utilizado
- c. Los coloides están indicados en caso de sangrado activo o pérdidas proteicas importantes
- d. El uso de albúmina implica un alto riesgo de aparición de reacciones de hipersensibilidad

La respuesta correcta es: El Ringer Lactato® es el coloide más utilizado

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Cuál de los siguiente diagnósticos de enfermería no está directamente relacionado con la administración de farmacoterapia y fluidoterapia:**

Seleccione una:

- a. Riesgo de infección r/c alteración de las defensas primarias: rotura de la piel
- b. (Riesgo de) exceso de volumen de líquidos r/c compromiso de los mecanismos reguladores
- c. Alteración del patrón del sueño r/c alteraciones neuromusculares ✓
- d. Dolor agudo r/c agentes lesivos físicos/psicológicos

La respuesta correcta es: Alteración del patrón del sueño r/c alteraciones neuromusculares

**Pregunta 19**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Señale la respuesta falsa:**

Seleccione una:

- a. Los derivados de la gelatina tienen menor poder expansor que la albúmina
- b. Existen coloides cuyas moléculas se obtienen a partir del almidón de maíz
- c. Los derivados de la gelatina no deben administrarse conjuntamente con sangre
- d. El manitol está indicado en cuadros de hipertensión intracraneal ✗

La respuesta correcta es: Los derivados de la gelatina tienen menor poder expansor que la albúmina

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Señale la respuesta falsa:**

Seleccione una:

- a. La vía oral requiere colaboración y capacidad de deglución por parte del paciente
- b. La vía intranasal es útil para la administración de midazolam en pacientes agitados
- c. En situaciones de hipoperfusión la vía de elección será la intramuscular, por la gran vascularización del músculo ✓
- d. En situaciones de cardiopatía isquémica es importante no realizar múltiples punciones por la posibilidad de fibrinólisis

La respuesta correcta es: En situaciones de hipoperfusión la vía de elección será la intramuscular, por la gran vascularización del músculo

**Pregunta 21**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Entre los componentes del compartimento intracelular se encuentran principalmente:**

Seleccione una:

- a. Potasio, fosfatos inorgánicos y proteínas
- b. Fosfatos inorgánicos, potasio y magnesio
- c. Electrolitos fluidos, fosfatos y sodio
- d. Sodio, potasio y cloro X

La respuesta correcta es: Potasio, fosfatos inorgánicos y proteínas

**Pregunta 22**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**¿Cuál de las siguientes intervenciones de enfermería no está relacionada con la administración de fluidos y fármacos por vía intravenosa?**

Seleccione una:

- a. Punción intravenosa
- b. Monitorización signos vitales
- c. Oxigenoterapia ✓
- d. Cuidados del catéter

La respuesta correcta es: Oxigenoterapia

**Pregunta 23**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Entre los efectos adversos de una transfusión no se encuentra:**

Seleccione una:

- a. Efecto hemolítico agudo por incompatibilidad sanguínea
- b. Aumento del gasto cardiaco por hipercalcemia ✓
- c. Edema pulmonar no cardiogénico
- d. Fiebre

La respuesta correcta es: Aumento del gasto cardiaco por hipercalcemia

**Pregunta 24**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Con respecto a los sistemas de infusión de fármacos y fluidos, es cierto que:**

Seleccione una:

- a. En la precisión de los sistemas por gravedad intervienen factores como la altura o el movimiento del suero
- b. A la hora de administrar drogas vasoactivas es referible utilizar un regulador manual de flujo
- c. Las bombas de perfusión son más precisas que los sistemas por gravedad
- d. La respuesta a y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: La respuesta a y c son correctas

**Pregunta 25**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**El hidroxietilalmidón se considera:**

Seleccione una:

- a. Un coloide natural
- b. Un coloide artificial ✓
- c. Un cristaloides de segunda generación
- d. Una solución acidificante

La respuesta correcta es: Un coloide artificial

**Pregunta 26**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**Los principales electrolitos que encontramos en el compartimento extracelular son:**

Seleccione una:

- a. Sodio, cloro y bicarbonato
- b. Sodio, cloro y potasio X
- c. Sodio cloro y magnesio
- d. Sodio, cloro y calcio

La respuesta correcta es: Sodio, cloro y bicarbonato

**Pregunta 27**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

**El suero de elección en una situación de hipovolemia asociada a traumatismo craneoencefálico es:**

Seleccione una:

- a. Suero glucosado 5%
- b. Suero salino hipertónico 7,5%
- c. Suero glucosalino
- d. Manitol X

La respuesta correcta es: Suero salino hipertónico 7,5%

**Pregunta 28**

**La capacidad de expansión del plasma de los cristaloides está relacionada:**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar  
pregunta

Seleccione una:

- a. Directamente relacionada con la concentración de cloro
- b. Indirectamente relacionada con la concentración de cloro
- c. Directamente relacionada con la concentración de sodio ✓
- d. Indirectamente relacionada con la concentración de sodio

La respuesta correcta es: Directamente relacionada con la concentración de sodio

**Pregunta 29**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar  
pregunta

**Con respecto a la asistencia en el politraumatizado:**

Seleccione una:

- a. Se deben canalizar dos vías de grueso calibre y corto tamaño
- b. Ante shock hipovolémico se debe administrar 4 veces el déficit vascular y para ello podemos utilizar la regla de 3:
- c. Ante sospecha de lesión cervical se contraindica la canalización de la vena yugular interna, externa o subclavia
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 30**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar  
pregunta

**Señale la respuesta incorrecta:**

Seleccione una:

- a. No existen diferencias a la hora de la administración de fármacos entre el niño y el adulto ✓
- b. La leche materna es una vía de eliminación de los fármacos
- c. En niños son frecuentes las intoxicaciones medicamentosas
- d. En el paciente anciano son frecuentes las interacciones farmacológicas por la administración conjunta de fármacos

La respuesta correcta es: No existen diferencias a la hora de la administración de fármacos entre el niño y el adulto

[Finalizar revisión](#)