



Navegación por el cuestionario



[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** domingo, 14 de febrero de 2016, 19:50  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** domingo, 14 de febrero de 2016, 20:09  
**Tiempo empleado** 19 minutos 35 segundos  
**Puntos** 24,00/30,00  
**Calificación** de un máximo de

**Pregunta 1** ¿A qué conclusión debemos llegar si nos encontramos con un caso de polaquiuria?

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Indudablemente a una neoplasia, ya que ésta siempre debuta con polaquiuria.
- b. La causa más frecuente de polaquiuria suele ser por una infección urinaria, sobre todo en mujeres.
- c. En hombres hay que descartar también una infección, aunque la frecuencia urinaria igualmente puede ser un síntoma de cáncer de vejiga o próstata.
- d. B y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

**Pregunta 2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) clasifica las incontinencias mediante, ¿cuántas etiquetas diagnósticas?

Seleccione una:

- a. Una etiqueta diagnóstica.
- b. Dos etiquetas diagnósticas. ✗
- c. Cinco etiquetas diagnósticas.
- d. Cuatro etiquetas diagnósticas.

La respuesta correcta es: Cinco etiquetas diagnósticas.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué incontinencia se produce cuando hay una pérdida de orina menor a 50ml al aumentar la presión abdominal?

Seleccione una:

- a. Incontinencia de esfuerzo. ✓
- b. Incontinencia de urgencia.
- c. Incontinencia refleja.
- d. Incontinencia total.

La respuesta correcta es: Incontinencia de esfuerzo.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La incontinencia urinaria total se define como:

Seleccione una:

- a. Pérdida de orina inferior a los 50 ml al aumentar la presión abdominal.
- b. Pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen vesical específico.
- c. Una pérdida de orina continua e imprevisible. ✓
- d. Una pérdida de orina inferior a 400 ml al día en un adulto.

La respuesta correcta es: Una pérdida de orina continua e imprevisible.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Entre los cuidados enfermeros del catéter suprapúbico se encuentran:

Seleccione una:

- a. Valorar el aspecto del punto de inserción del catéter.
- b. Vigilar aparición de fiebre.
- c. Medir la cantidad de orina y sus características.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Señala la incorrecta. En la incontinencia urinaria total:

Seleccione una:

- a. Siempre se produce una afectación del reflejo sacro, interrumpiendo la capacidad del cerebro para recibir e interpretar una señal. ✓
- b. Se produce por una interrupción de la transmisión del impulso nervioso desde la vejiga al cerebro.
- c. Está causada por una gran variedad de enfermedades, traumatismos o lesiones y pueden localizarse en el SNC tan cerca como en la médula espinal.
- d. Se produce una pérdida de orina continua e imprevisible.

La respuesta correcta es: Siempre se produce una afectación del reflejo sacro, interrumpiendo la capacidad del cerebro para recibir e interpretar una señal.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

¿Qué relación guarda el estreñimiento con la incontinencia urinaria?

Seleccione una:

- a. De hecho, el estreñimiento y la incontinencia urinaria no están relacionados entre sí.
- b. La incontinencia urinaria produce diarrea.
- c. El estreñimiento puede producir impactación fecal sobre la vejiga. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: El estreñimiento puede producir impactación fecal sobre la vejiga.

**Pregunta 8**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

¿Cuál de los siguientes es un criterio de intervención (NIC) en la IU total?

Seleccione una:

- a. Aumento de la ingesta de líquidos.
- b. Ayuda con los autocuidados: aseo.
- c. Vaciamiento doble programado.
- d. Ninguna es correcta. ✗

La respuesta correcta es: Ayuda con los autocuidados: aseo.

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

¿Cuál de estas intervenciones están relacionadas con la IU de esfuerzo?

Seleccione una:

- a. Ejercicios de Kegel.
- b. Estimulación eléctrica.
- c. Conos vaginales.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Existen cuatro mecanismos responsables de la incontinencia de urgencia:

Seleccione una:

- a. Defectos en la regulación por parte del SNC.
- b. Obstrucción del tracto urinario inferior.
- c. Afectación orgánica vesical e inestabilidad idiopática.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 11**

Sin contestar  
Puntúa como  
1,00

Marcar  
pregunta

En un fallo renal, ¿cuál de estos signos nos podemos encontrar con mayor frecuencia?

Seleccione una:

- a. Polaquiuria.
- b. Oliguria.
- c. Disuria.
- d. Nicturia.

La respuesta correcta es: Oliguria.

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Entre los cuidados enfermeros en la unidad de hospitalización de la nefrostomía, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Movilización del catéter para evitar adherencias.
- b. Administración de alginato cálcico cada 8 horas.
- c. Lavado del catéter con 10 cc de SF para mantenerlo permeable. ✓
- d. Aplicación de colagenasa vía tópica cada 24 horas.

La respuesta correcta es: Lavado del catéter con 10 cc de SF para mantenerlo permeable.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La función de la uretra es:

Seleccione una:

- a. De almacenamiento de la orina.
- b. Extraer de la sangre aquellos productos que son nocivos al organismo y desecharlos por la orina.
- c. Del control del vaciado y de la conducción de la orina. ✓
- d. A y b son correctas.

La respuesta correcta es: Del control del vaciado y de la conducción de la orina.

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La función del catéter Doble J es:

Seleccione una:

- a. La de extraer de la sangre aquellos productos que son nocivos al organismo.
- b. Asegurar el paso de la orina del riñón hacia la vejiga cuando el uréter está obstruido. ✓
- c. Para fortalecer la musculatura abdominal.

- d. Aumentar la capacidad miccional y reducir la micción muy frecuente.

La respuesta correcta es: Asegurar el paso de la orina del riñón hacia la vejiga cuando el uréter está obstruido.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

En la incontinencia urinaria refleja:

Seleccione una:

- a. Se caracteriza por un residuo postmiccional de 50 ml.
- b. Se caracteriza por un residuo postmiccional mayor de 100 ml. ✓
- c. Se caracteriza por un residuo postmiccional menor de 100 ml.
- d. Nunca presenta residuo postmiccional.

La respuesta correcta es: Se caracteriza por un residuo postmiccional mayor de 100 ml.

**Pregunta 16**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

En el caso concreto del Cisplatino para prevenir su nefrotoxicidad se recomienda:

Seleccione una:

- a. Hidratación forzada con suero salino previo y posteriormente.
- b. Es recomendable beber al menos 3 ó 4 litros de líquidos diarios durante los dos días siguientes a la quimioterapia.
- c. Administración de Manitol 20%, 200 ml IV, cada 4 horas.
- d. A y b son correctas. ✗

La respuesta correcta es: Hidratación forzada con suero salino previo y posteriormente.

**Pregunta 17**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

La manifestación más frecuente de la nefrotoxicidad es:

Seleccione una:

- a. Una elevación de la creatinina.
- b. Una disminución de las plaquetas.
- c. Un aumento de la hemoglobina. ✗
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Una elevación de la creatinina.

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué músculo interviene en la contracción vesical?

Seleccione una:

- a. El detrusor. ✓
- b. Los uréteres.
- c. El perineo.
- d. El esfínter anal.

La respuesta correcta es: El detrusor.

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué incontinencia urinaria es también conocida como incontinencia de urgencia?

Seleccione una:

- a. Incontinencia transitoria.
- b. Incontinencia neurógena.
- c. Incontinencia por inestabilidad del detrusor. ✓
- d. Incontinencia por rebosamiento.

La respuesta correcta es: Incontinencia por inestabilidad del detrusor.

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué factores se relacionan con la IU de urgencia?

Seleccione una:

- a. La cafeína.
- b. El alcohol.
- c. La disminución de la ingesta de líquidos.
- d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

**Pregunta 21**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

Las complicaciones urológicas en el paciente con cáncer comprenden:

Seleccione una:

- a. La hematuria franca.
- b. Incontinencia urinaria.
- c. La obstrucción del tracto urinario superior e inferior y la retención urinaria.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 22** En hombres, especialmente mayores de 50 años, la polaquiuria puede ser debida a:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Infección urinaria.
  - b. Hiperplasia benigna o maligna de próstata.
  - c. Cáncer de vejiga.
  - d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 23** ¿Para qué se usan los ejercicios de Kegel?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Para fortalecer la musculatura abdominal.
  - b. Son el tratamiento de elección en la IU por rebosamiento.
  - c. Para fortalecer la musculatura perineal. ✓
  - d. Son el tratamiento de elección en la IU total.

La respuesta correcta es: Para fortalecer la musculatura perineal.

**Pregunta 24** ¿Cuál de estas neoplasias cursa habitualmente con polaquiuria?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Cáncer renal.
  - b. Cáncer de próstata. ✓
  - c. Cáncer de ovario.
  - d. Osteosarcoma.

La respuesta correcta es: Cáncer de próstata.

**Pregunta 25** El entrenamiento vesical consiste en:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Realizar intervalos de tiempo progresivamente más largos entre micciones. ✓
  - b. El paciente orina siguiendo una pauta horaria preestablecida.
  - c. Consisten en contraer de manera voluntaria la musculatura del periné.
  - d. Facilitan la dilatación del músculo liso del cuello vesical.

La respuesta correcta es: Realizar intervalos de tiempo progresivamente más largos entre micciones.

**Pregunta 26** Las complicaciones urológicas en el paciente con cáncer no comprenden:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Neutropenia. ✓
  - b. Incontinencia urinaria.
  - c. La obstrucción del tracto urinario superior e inferior.
  - d. B y c son correctas.

La respuesta correcta es: Neutropenia.

**Pregunta 27** De estos diagnósticos, ¿cuál está relacionado con la oliguria?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Deterioro de la percepción sensorial (código 00122).
  - b. Náuseas (código 00134).
  - c. Riesgo de déficit de volumen de líquidos (código00027). ✓
  - d. Deterioro parental (código 00056).

La respuesta correcta es: Riesgo de déficit de volumen de líquidos (código00027).

**Pregunta 28** El fármaco que se asocia principalmente a la insuficiencia renal aguda es:

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Furosemida. ✗
  - b. Amlodipino.
  - c. Cisplatino.
  - d. Alopurinol.

La respuesta correcta es: Cisplatino.

**Pregunta 29** Se entiende por oliguria:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. A la micción de menos de 400 ml de orina en 24 horas. ✓
  - b. A la micción de más de 500 ml de orina en 24 horas.
  - c. A la micción de menos de 600 ml de orina en 24 horas.

- d. A la micción de más de 600 ml de orina en 24 horas.

La respuesta correcta es: A la micción de menos de 400 ml de orina en 24 horas.

**Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Marcar  
pregunta

La etiología de la hematuria puede ser:

Seleccione una:

- a. Patología tumoral extensa (cáncer de próstata, urotelio o riñón).
- b. Invasión del aparato urinario por tumores de otras localizaciones (cáncer de colon, del aparato reproductor femenino, sarcomas pélvicos).
- c. Metástasis en tracto urinario tanto en vejiga como en riñón.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

[Finalizar revisión](#)