



Navegación por el cuestionario



[Finalizar revisión](#)

Comenzado el Lunes, 8 de febrero de 2016, 22:12
Estado Finalizado
Finalizado en Lunes, 8 de febrero de 2016, 22:47
Tiempo empleado 34 minutos 48 segundos
Puntos 25,00/30,00
Calificación de un máximo de

Pregunta 1 Entre las medidas para evitar estímulos emetizantes se encuentran:

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Tomar bebidas calientes y a grandes sorbos.
- b. Forzar al máximo la ingesta.
- c. Realizar comidas muy grasas.
- d. Realizar 5-6 comidas de poco volumen. ✓

La respuesta correcta es: Realizar 5-6 comidas de poco volumen.

Pregunta 2 Dentro del tratamiento antiemético en el paciente oncológico, podemos usar:

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Antagonistas de los receptores de 5-HT3 como el ondansetron.
- b. Corticosteroides como la dexametasona. ✗
- c. Benzodiacepinas como el lorazepan.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3 Para el tratamiento de la diarrea en el paciente oncológico no pueden usarse:

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Opiodes y derivados (loperamida, difenoxilato).
- b. Subsalicilato de bismuto y agentes de caolina.
- c. Octreótido.
- d. Lactulosa. ✓

La respuesta correcta es: Lactulosa.

Pregunta 4 Señale la falsa. En cuanto a las fístulas esofágicas en el paciente oncológico:

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Constituyen una forma de perforación que se produce por la comunicación a través de la pared esofágica con algun bronquios principales.
- b. Se caracterizan por accesos de tos relacionados con la ingesta y por neumonías de repetición secundarias al paso c alimento a las vías respiratorias.
- c. Tienen su origen en la evolución por progresión de tumores que asientan en el esófago o en el mediastino, como complicación de una cirugía esofágica o de un tratamiento radioterápico o tras procedimientos invasivos. ✗
- d. A veces es preciso realizar una gastrostomía cuando no es posible colocar un stent. La gastrostomía se realiza cuando se estima que la va a tener implantada al menos 14 meses.

La respuesta correcta es: A veces es preciso realizar una gastrostomía cuando no es posible colocar un stent. La gastrostomía se realiza cuando se estima que la va a tener implantada al menos 14 meses.

Pregunta 5 Se sugiere que el tratamiento para la anorexia está indicado cuando en un paciente concurren 2 de las siguientes situaciones:

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Pérdida de peso reciente mayor del 10% del peso habitual.
- b. Albúmina sérica inferior a 3,5 g/dl y situaciones de estrés catabólico.
- c. A y b son verdaderas. ✓
- d. Imposibilidad para una alimentación oral suficiente durante más de dos días.

La respuesta correcta es: A y b son verdaderas.

Pregunta 6 A un paciente oncológico con diarrea le recomendamos que evite:

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Yogur natural o descremado, sin sabores ni frutas.
- b. Pan blanco y tostado.
- c. Arroz, zanahorias, huevos y jamón cocidos.
- d. Productos de pastelería muy ricos en azúcar y grasa. ✓

La respuesta correcta es: Productos de pastelería muy ricos en azúcar y grasa.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Son fármacos de uso habitual en la anorexia del paciente oncológico:

Seleccione una:

- a. Dexametasona y acetato de megestrol. ✓
- b. Lidocaína viscosa.
- c. Granisetrón.
- d. Fentanilo.

La respuesta correcta es: Dexametasona y acetato de megestrol.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

En cuanto a la presencia de disfagia en el paciente oncológico:

Seleccione una:

- a. Suele presentarse la disfagia mecánica que puede estar originada por una estenosis intrínseca o una compresión extrínseca del esófago.
- b. La causa más frecuente es el carcinoma de células escamosas si la estenosis afecta al tercio medio o proximal del esófago.
- c. Rara vez causa desnutrición.
- d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Entre las medidas y agentes para prevenir y tratar la mucositis podemos destacar:

Seleccione una:

- a. Calentar los alimentos a altas temperaturas.
- b. Realizar colutorios con suero salino diluido y bicarbonato sódico cada 4 h. ✓
- c. Administrar acetato de megestrol.
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Realizar colutorios con suero salino diluido y bicarbonato sódico cada 4 h.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Entre los agentes quimioterápicos capaces de provocar mucositis severa se encuentran:

Seleccione una:

- a. Adriamicina, methotrexate y 5-Fu. ✓
- b. Busulfán, Cisplatino y D-TIC.
- c. BCNU y L-Asparaginasa.
- d. Mitixantrone y paclitaxel.

La respuesta correcta es: Adriamicina, methotrexate y 5-Fu.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Dentro del tratamiento antiemético para náuseas y vómitos en el paciente oncológico podemos usar:

Seleccione una:

- a. Fenotiacinas como la clorpromacina.
- b. Benzamidas como la metoclopramida.
- c. Butiroferonas como el haloperidol.
- d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Entre las causas que originan anorexia en el paciente oncológico se encuentran:

Seleccione una:

- a. Dispepsia y alteraciones del gusto.
- b. Náuseas y vómitos.
- c. Dolor.
- d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 13

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Al paciente oncológico con estreñimiento le podemos recomendar que evite:

Seleccione una:

- a. Practicar ejercicio físico y masajes abdominales. ✗
- b. Triturar los alimentos ricos en fibra.
- c. Aumentar la cantidad de aceite de oliva crudo en la dieta.
- d. Añadir salvado de trigo a algunos alimentos.

La respuesta correcta es: Triturar los alimentos ricos en fibra.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar

En cuanto a la disfagia en el paciente oncológico:

Seleccione una:

- a. Siempre que sea posible se aplicará un tratamiento etiológico. ✓

pregunta

- b. En pacientes inmunodeprimidos nunca puede deberse a candidiasis.
- c. Es recomendable incluir alimentos de diferentes consistencias en el mismo plato.
- d. Se recomienda realizar 2-3 comidas al día ingiriendo un gran volumen de una sola vez.

La respuesta correcta es: Siempre que sea posible se aplicará un tratamiento etiológico.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Entre las recomendaciones dietéticas para los pacientes con anorexia se encuentran:

Seleccione una:

- a. Realizar comidas pequeñas pero frecuentes con alimentos templados o fríos. ✓
- b. Tomar alimentos hipoproteicos diluidos en grandes volúmenes de líquidos.
- c. Proporcionar alimentos de consistencia dura.
- d. Realizar cocciones muy grasas.

La respuesta correcta es: Realizar comidas pequeñas pero frecuentes con alimentos templados o fríos.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Entre las causas más frecuentes de diarrea en los pacientes con cáncer avanzado no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Desequilibrio del tratamiento con laxantes.
- b. Fármacos como antiácidos, antibióticos, AINES.
- c. Incrustación fecal.
- d. Radioterapia holocraneal. ✓

La respuesta correcta es: Radioterapia holocraneal.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Entre los factores de riesgo para desarrollar mucositis durante el tratamiento están:

Seleccione una:

- a. Edad: Cuanto mayor edad tiene el paciente, mayor toxicidad presenta.
- b. Estado previo de la cavidad oral: Si el paciente tiene la boca mal cuidada el riesgo es menor.
- c. Tipo de tumor: En los tumores de cabeza y cuello son infrecuentes.
- d. Edad: Cuanto más joven es el paciente, mayor toxicidad presenta. ✓

La respuesta correcta es: Edad: Cuanto más joven es el paciente, mayor toxicidad presenta.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Son recomendaciones dietéticas en mucositis:

Seleccione una:

- a. Basar la dieta en alimentos duros y ásperos.
- b. Cocinar los alimentos hasta que estén tiernos. ✓
- c. Facilitar bebidas con gas y alcohólicas.
- d. Facilitar alimentos secos y pegajosos.

La respuesta correcta es: Cocinar los alimentos hasta que estén tiernos.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

En relación a la anorexia en el paciente oncológico es cierto que:

Seleccione una:

- a. Aparece en casi el 100% de los pacientes en fase terminal.
- b. Aparece en el 100% de los linfomas y en el 5% de los pacientes con cáncer gástrico.
- c. En su etiología están implicados diversos mediadores como las citoquinas, los neuropéptidos y los productos liberados por el tumor. ✗
- d. A y c son verdaderas.

La respuesta correcta es: A y c son verdaderas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Entre las recomendaciones generales que podemos ofrecer al paciente con anorexia se encuentran:

Seleccione una:

- a. Que él mismo cocine para que pueda percibir mejor los olores.
- b. Permanecer en reposo la mayor parte del día, y especialmente antes de comer.
- c. Cuidar la presentación de los platos, con variedad de colores y texturas. ✓
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Cuidar la presentación de los platos, con variedad de colores y texturas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

En la mucositis grado 1:

Seleccione una:

- a. El paciente solo puede tomar líquidos.
- b. El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.
- c. El paciente presenta eritemas en la mucosa oral. ✓
- d. El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.

La respuesta correcta es: El paciente presenta eritemas en la mucosa oral.

Pregunta 22 Para el alivio de la xerostomía en el paciente oncológico es recomendable:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Chupar trocitos de hielo saborizados con zumos de frutas.
- b. Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.
- c. Realizar enjuagues con manzanilla con limón.
- d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 23 Entre las medidas generales que se recomiendan ante el estreñimiento en el paciente oncológico, no se encuentran:

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Control de otros síntomas como el dolor y la anorexia.
- b. Aumento de la actividad física. ✗
- c. Disminución de la ingesta de líquidos y fibra.
- d. Facilitación de intimidad y de posturas cómodas.

La respuesta correcta es: Disminución de la ingesta de líquidos y fibra.

Pregunta 24 Entre las causas que originan anorexia en el paciente oncológico se encuentran:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Hipercalcemia.
- b. Estasia gástrica y estreñimiento.
- c. Ascitis, ansiedad y depresión.
- d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 25 A un paciente oncológico con diarrea le recomendamos que tome:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Hortalizas crudas.
- b. Plátanos y compota de manzana. ✓
- c. Pan y cereal de salvado entero.
- d. Nueces, almendras, avellanas y otros frutos secos.

La respuesta correcta es: Plátanos y compota de manzana.

Pregunta 26 Entre los fármacos usados para tratar el estreñimiento en el paciente oncológico no se encuentran:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Los suplementos a base de metilcelulosa, el poliacarbofil y el psyllium.
- b. La fibra de senna, el hidróxido de magnesio, el bisacodilo y las preparaciones de polietilenglicol.
- c. El betanecol, la neostigmina, el procalopride.
- d. La loperamida y el difenoxilato. ✓

La respuesta correcta es: La loperamida y el difenoxilato.

Pregunta 27 En la paracentesis terapéutica de la ascitis en los pacientes oncológicos, habrá que tener en cuenta:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Que podemos evacuar hasta un máximo de 2 litros de una sola vez.
- b. Que para evitar sangrado es adecuado realizarla en decúbito prono.
- c. Que es preciso revisar con frecuencia la permeabilidad del catéter usado para la punción. ✓
- d. Que no es necesario el control de la presión arterial, ni determinar las plaquetas ni la coagulación en los pacientes riesgo.

La respuesta correcta es: Que es preciso revisar con frecuencia la permeabilidad del catéter usado para la punción.

Pregunta 28 En cuanto a las hemorragias esofágicas en el paciente oncológico:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Pueden estar causadas por tumores de hígado y metástasis hepáticas.
- b. Pueden estar causadas por síndromes mieloproliferativos con afectación hepática.
- c. Se denomina Síndrome de Mallory-Weiss a la hemorragia esofágica consistente en una laceración longitudinal de la mucosa en la zona cardioesofágica, y habitualmente secundaria a episodios de vómitos postquimioterapia.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 29 Las náuseas y vómitos en los pacientes oncológicos:

Correcta
Puntúa 1,00

Seleccione una:

sobre 1,00

 Marcar pregunta

- a. Apenas se dan en el cáncer avanzado.
- b. Su prevalencia es mayor en mayores de 65 años.
- c. Su prevalencia parece ser mayor en los pacientes con cáncer gástrico, de hígado o cerebral. ✓
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Su prevalencia parece ser mayor en los pacientes con cáncer gástrico, de hígado o cerebral.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar pregunta

Son causas de náuseas y vómitos en el paciente oncológico:

Seleccione una:

- a. Estimulación vagal.
- b. Estimulación directa del centro del vómito.
- c. Estimulación de la zona gatillo quimiorreceptora.
- d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

[Finalizar revisión](#)