

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración proactiva para canalizar un PICC se tiene en cuenta los siguientes apartados, señale la opción verdadera:

Seleccione una:

a.
Tratamiento prescrito

b.
El material del PICC

c.
Características del profesional sanitario

d.
Todas son correctas

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La localización de la correcta posición del PICC en la radiografía de tórax es...

Seleccione una:

a.
A 3 cm de distancia de la carina traqueal.

b.
A 5 cm de distancia de La unión cavo-auricular.

c.
A nivel de la 4^o vertebra torácica.

d.
A 2 cm de distancia de la 4^o vertebra torácica.

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La imagen ecográfica de la vena cefálica en eje transversal o eje corto se observa en la pantalla del ecógrafo como:

Seleccione una:



a. Una imagen circular anecóica con una imagen hiperecogénica dentro alejada de estructuras de riesgo.



b. Una imagen circular anecóica alejada de estructuras de riesgo.



c. Una imagen circular hiperecogénica alejada de estructuras de riesgo.



d. Una imagen circular hiperecogénica con una imagen anecoica dentro alejada de estructuras de riesgo.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En la elección de la mejor vena disponible se deberá tener en cuenta...? Señala la correcta.

Seleccione una:



a. Se debe valorar las venas con compresor y medir su diámetro.



b. Un French es igual a 0,033 milímetros.



c. El diámetro diámetro del catéter debe ser al menos tres veces el de la vena.



d. El diámetro diámetro de la vena debe ser al menos tres veces el del catéter.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se realiza la elección de la vena más adecuada para la canalización del catéter se hace atendiendo a:

Seleccione una:



a. Relación vena/catéter.



b. Relación vena/ aguja.



c. Relación sonda ecográfica / catéter.



d. Relación sonda ecográfica / aguja.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la inyección del anestésico...

Seleccione una:

a.

No se apreciará nada en la pantalla del ecógrafo al realizarse en el plano intradérmico.

b.

Se infiltrará el anestésico cerca del nervio para así evitar dolor posterior al paciente durante la técnica.

c.

No se recomienda la anestesia ecoguiada por no tratarse de una práctica segura.

d.

Debe infiltrarse de manera ecoguiada en el plano subcutáneo entre la piel y la vena atendiendo a su profundidad.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras la canalización ecoguiada de un catéter PICC de 2 lúmenes en la vena basilíca del MSD, se observa sangrado en el punto de inserción. Señala la actuación correcta.

Seleccione una:

a.

Oclusión con gasa + sistema de fijación con suturas + apósito de membrana transparente semipermeable.

b.

Uso de cianoacrilato + oclusión con gasa + sistema de fijación sin suturas + apósito de membrana transparente semipermeable.

c.

Uso de cianoacrilato + sistema de fijación con suturas + apósito de membrana transparente semipermeable.

d.

Uso de cianoacrilato + sistema de fijación sin suturas + apósito de membrana transparente semipermeable.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La comprobación de la punta del midline se realizará...señala la correcta:

Seleccione una:

a.
No se puede comprobar la punta del midline.

b.
Mediante ecografía.

c.
Con radiografía de tórax.

d.
Con electrodo intracavitario.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La identificación ecográfica de las venas del brazo para la canalización de catéteres ecoguiados debe comenzar en :

Seleccione una:

a.
Es indiferente mientras se estudien las estructuras vasculares y no vasculares en profundidad.

b.
Debe comenzar en la fosa antecubital y subir de manera ascendente siguiendo el protocolo RAVESTO.

c.
Debe comenzar en la zona verde ya que es en ella donde deben realizarse la punción.

d.
Debe comenzar en la fosa antecubital y continuar con una valoración ascendente de las vasos siguiendo el protocolo RaPeVA.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué zona de Dawson se asocia con elevado riesgo de punciones no exitosas, complicaciones trombóticas, infecciosas y riesgo de malposición del catéter?

Seleccione una:

a.
Zona amarilla.

b.
Zona verde.

c.
Zona roja.

- d.
En ninguna zona existe riesgo al utilizar el ecógrafo.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura está formada por un grupo de estructuras circulares oscuras con los bordes hiperecogénicos y no se comprime al ejercer presión con la sonda ecográfica?

Seleccione una:

a.
Vena.

b.
Arteria.

c.
Vena trombosada.

d.
Nervio.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En pacientes con más riesgo de salida accidental del catéter como ancianos, niños, pacientes agitados o en casos en los que la piel tenga alergias o intolerancias a apósitos estará indicado el uso de:

Seleccione una:

a.
Sistemas de fijación sin sutura.

b.
Puntos de sutura, dado su elevado riesgo de salida.

c.
Sistemas de fijación sin sutura con vendaje oclusivo.

d.
Sistema de anclaje subcutáneo.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La canalización en plano longitudinal tiene las siguientes ventajas excepto:

Seleccione una:

a.
Visualización de arteria, nervio y vena en la misma imagen.

b.
Visualización de la pared posterior del vaso.

c.
Comprobación de la guía dentro del vaso.

d.
Visualización del cuerpo de la aguja.

Pregunta **14**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes acciones se encuentran entre las recomendaciones con mayor evidencia de eficacia y mayor fuerza de recomendación en las guías de práctica clínica en relación con la técnica aséptica adecuada para la canalización de un PICC? Señala la incorrecta:

Seleccione una:

a.
El lavado de manos.

b.
Uso de gorro y mascarilla no estéril tanto el operador como la persona que le auxilia durante la técnica.

c.
Guantes y bata estéril.

d.
Campo estéril amplio, con cobertura de menos del 80% del paciente.

Pregunta **15**
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura tiene una imagen ecográfica formada por un grupo de estructuras circulares oscuras con los bordes hiperecogénicos?

Seleccione una:

a.
Arteria.

b.
Venas braquiales.

c.
Vena cefálica.



d.
Nervio.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se procederá a retirar el microintrodutor... Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Una vez se haya realizado el control radiológico en caso de no tener ECG- IC.



b.
Tras realizar la progresión completa del catéter se parará para permitir su paso a través de él sólo se retirará la parte interna de éste.



c.
Cuando se compruebe que las luces infunden y refluyen sin dificultad.



d.
Una vez que se haya introducido el PICC hasta la distancia estimada o se haya comprobado su posición central mediante ECG-IC y se compruebe que las luces refluyen e infunden sin dificultad.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El eje nervio- vascular o paquete braquial está formado por las siguientes estructuras:

Seleccione una:



a.
Vena cefálica, vena braquial, arteria braquial y nervio mediano.



b.
Vena basílica, vena axilar, arteria radial y nervio mediano.



c.
Venas braquiales, arteria braquial y nervio mediano.



d.
Venas braquiales, arteria radial y nervio mediano.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se procederá a pelar y retirar el microintrodutor...señala la correcta:

Seleccione una:

a.

Una vez que se ha introducido el PICC hasta la distancia estimada o una vez que se comprueba mediante IC-ECG.

b.

Una vez que se retira la guía y su parte interna se puede empezar a pelar para evitar sangrado.

c.

Una vez que se hayan introducido 5cm del catéter.

d.

Antes de introducir el catéter previamente purgado con suero salino.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debido a las características de cada vena, el orden de preferencia más adecuado para la inserción ecoguiada del PICC es:

Seleccione una:

a.

Vena basílica, vena cefálica y venas braquiales.

b.

Venas braquiales, vena cefálica y vena basílica.

c.

Vena cefálica, vena basílica y venas braquiales.

d.

Vena basílica, venas braquiales y vena cefálica.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El pH del fármaco por el cual está indicado la administración por un PICC es, señale la opción verdadera:

Seleccione una:

a.

pH entre 6 y 8

b.

pH menor que 5 o mayor que 9

c.
pH = 5 o = 9



d.
pH ácido o básico