

Comenzado el Estado	martes, 28 de agosto de 2018, 18:44
Finalizado en Tiempo empleado	Finalizado martes, 28 de agosto de 2018, 19:20 35 minutos 53 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos factores consideras que es de riesgo intraparto?

Seleccione una:

- ☐ a. Oligoamnios
- ☐ b. Muerte fetal previa
- ☐ c. Actividad fetal disminuida
- ☒ d. Prolapso de cordón ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si un recién nacido tras 30 segundos de ventilación con presión positiva y masaje cardiaco presenta una frecuencia cardíaca de 80 lpm se debe:

Seleccione una:

- ☒ a. Suspender el masaje cardiaco y seguir ventilando ✓
- ☐ b. Seguir masaje cardiaco hasta que la frecuencia cardiaca sea > 100 lpm
- ☐ c. Administrar oxígeno libre
- ☐ d. Administrar una dosis de adrenalina

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la reanimación neonatal es recomendable disponer de :

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter umbilical nº 5 y 8 FR
- ☐ b. Catéter umbilical nº 8 y 10 Fr
- ☒ c. Catéter umbilical nº3,5 y 5 Fr ✓
- ☐ d. Catéter umbilical de 10 y 15 Fr

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para volver a valorar la frecuencia cardiaca del recién nacido después de iniciar el masaje cardiaco?

Seleccione una:

- ☐ a. 60 segundos
- ☐ b. 10 segundos
- ☐ c. 3 minutos
- ☒ d. 30 segundos ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si se utiliza guía o fiador en la intubación del recién nacido, hay que tener en cuenta lo siguiente, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario utilizarla en todas las intubaciones

- ☐ b. La punta de la guía debe quedar al menos 0,5 cm del final del TET
- ☒ c. Se precisan TET especiales ✓
- ☐ d. Se debe tener especial cuidado al retirar la guía para evitar la extubación

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una mascarilla es de tamaño adecuado cuando cubre:

Seleccione una:

- ☒ a. Boca y nariz ✓
- ☐ b. La boca
- ☐ c. Boca, nariz y parte interna de los ojos
- ☐ d. La nariz.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una bolsa autoinflable:

Seleccione una:

- ☐ a. Necesita estar conectada a una fuente de gas para funcionar
- ☐ b. Tiene una entrada única de oxígeno
- ☐ c. Tiene una entrada de aire y otra de oxígeno
- ☒ d. Tiene dos entradas una para el aire ambiente y otra para el flujo de oxígeno. ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras la estabilización inicial, el recién nacido presenta apnea y frecuencia cardiaca de 80 lpm. Señala la opción más adecuada de actuación:

Seleccione una:

- ☒ a. Ventilar con presión positiva ✓
- ☐ b. Administrar oxígeno indirecto a 15 l/min
- ☐ c. Estimular con golpes suaves en los talones
- ☐ d. Dar masaje cardiaco

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un RN con intubación endotraqueal, que en la auscultación presenta disminución del murmullo vesicular izquierdo y aumentado en el derecho. La situación más probable es:

Seleccione una:

- ☒ a. Intubación selectiva de pulmón derecho ✓
- ☐ b. Neumotórax izquierdo
- ☐ c. Colocación del tubo en el esófago.
- ☐ d. Perforación de tráquea

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿El lugar de elección para realizar el masaje cardiaco en un recién nacido es?

Seleccione una:

- ☐ a. Tercio medio del esternón a nivel de la línea intermamilar
- ☐ b. Apéndice xifoides
- ☒ c. Tercio inferior del esternón entre el apéndice xifoides y línea imaginaria que une las dos mamilas. ✓
- ☐ d. Tercio medio del esternón a nivel de la línea intermamilar

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida que precisa adrenalina:

Seleccione una:

- ☐ a. La primera dosis se utiliza al 1:1.000
- ☐ b. Siempre debe corregirse el pH sanguíneo para que haga efecto
- ☐ c. Se puede administrar una dosis por minuto durante 30 minutos.
- ☒ d. La dosis intravenosa y endotraqueal es distinta pero la dilución es la misma (1:10.000) ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida, la administración de naloxona:

Seleccione una:

- ☐ a. Está indicada en caso de drogadicción materna
- ☐ b. La vía de elección para su administración en el RN intubado es la endotraqueal
- ☒ c. Puede administrarse sin diluir a 0,25 mL/kg por vía intramuscular ✓
- ☐ d. Si sospechamos depresión respiratoria por narcóticos administrados 4 horas antes del parto, en un recién nacido la primera medida a tomar es su administración subcutánea.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tiempo máximo recomendable de un intento de intubación endotraqueal es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 segundos
- ☐ b. 90 segundos



c. 30 segundos ✓



d. El necesario para conseguir la intubación

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida que precisa expansores de volumen:

Seleccione una:



a. La vía de elección para su administración, mientras se canaliza la vena umbilical, es la vía oral.



b. La dosis habitual es de 10 mL/kg en 5-10 minutos. ✓



c. Si se sospecha de anemia aguda se transfunde sangre del grupo 0 y Rh(+)



d. Los más utilizados son los sueros glucosados.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si un recién nacido a los 30 segundos de vida presenta una frecuencia cardiaca de 50 lpm se debe:

Seleccione una:



a. Intubar, ventilar e iniciar masaje



b. Administrar oxígeno libre



c. Administrar adrenalina



d. Ventilar con presión positiva ✓

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las palas del laringoscopio recomendadas en la reanimación de un neonato a término son:

Seleccione una:

- ☐ a. Curvas y del nº «0»
- ☐ b. Rectas y del nº «2»
- ☒ c. Rectas y el nº 1 ✓
- ☐ d. Curvas del nº «00»

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si tras las maniobras de estabilización inicial el niño tiene un llanto vigoroso, la frecuencia cardiaca es >100 lpm y tiene buen color, señalar la opción de actuación más adecuada:

Seleccione una:

- ☒ a. Cuidados de rutina ✓
- ☐ b. Esperar para realizar el test de Apgar a los 5 minutos para entregarlo a la madre
- ☐ c. Darle durante unos minutos O2 indirecto a baja concentración
- ☐ d. Aspirar de orofaringe y fosas nasales.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a la vía intraósea:

Seleccione una:

- ☒ a. El lugar de punción está localizado en la cara interna de la pierna (1-2 cm debajo de la meseta tibial) ✓
- ☐ b. Es de uso frecuente en la reanimación del recién nacido en paritorio.
- ☐ c. Es la vía de elección para la administración de adrenalina
- ☐ d. No permite la administración de bicarbonato

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si ventilamos a un recién nacido con bolsa y mascarilla debemos:

Seleccione una:

- ☒ a. Aplicar 30-60 insuflaciones por minuto ✓
- ☐ b. Colocar la cabeza en hiperextensión forzada
- ☐ c. Usar mascarilla opaca que selle solo la boca del recién nacido
- ☐ d. Colocar un tubo de Guedel antes de comenzar

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el masaje cardiaco del recién nacido la relación compresión/ventilación es:

Seleccione una:

- ☒ a. Tres compresiones/una ventilación ✓
- ☐ b. Cinco compresiones/una ventilación
- ☐ c. Una compresion/una ventilación
- ☐ d. Dos compresiones/cinco ventilaciones