

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:

- a. Nauseas.
- b. Cefalea.
- c. Malestar general.
- d. Mareo con giro de objetos. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes opciones, cual es la diferencia entre el shock séptico y los demás tipo:

Seleccione una:

- a. No precisa reposición de volumen aún con hipotensión.
- b. No causa taquicardia (salvo en paciente betabloqueados).
- c. La necesidad de recoger hemocultivos y urocultivo. ✓
- d. Nunca se modifica la función respiratoria.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una acidosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph. ✓

- b. Hipotensión - Bradicardia - Bradipsiquia.
- c. Aumento del Ph.
- d. Triplicar la PCO2.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Medida a tomar de forma prioritaria ante un paciente inconsciente (en coma):

Seleccione una:

- a. Hacer glucemia capilar.
- b. Administrar Naloxona.
- c. Valorar ABCD. ✓
- d. Aplicar escala de coma de glasgow.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tratamiento de elección ante sospecha de úlcera en un dolor abdominal:

Seleccione una:

- a. Omeprazol.
- b. Ondansetron.
- c. Buscapina.
- d. Omeprazol y Ranitidina. ✓

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. Valorar ABCD. ✓
- b. Hacer glucemia capilar.
- c. Buscar cuerpos cetónicos.
- d. Administrar dextrosa/glucosa.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph.
- b. Aumento del Ph. ✓
- c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- d. Descenso del la PIC.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de estas soluciones cristaloides isotonicas, es ligeramente hipotonica:

Seleccione una:

- a. Salino 0,9%.
- b. Glucosa 5%. ✓
- c. Ringer.
- d. Ringer Lactato.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El uso de SNG en pacientes con sangrado digestivo alto activo, esta contraindicado en caso de:

Seleccione una:

- a. VHC +.
- b. Varices esofágicas. ✓
- c. INR mayor que 7.
- d. Pacientes diabéticos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El omeprazol es:

Seleccione una:

- a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓
- b. Un inhibidor de la bomba de electrones.
- c. Un antiemético.
- d. Un emetizante.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son contraindicaciones para usar sueros glucosados:

Seleccione una:

- a. TCE e hipertensión intracraneal. ✓
- b. Hipoglucemia y ansiedad.
- c. Ansiedad e hipoglucemia.



d. Hipertensión e hipoglucemia.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NISHH, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:



a. 1. ✓



b. 0.



c. 3.



d. 2.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:



a. Un patrón Electrocardiografico.



b. Respiratorio. ✓



c. Diabético.



d. Urinario.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que tipo de shock aparece una piel caliente y sonrojada en el paciente:

Seleccione una:

- a. Shock hipovolémico.
- b. Shock séptico. ✓
- c. Shock cardiogénico.
- d. Shock neurogénico.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La FiO2 máxima que obtendremos con una mascarilla venturi a 15 lpm será de:

Seleccione una:

- a. 1.
- b. 0,8.
- c. 50%-60%. ✓
- d. 27%-31%.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un Electro Cardiograma con elevación del ST en las derivaciones V1 y V2, sospecharemos:

Seleccione una:

- a. Infarto inferior.
- b. Angina estable.
- c. Angina inestable.
- d. Infarto septal. ✓

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:

- a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardíaco y "IV" infarto NO complicado
- b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.
- c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓
- d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es una Epistaxis?

Seleccione una:

- a. El momento de extasis tras el uso del EPI (Equipo de Protección Individual) completo.
- b. Un sangrado interno no exteriorizado.
- c. Una hemorragia nasal. ✓
- d. La inflamación de la "epifisis".

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Medicación de primera elección en caso de urgencia hipertensiva:

Seleccione una:

- a. Captopril 25mg VO. o SL. ✓
- b. Furosemia 40 mg IV.

- c. Labetalol capsulas de 20 mg VO.
- d. Tarka 180mg/2mg (verapamilo/trandolapril) VO.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una solución cristaloide hipertónica:

Seleccione una:

- a. Ringer Lactato. ✓
- b. Bicarbonato 1M.
- c. Glucosa 20%.
- d. Salino al 7,5 %.