

Hombre de 70 años con EPOC, llega a urgencias con mal estado general, disnea, palidez, sudoración, ...

### Pregunta 1

Seleccione una:

- a. A-B-C-D. ✓
- b. Pulsioximetría.
- c. Frecuencia respiratoria.
- d. Tiraje.

### Pregunta 2

Si no está consciente:

Seleccione una:

- a. Valorar hipercapnia.
- b. VMNI.
- c. Algoritmo SVA. ✓
- d. VMI.

### Pregunta 3

Si está consciente, es criterio de gravedad:

Seleccione una:

- a. La cianosis intensa. ✓
- b. Tolera el decubito supino.
- c. Mantiene una conversación fluida.
- d. Deambula sin esfuerzo.

### Pregunta 4

No nebulizar:

Seleccione una:

- a. Salbutamol.
- b. Bromuro de ipatropio.
- c. Budesonida.
- d. Adrenalina. ✓

### Pregunta 5

No administrar de inicio:

Seleccione una:

- a. Antitérmico si fiebre.

- b. Protectores gastricos.
- c. Antibioticos ✓
- d. Corticoides.

### **Pregunta 6**

La dosis del salbutamol será:

Seleccione una:

- a. De 2,5 a 5 mg según FC. ✓
- b. de 10mg.
- c. 1 ampolla.
- d. 7,5 mg.

### **Pregunta 7**

La dosis de bromuro de ipatropio será:

Seleccione una:

- a. 100 microgr
- b. 250 microgr.
- c. 500 microgr. ✓
- d. 600 microgr.

### **Pregunta 8**

La dosis de budesonida será:

Seleccione una:

- a. 0,5 mg.
- b. 1 mg. ✓
- c. 2 mg.
- d. 5 mg.

### **Pregunta 9**

La dosis de hidrocortisona será:

Seleccione una:

- a. 2 mg /kg. ✓
- b. 1 mg/kg.
- c. 100 mg.
- d. 500 mg.

### **Pregunta 10**

Tras el primer tratamiento y atención, reevaluar a los

Seleccione una:

- a. 5 minutos.
- b. 10-15 minutos. ✓
- c. 30 minutos.
- d. 60 minutos.