

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:

- ☐ a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardiogénico y "IV" infarto NO complicado
- ☐ b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.
- ☒ c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓
- ☐ d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son contraindicaciones para usar sueros glucosados:

Seleccione una:

- ☒ a. TCE e hipertensión intracraneal. ✓
- ☐ b. Hipoglucemia y ansiedad.
- ☐ c. Ansiedad e hipoglucemia.
- ☐ d. Hipertensión e hipoglucemia.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El uso de SNG en pacientes con sangrado digestivo alto activo, está contraindicado en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. VHC +.
- ☒ b. Varices esofágicas. ✓
- ☐ c. INR mayor que 7.
- ☐ d. Pacientes diabéticos.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☒ a. Valorar ABCD. ✓
- ☐ b. Hacer glucemia capilar.
- ☐ c. Buscar cuerpos cetónicos.
- ☐ d. Administrar dextrosa/glucosa.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una solución cristaloide hipertónica:

Seleccione una:

- ☒ a. Ringer Lactato. ✓
- ☐ b. Bicarbonato 1M.
- ☐ c. Glucosa 20%.
- ☐ d. Salino al 7,5 %.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las últimas recomendaciones de tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, la saturación de oxígeno del paciente deberá estar:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 95% y 100%.
- ☒ b. Entre 90% y 95%. ✓
- ☐ c. En 90%.
- ☐ d. En 100%.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☐ a. El Ph.
- ☐ b. K+.
- ☐ c. Edema cerebral.
- ☒ d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

NO es un tipo de SHOCK:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipovolémico.
- ☐ b. Cardiogénico.
- ☐ c. Séptico.
- ☒ d. Anaerobio. ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La FiO2 máxima que obtendremos con una mascarilla venturi a 15 lpm será de:

Seleccione una:

- ☐ a. 1.
- ☐ b. 0,8.

☒ c. 50%-60%. ✓

☐ d. 27%-31%.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:

☐ a. Un patrón Electrocardiografico.

☒ b. Respiratorio. ✓

☐ c. Diabético.

☐ d. Urinario.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que es el estado postcritico de un paciente:

Seleccione una:

☒ a. Periodo limitado de desorientación, badripsiquia y otros deficit neurologicos, tras un crisis convulsiva. ✓

☐ b. Momento tras la resolución de una reclamación de un paciente.

☐ c. Momento exacto en el que el paciente deja de estar critico.

☐ d. Denominación del síndrome de estancia en unidad de cuidados intensivos.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una acidosis implica:

Seleccione una:

- ☒ a. Descenso del Ph. ✓
- ☐ b. Hipotensión - Bradicardia - Bradipsiquia.
- ☐ c. Aumento del Ph.
- ☐ d. Triplicar la PCO2.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tirotóxica:

Seleccione una:

- ☐ a. Penicilinas.
- ☐ b. Gluten.
- ☒ c. Yodo. ✓
- ☐ d. Polen.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Medicación de primera elección en caso de urgencia hipertensiva:

Seleccione una:

- ☒ a. Captopril 25mg VO. o SL. ✓
- ☐ b. Furosemia 40 mg IV.
- ☐ c. Labetalol capsulas de 20 mg VO.
- ☐ d. Tarka 180mg/2mg (verapamilo/trandolapril) VO.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un Electro Cardiograma con elevación del ST en las derivaciones V1 y V2, sospecharemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Infarto inferior.
- ☐ b. Angina estable.
- ☐ c. Angina inestable.
- ☒ d. Infarto septal. ✓

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El principal riesgo de una crisis asmática que no cede, es:

Seleccione una:

- ☐ a. Los vomitos.
- ☒ b. El agotamiento. ✓
- ☐ c. La infección.
- ☐ d. El mareo.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NIHSS, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:

- ☒ a. 1. ✓
- ☐ b. 0.
- ☐ c. 3.
- ☐ d. 2.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- ☐ a. Descenso del Ph.
- ☒ b. Aumento del Ph. ✓
- ☐ c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- ☐ d. Descenso del la PIC.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de estas soluciones cristaloides isotonicas, es ligeramente hipotonica:

Seleccione una:

- ☐ a. Salino 0,9%.
- ☒ b. Glucosa 5%. ✓
- ☐ c. Ringer.
- ☐ d. Ringer Lactato.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que medicación, aún no siendo analgésico puro, alivia el dolor tipo cólico en un cuadro intestinal o urinario:

Seleccione una:

- ☐ a. Paracetamol.
- ☐ b. Ancha fibrin.
- ☒ c. Buscapina. ✓
- ☐ d. Nolotil.

